


Ressursregnskap for reindriftsnæringen

For reindrifftsåret 1. april 2024 – 31. mars 2025

Rapport nr. 39/2025
01.12.2025





Rapport: Ressursregnskap for reindriftsnæringen

Avdeling: Avdeling reindrift

Dato: 01.12.2025

Ansvarlig: Widar Skogan

Bidragster: Kristine Sandstad Næss

Forsidefoto: Ina Therese Sara

Rapport-nr.: 39/2025

Forord

«Ressursregnskap for reindriftsnæringen» er en årlig rapport om ressurs situasjonen i næringen. Rapporten bygger hovedsakelig på de opplysninger som framkommer i reineiernes reindriftsmeldinger og søknader om erstatning for rovvilttap.

Rapporten belyser forhold som er knyttet til klima, areal, beitegrunnlag, reintall, flokkstruktur, produksjon og tap. I rapporten sammenstilles opplysninger og tallmateriale som vurderes opp mot fastsatte kriterier og indikatorer for en bærekraftig reindrift. Vedleggsdelen omfatter næringsoversikter, både på områdenivå og distriktsnivå, samt distriktskart og oversikter over gjeldende rammebetingelser for reindriften.

I tillegg til rapportering gjennom ressursregnskapet foreligger «Totalregnskap for reindriftsnæringen». Totalregnskapet er en årlig rapport om den økonomiske situasjonen i næringen, utarbeidet av partsoppnevnt Økonomisk utvalg som grunnlag for reindriftsavtaleforhandlingene.

Innhold

Forord	2
Innhold	3
1 Innledning	4
2 Bærekraft i reindriften	6
3 Klimatiske forhold og klimaendringer	7
3.1 Tilpasning til subarktisk klima	7
3.2 Klimaet er i endring	7
3.3 Vegetasjonsendringer i reinbeiteområdene	8
3.4 Klimautsattethet og tilpasning	9
4 Tilgangen på beitearealer	14
4.1 Arealendringer påvirker reindriften	14
4.2 Tilgjengeligheten av eksisterende beitearealer	16
4.3 Beitekvalitet	19
5 Slakteuttak og produktivitet i reindriftnæringen	24
5.1 Slakteuttak	24
5.2 Produktivitet	26
6 Kalvetilgang og slaktevekter	29
6.1 Utvikling i slaktevekter	29
6.2 Kalvetilgang	32
7 Tap av rein	34
7.1 Tap av rein til rovvilt	36
7.2 Andre tapsårsaker	41
8 Utviklingstrekk i reindriftnæringen	43
8.1 Reintallsutvikling i Finnmark – Reintetthet og virkninger	43
8.2 Reintallsutvikling i sør-områdene	45
8.3 Samlet oversikt – Slakteuttak, antall slaktedyr, tap og reintall i vårflokk	47
8.4 Kriterier for bærekraftsmålene i reindriftspolitikken	50
Vedlegg	55
Generelle kommentarer til næringsoversikten	56
Vedlegg 1 - Næringsoversikt alle områder	57
Vedlegg 2 - Næringsoversikt Øst-Finnmark	65
Vedlegg 3 - Næringsoversikt Vest-Finnmark	79
Vedlegg 4 - Næringsoversikt Troms	93
Vedlegg 5 - Næringsoversikt Nordland	101
Vedlegg 6 - Næringsoversikt Nord-Trøndelag	108
Vedlegg 7 - Næringsoversikt Sør-Trøndelag/Hedmark	113
Vedlegg 8 - Næringsoversikt reinlagene	118
Vedlegg 9 – Rammebetingelser for reindriften	123

1 Innledning

Målene med reindriftspolitikken er å legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. Reindriftslovens bestemmelser skal også sikre at dyrevelferden hos tamrein er forsvarlig

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er igjen inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i et større antall samiske reinbeitedistrikter¹. Utenfor det samiske reinbeiteområdet utøves reindrift på særskilt grunnlag i Trollheimen.² I Nord-Gudbrandsdalen og Valdres utøves fire reinlag ikke-samisk reindrift med konsesjon.³ I 1998 fikk i tillegg et foretak i Nord-Østerdalen, kalt Rendal renselskap, innvilget konsesjon⁴ til å utøve en særegen driftsform basert på jakt på privateide dyr. I tillegg drives det konsesjonsbasert reindrift i Voss og Hardanger reinlag⁵ og på Tarva⁶.

Reindriften er en nomadisk driftsform som utnytter utmarksbeiter gjennom regionale trekk i takt med årstidene. Rein lever året rundt på utmarksbeite, hvor den må forholde seg til uforutsigbare værforhold og variasjoner i tilgang og kvalitet på beitet. Et reindriftsår består av åtte årstider med ulike behov for beiter. Innenfor disse åtte årstidene varierer beitetilbudet som følge av klimatiske faktorer, lokalitet og årstidsvariasjoner.

Gjennom de mest krevende periodene av året har reinen et stramt energibudsjett som skal forsyne reinen med energi til aktiviteter som beiting, bevegelse og til de grunnleggende livsprosessene. I denne sammenheng har simlas kondisjon stor betydning for selve kalvingsresultatet, som igjen påvirker hvor mange kalver reineieren har til slakt eller påsett.

Simlene skal i løpet av året ha energi til å bringe frem kalv gjennom drektighetsperioden, samt tilstrekkelig energi til oppfostring og melkeproduksjon i løpet av vår, sommer og høst. Dette gjelder særlig i de siste månedene av simlenes drektighetsperiode og de første månedene etter kalving.

Tradisjonelt har klimaet og snøforholdene vært den dominerende faktoren for disse sammenhengene. Når beitetrykket har vært for høyt og lavbeitenes kvalitet er redusert, slik som det har vært i store deler av Finnmark de siste årene, må reinen bruke mer energi på å grave frem beite. I ytterste konsekvens kan et høyt beitetrykk i kombinasjon med ugunstige klimaforhold medføre sulteperioder, at simler aborterer kalv eller ikke investerer tilstrekkelig i kalven utover våren, samt tap av rein som følge av førebegrensning og rovvilt. Dette påvirker i neste omgang hvor mange kalver reineieren kan slakte eller sette til påsett.

For å utnytte produksjonspotensialet i reindriften må reinflokkenes størrelse derfor tilpasses tilgjengelig beiteareal. For reindriften i Norge er det stor variasjon mellom ulike områder i forhold til hvordan reinflokkenes størrelse er tilpasset beitegrunnet. Det er også stor variasjon i klimaets påvirkning på driftsforholdene mellom områder. Mens Nordland og Troms reinbeiteområde har kystnære vinterbeiter med klimatisk utfordrende driftsforhold, har reinbeiteområdene i Finnmark, Sør-Trøndelag/Hedmark og reinlagene sine vinterbeiteområder i innlandet, hvor det hovedsakelig er

¹ Lov om reindrift av 15.06.2007, §§ 4, 5, 6 og 42

² Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal av 21.12.1984 (Trollheimenloven).

³ Lov om reindrift av 15.06.2007, § 8

⁴ Vedtak i Landbruksdepartementet av 18.05.1998.

⁵ Vedtak i Landbruks- og matdepartementet av 05.07.2021

⁶ Vedtak i Landbruks- og matdepartementet av 13.01.2023

gunstigere klima for å drive reindrift. Nord-Trøndelag har også noe utfordrende forhold, men ikke på samme måte som Nordland og Troms.

De siste årene har det vært hyppige beitekriser. Blant annet var det beitekriser i 2017, 2020, 2021/2022 og i 2024 som skapte utfordringer for mange i reindriften. Også vinteren/våren 2025 oppstod det en beitekrise i store deler av reindriftsnæringen i Nordland, Troms og Finnmark. Beitekrisen i 2025 skyldtes klimatiske forhold med vekslende vær mellom plussgrader og regn, streng kulde, sterk vind og snø. I mange områder dannet det seg flere harde snølag som reinen ikke klarte å komme igjennom. Omtrent 147 000 rein (68% av landets totalt 217.152 rein per 31. mars 2025) var berørt av beitekrisen i 2025. Effektene av en beitekrise vil erfaringsmessig kunne vises i statistikkene over slaktevekter og slakteuttak i driftsåret etter krisen, og de vil kunne variere fra område til område. For å minske negative effekter av beitekrisen er det etablert et system for å håndtere beitekriser i reindriften. Systemet omfatter blant annet tiltak for å sikre dyrevelferd og fremtidig produksjon.

Mens det høye reintallet i forhold til beitegrunnlaget i store deler av Finnmark over mange år har vært en utfordring for å oppnå god produksjon, er det særlig vinterklima- og/eller rovviltrelaterte tapsårsaker som har vært begrensende for produksjonen i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag reinbeiteområder. Reinlagene og Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde har over tid hatt en god og stabil produksjon.

I de årlige ressursregnskapene for reindriftsnæringen gis det oversikt over utviklingen i reintall, produksjon, slaktevekter og årlige tap. Dette er viktige størrelser for å beskrive utviklingen i reindriften i forhold til målsetningene om økologisk bærekraft, dyrevelferd og optimalisering av årlig produksjon.

2 Bærekraft i reindriften

En bærekraftig reindrift forutsetter at dagens reindriftsutøvere får mulighet til å utøve reindrift, uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners mulighet til å utøve reindrift jf. Prop. 98 S (2023–2024).

Målet om en bærekraftig reindriftnæring er tredelt, noe som først ble trukket fram i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 28 (1991-92) En bærekraftig reindrift, jf. Innst. S. nr. 167 (1991–92). I Stortingsmelding 32 (2016-2017) Reindrift, Lang tradisjon – Unike muligheter, tydeliggjør Regjeringen at de ønsker å videreføre målet om en bærekraftig reindrift. Det følger av Meld. St. 32 (2016-2017) at den økologiske bærekraften skal prioriteres som en grunnleggende forutsetning for å ivareta reindriftskulturen, utviklingen av næringen og potensialet for økt lønnsomhet. En økonomisk lønnsom næring vil igjen gi et bedre grunnlag for å bevare den kulturelle bærekraften.

For å forstå hva som skal til for å oppnå en bærekraftig reindrift kan man se til St. Prop. 98 S (2023–2024). Kort fortalt innebærer en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift at reindriften driftsform opprettholdes, at næringen fortsetter å være familiebasert, god dyrevelferd, redusert tap av rein og et godt fungerende selvstyre.

I tillegg innebærer en økologisk bærekraftig reindrift tilgang på beiteressurser av god kvalitet, og ivaretagelse av arealressursene. En økonomisk bærekraftig reindrift innebærer utvikling av produkter som markedet etterspør, utvikling av tilleggsnæringer tilknyttet reindrift, en balanse mellom inntekter og kostnader over tid, samt god produktivitet i driften. I forbindelse med kulturell bærekraft er det også viktig at erfaringsbasert kunnskap inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen, at det tradisjonelle reinmerket opprettholdes og brukes, og dessuten at samisk språk forblir en viktig del av reindriftskulturen.

Ressursregnskapet for reindriftnæringen er med på å danne/skal være et kunnskapsgrunnlag som beskriver på hvilke måter reindriften i dag er bærekraftig, og hvordan driften vil kunne utvikle seg videre i fremtiden. For en god utnyttelse av produksjonspotensialet i reindriften må reinflokkenes størrelse være tilpasset tilgjengelig beiteareal. Samtidig virker klima og årstidsvariasjoner inn på reindriften produksjonsforhold. Mens det høye reintallet i forhold til beitegrunnlaget i store deler av Finnmark har vært en utfordring for å oppnå god produksjon over mange år, så er særlig vinterklima- og rovviltrelaterte tapsårsaker en begrensning for produksjonen i andre reinbeiteområder som Troms og Nordland.

3 Klimatiske forhold og klimaendringer

I dag er klimaendringer en viktig faktor som påvirker reindriften. Effektene av klimaendringer på reindriften er et eksempel på hvordan ytre faktorer på mange måter først påvirker den økologiske bærekraften, for videre å også ha betydning for det økonomiske og det kulturelle i reindriften. Først påvirker klimaet beitegrunnlaget samt de forholdene reinen oppholder seg i. Dette vil videre kunne føre til forandringer for reinen gjennom endringer i de ulike hendelsene det tradisjonelle reindriftsåret er oppbygd av. Det kan igjen få betydning for reinens helse og faktorer innad i reindriften, som flokkstruktur, produksjon og slaktevekter. Når klimaet endrer seg og samtidig blir mer uforutsigbart, må også reiene gjøre tilpasninger i sitt arbeid. Det kan bli mer krevende for reindriftsutøverne å jobbe i et annerledes klima enn før, med økende fare for uforutsigbart værforhold og føre. For at reindriftnæringen best mulig skal kunne stå i de klimaendringene som kommer er det nødvendig med tiltak som minsker skade i nåtid. Samtidig er det også viktig å gjøre tiltak i et langtidsperspektiv for at reindriftnæringen skal kunne takle utfordringene også i fremtiden.

3.1 Tilpasning til subarktisk klima

Reindrift har over århundrer tilpasset seg en driftsform som er tilpasset subarktiske områder, med vekslende klimatiske forhold. Den nomadiske driftsformen med forflyttinger med beitedyr mellom ulike årstidsbeiter finner man på den nordlige halvkule og i ørkenområdene nær ekvator. Denne driftsformen er en tilpasning til karrige beiteforhold og store variasjoner i temperatur og nedbør gjennom året. For å overleve under slike forhold har reindriftnæringen utviklet en driftsform tilpasset endringene i beiteforholdene gjennom året, og det er utviklet en rik erfaringsbasert kunnskap om reinsdyr, landskapet, naturen, og variasjoner i beiteforhold. Det finnes eksempelvis om lag 318 ord om snø og snøforhold som påvirker vinterbeitene for tamrein på nord-samisk.⁷

Historisk har det med ujevne mellomrom oppstått klimatiske forhold på vinteren som har resultert i beitekriser hvor vinterbeitene har blitt utilgjengelige på grunn av mye snø eller islag i snøen. Beitekrisene har gjerne oppstått med om lag 20 års mellomrom, og det har oftest vært 2-3 år med beitekriser i påfølgende år. Slike beitekriser har resultert i at reindriftsutøverne gjennom generasjoner har utviklet ulike tilpasningsstrategier for å håndtere ulike gjeterstrategier under varierende beiteforhold, strategier etter kriseår, ulik arealbruk, som alt er tilpasset landskapet og reinens økologi. Tradisjonskunnskapen er sterkt knyttet til reindriftnas fagspråk som gir høyt presisjonsnivå på å skildre disse strategiene.^{7 8}

3.2 Klimaet er i endring

Klimaet er i endring globalt. Med et varmere klima i Norge øker hyppigheten og/eller intensiteten av ekstreme værhendelser, og den mest bemerkelsesverdige trenden er de ekstremt høye vintertemperaturene. Det er også rapportert om økning i ekstremvarme om våren og høsten. I Norge har gjennomsnittstemperaturen økt med en halv grad i løpet av de siste 15 årene, og med en grad siden år 1900.⁹ Perioden 1991-2020 har tydelig vært den varmeste 30-års normalperioden vi har hatt

⁷ Eira, I. M. G. "The silent language of snow: Sámi traditional knowledge of snow in times of climate change." (2012): 129.

⁸ Johnsen, Kathrine I., et al. "Leaving no one behind"–Sustainable development of Sámi reindeer husbandry in Norway." *Reindeer husbandry* (2023): 37.

⁹ <https://www.met.no/vaer-og-klima/hvordan-blir-vaeret-i-framtiden> (Metrologisk institutt)

så langt, både i Norge generelt og i alle landsdeler.¹⁰ Den største temperaturøkningen har blitt observert i Trøndelag og Nordland/Troms.¹¹ Klimatologien 1991–2020 for indre Finnmark viser at den årlige middeltemperaturen i gjennomsnitt var 1,2 °C høyere enn middeltemperaturen for 1961–1990. Tilsvarende var middeltemperaturen i snitt 1,1 °C høyere i Varanger og 1,0 °C høyere i regionen Nord-Norge Vest i perioden 1991–2020 enn i 1961–1990.¹² Gitt fortsatt høye klimagassutslipp forventes det at gjennomsnittstemperaturen i Norge øker med ca. 3,4 grader fram mot 2100. Den forventede økningen er størst (4,0–4,6 °C, avhengig av sted) i indre Troms og Finnmark.¹²

Høyere temperaturer gjør at luften får økt evne til å holde på fuktighet, noe som legger til rette for større nedbørsmengder. På landsbasis har mengden årsnedbør økt med ca. 18% siden år 1900.¹² Under samme klimascenario som gir en temperaturøkning i Norge fram mot år 2100, forventes også en gjennomsnittlig økning i nedbør på 18%. Episoder med styrtregn og regnflommer forventes også oftere og kraftigere enn tidligere. Det forventes at både med tanke på antall dager med kraftig nedbør, og selve nedbørmengden på dager med kraftig nedbør, vil det bli en økning.¹²

I samme klimascenario forventes det også en forkorting i antall dager med snø i løpet av året, i hele landet. Det vil også bli en reduksjon i maksimal snømengde gjennom året de fleste steder i landet. Denne reduksjonen forventes å bli størst i høyreliggende områder på Vestlandet og i Nordland, samt på kysten av Troms og Finnmark. Enkelte deler av høyfjellet forventes imidlertid å få en økning i maksimal snømengde. Det vil på sikt bli flere snøfrie områder, og faren for tørrsnøskred reduseres mens faren for våtsnøskred øker. Med tanke på flom forventes størrelsen på regnflommer å øke, mens smeltevannsflommer på sikt vil avta. Vekstsesongen forventes også å bli lengre fram mot 2100. I lavlandet kan den bli én til to måneder lengre, mens i høyfjellet kan vekstsesongen bli så mye som to til fire måneder lengre.¹²

3.3 Vegetasjonsendringer i reinbeiteområdene

Klimaendringer vil påvirke vegetasjonen i Norge og i reinbeiteområdene. Et eksempel er at det gjennom flere studier i perioden 2003–2020 har blitt funnet en stor økning i krekling, samtidig med at vekstsesongen har blitt lengre. Klimaendringer er en forventet årsak til denne gjengroingen. Krekling er en næringsfattig art for reinsdyr, samtidig som den er konkurransedyktig med giftstoffer i bladene. Kreklingen kan fortrenge mengden av andre, mer næringsrike arter, og sånn sett være med å øke beitetrykket på de gjenværende næringsrike artene.¹³

I tillegg vil høyere temperaturer kunne føre til økt artsrikdom i høytliggende områder, da planter som ikke tåler en viss kulde vil ha mulighet til å vokse høyere oppe på fjellet enn tidligere. Artene som forflytter seg oppover er ofte større enn de etablerte plantene, og de er tilpasset høyere temperaturer. Derfor er disse artene ofte konkurransedyktige i møte med de allerede etablerte artene, noe som påvirker artsmangfoldet.¹⁴ For eksempel for lav, som er saktevoksende, kan en økende dominans av andre arter sammen med beitetrykk gjøre det vanskelig for laven å holde stand. På denne måten vil

¹⁰ <https://www.met.no/vaer-og-klima/ny-normal-i-klimaforskningen> (Metrologisk institutt)

¹¹ Hanssen-Bauer, Inger, et al. "Climate in Norway 2100—a knowledge base for climate adaptation." *NCCS report 1.2017* (2017): 52.

¹² Dyrddal, A.V., Bakke, S.J., Hanssen-Bauer, I., Mayer, S., Nilsen, I.B., Nilsen, J.E.Ø., Paasche, Ø., Saloranta, T., Årthun, M. [redaktører] (2025) Klima i Norge – kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2025, NCCS-rapport 1/2025, doi:10.60839/4rqg-nn84.

¹³ Utmarka endrer seg. Kari Anne Bråthen, Maria Tuomi, Adriaan Smis og Tove Aagnes Utsi på vegne av MONEC prosjektet. <https://arcg.is/1CmzC13>

¹⁴ Steinbauer, Manuel J., et al. "Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming." *Nature* 556.7700 (2018): 231–234.

klimaendringer potensielt bidra til å endre artssammensetningen i reinbeiteområdene på en måte som er negativt for reindriften.


Med tanke på reinens egen beiting kan den altså være med å forsterke de negative effektene som klimaendringer kan forårsake. Samtidig kan beitingen i andre tilfeller ha positiv innvirkning på artsmangfoldet, der reinen beiter arter som er dominerende og det dermed gis større rom for andre arter til å vokse. Sammenhengen mellom klimaendringer, reinens egen beiting og beitekvalitet er sammensatt, og effektene vil kunne variere mellom områder.

Generelt sett vil klimaendringenes påvirkning på vegetasjonen kunne gi utfordringer for reindriften gjennom at artssammensetningen endrer seg og beitekvaliteten i enkelte områder kan bli dårligere. Dette kan også skape mer press på de arealene reindriften har som fortsatt er av god beitekvalitet. I tillegg skaper det et usikkerhetsmoment for reindriftsutøverne, med tanke på at man ikke vet sikkert hvordan vegetasjonen i alle beiteområdene vil fortsette å utvikle seg i fremtiden.

3.4 Klimautsattethet og tilpasning

Norsk klimamonitor har samlet inn ulike data på klimapåvirkning (råteindeks, flomfare, stormflo og dager med snødekke > 30 cm) og sårbarhet (befolkning, hjem og bolig, næringsliv og mobilitet) for å se på hvilke kommuner som er mest klimautsatte (figur 3.1). De har også brukt indikatorer for klimatilpasning (tiltak for klimatilpasning samt vurderinger av klimarisiko/klimatilpasning i kommunal planlegging og i sammenheng med andre politikkområder) for å se hvilke kommuner som er har vært de flinkeste på å tilpasse seg klimaendringer.¹⁵ Sett fra et reindriftperspektiv er det interessant at mange kommuner som ligger i reinbeiteområdene er røde, altså at de er blant de mest utsatte kommunene for klimaendringer samtidig som det gjøres mindre for klimatilpasning der enn i andre kommuner. Det var ingen sammenheng mellom hvor klimautsatt en kommune var, og i hvor stor grad kommunen tilpasset seg klimaendringer. For å kunne sikre en bærekraftig reindrift er det viktig at også klimatilpasning i reindriftnæringen tas med i kommunal og regional planlegging, på lik linje med klimatilpasning i annet næringsliv.

¹⁵ Korleis fordeler klimarisikoen seg i framtida? Jan Ketil Rød, Torbjørn Selseng og Carlo Aall. [Korleis fordeler klimarisikoen seg i framtida? — Norsk klimamonitor](#)



Figur 3.1. Kart over kommunene i Norge, hvor klimautsatthet og tilpasning er fremhevet gjennom fargekoder. I tillegg er det en graf som viser klimautsatthet (x-aksen) og klimatilpasning (y-aksen) for alle kommunene i Norge (prikkene). Kommunene (prikkene) er fargekodete som henviser i figuren. Figuren er hentet fra Norsk Klimamonitor.

Klimautfordringer i reindriftsnæringen

I 2023 var det en arbeidsgruppe bestående av medlemmer i Norske Reindriftsamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet som leverte en rapport om temaet *Klimatilpasning i reindriften*.¹⁶ Rapporten gikk inn på både konsekvenser av klimaendringer for reindriften og forslag til tiltak for en fortsatt bærekraftig reindrift i et endret klima. Arbeidsgruppen identifiserte sju hovedutfordringer for reindriften som følge av klimaendringer. Disse utfordringene er som følger:

1. Redusert fleksibilitet som følge av annen arealbruk
2. Endringer i beite- og flyttemønster
3. Utilgjengelige beiter
4. Behov for endret infrastruktur
5. Større fare for ulykker og økt arbeidsbelastning
6. Dokumentasjon av forekomst av rovvilt og tap av rein til rovvilt
7. Økt uforutsigbarhet

¹⁶ Klimatilpasning i reindriften. Rapport fra arbeidsgruppe. Norske Reindriftsamers Landsforbund, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Trøndelag og Landbruks- og matdepartementet. <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klimatilpasning-i-reindriften/id3025418/>

Utfordringene reindriften møter som følge av klimaendringer påvirker beitebruk, produksjon og tap. Konsekvenser og tiltak for å imøtekomme utfordringene vil variere mellom områder avhengig av topografi, tilgjengelig areal og driftsmønster. Nedenfor beskrives noen konsekvenser og tiltak.

Redusert fleksibilitet som følge av annen arealbruk

Tilgang på nok beitearealer av god kvalitet er viktig for å opprettholde en bærekraftig reindriftsnæring. Da klimaendringer er noe som påvirker vegetasjonen i selve beitegrunnlaget, vil enkelte arealer som i dag brukes til reinbeiting ikke fortsette å være like egnede i fremtiden. I tillegg vil fleksibiliteten i reindriften svekkes som følge av endrede vær- og føreforhold, som påvirker hendelsene i beite- og flyttemønstrene hos reinen og dessuten arbeidet til reindriftsutøverne.

Reindriftenes arealer presses allerede i dag av flere faktorer. Arealene minskes som følge av utbygging (f.eks. industri, energianlegg, gruvedrift og kraftlinjer). Tiltak som hytter og skuterløyper skaper fragmentering av arealene. Ferdsel i utmarken og rovvilttrykk påvirker fleksibiliteten i arealbruken. Disse faktorene minsker samlet sett fleksibiliteten i reindriften, da det blir vanskeligere for reindriftsutøverne å tilpasse beite- og flyttemønstrene under et samtidig forandrende klima.

Endringer i beite- og flyttemønster

Reindriftsåret begynner 1. april og avsluttes 31. mars. Det består av 8 årstider som er knyttet til reinens naturlige vandring. Reineierens arbeid og oppgaver baserer seg i stor grad på hendelsene som skjer i ulike deler av reindriftsåret. Gjennom de ulike årstidene vil reinen ha ulike behov, noe som påvirkes av klimaforhold og andre ytre faktorer. Når klimaet er i endring vil dette kunne skape konsekvenser for beite- og flyttemønstrene som foregår i løpet av reindriftsåret. Dette er et sammensatt bilde, og mer informasjon om temaet finnes i rapporten «Klimatilpasning i reindriften».¹⁶

Utilgjengelige beiter

Noen ganger gjør snø- og isforhold at det blir låste beiter for reinen. Det er tre forhold som kan føre til dette:

1. Når snø smelter som følge av temperaturer over 0 grader om vinteren, kan smeltet snø sammen med regn sive inn i snøen og fryse til is.
2. Våt mark ved første snøfall (ikke tele) etterfulgt av en kuldeperiode gjør at bunnsjiktet kan fryse inn og minske tilgangen til beitegrunnlaget.
3. Dyp snø kombinert med islag og lag med hardpakket snø gjør at reinen må grave seg ned for å få tilgang til beiteplantene.

Slik problematikk fører i enkelte år til beitekrise, noe som har forekommet hyppigere i løpet av de siste årene (blant annet i 2017, 2020, 2021/2022, 2024 og i 2025). Klimaendringene tatt i betraktning er det grunn til å tro at beitekriser vil fortsette å skje i framtiden. Beitekrisene som har vært de siste årene har ført til at det har vært nødvendig å føre reinen gjennom perioder av vinter og vår. Man vet i dag lite om konsekvensene slik tilleggsfôring har for reinsdyrene og naturmangfoldet. Enkelte er bekymret for om fôring øker risiko for sykdomsspredning hos reinen, eller om vegetasjonen ikke har godt av det dersom fôr spres på bakken. Studier har vist adferdsendringer hos rein ved langvarig

fôring.¹⁷ I tillegg vil en beitekrise medføre økonomiske kostnader, gjennom utbetaling av ekstra tilskudd til næringen.

Behov for endret infrastruktur

Den infrastrukturen som fins i reindriften i dag, er bygd etter og tilpasset den tradisjonelle driften. Men når klimatiske forhold endrer seg, får det i flere tilfeller betydning for om den eksisterende gjerdestrukturen fungerer etter hensikt. På sikt må reineierne omstille seg de endrede forholdene, slik at infrastrukturen vil fungere også i framtiden. Det kan i noen tilfeller bli nødvendig å flytte på eller endre infrastrukturen. Noen eksempler på dette nevnes nedenfor.

Mange reindriftsutøvere har plassert gjerder for kalvemerking i høytliggende områder, eller i nærheten av snø, for at ikke kalvene skal bli for varme under merkingen. Disse gjerdene kan det være nødvendig å flytte lengre opp i høyden på sikt, på grunn av klimaendringer. Et annet eksempel er at ved gjerder som skiller distriktenes sommerbeiter, kan større snømengder mot slutten av vinteren føre til nedsnøing av gjerdene. For å forhindre sammenblanding mellom distriktene kan høyere gjerder bli nødvendig. Også sperregjerder på vinterbeitene kan måtte bygges høyere dersom det blir økte snømengder, slik at reinen ikke får mulighet til å passere. Noen reineiere får kanskje også behov for å flytte på slaktegjerdene sine ved mildere høster, da de er avhengige av frosset og snødekt mark for å gjennomføre slakt. I tillegg er det 5 flyttesystemer med gjerdeanlegg i Finnmark hvor alle siidaene skal flytte sin rein, der det ofte oppstår et køsystem. Fleksibiliteten til de som bruker disse gjerdene kan rammes dersom føre- og værforhold gjør at systemet ikke er mulig å bruke like ofte. Det er også noen steder, spesielt i Vest-Finnmark, at de ikke har egne fôringsanlegg å benytte seg av hvis behovet for fôring oppstår som følge av et endret klima.

Større fare for ulykker og økt arbeidsbelastning

I dag er reindriften en næring som er utsatt for å oppleve ulykker. Klimaendringer kan også i fremtiden øke faren for ulykker i reindriften. Ferdsel og flytting kan bli mer usikkert som følge av endrede tidspunkt for islegging. Hvis vannet fryser senere, medfører også dette mer tåke. I tillegg kan det forekomme skred og ras i flere områder enn tidligere. I forbindelse med beitekriser som følge av endrede klimaforhold, er det dessuten nødvendig å kjøre ut fôr, noe som vil kreve økt arbeidskapasitet og fare for arbeidsulykker i forbindelse med uttransport av krisefôr. Generelt vil også mer ekstremvær føre til økt ulykkesfare for reindriftsutøverne. Mer om dette temaet finnes i rapporten «Klimatilpasning i reindriften».¹⁶

Dokumentasjon av forekomst av rovvilt og tap av rein til rovvilt

Det er i dag mangel på kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker selve bestandene av rovvilt. Hvordan rovviltbestanden blir påvirket av klimaendringer vil også påvirke andelen rein som tapes til rovvilt. Reindriften har likevel uttrykt at kortere perioder med snødekt mark gjør det mer utfordrende å spore/dokumentere funn av rovvilt. Mer ustabil vær, samt økt forekomst av uvær, gjør at sporene fra rovvilt oftere regner bort, blåser igjen eller snør ned. I tillegg kan endringene i snøforhold føre til mindre skigåing som fritidsaktivitet enkelte områder. Dette kan medføre økt sannsynlighet for at et lavere antall spor etter særlig gaupe og jerv meldes inn til Statens naturoppsyn (SNO) og registreres

¹⁷ Skarin, Anna, et al. "Vinterfôring av reinsdyr-effekter på reinsdyrs oppførsel, beitepraksis og miljøet." *Rangifer* 44.4 (2024).

i Rovbase. Kombinert med redusert sporing kan dette føre til at rovviltbestanden blir underestimert, noe som også vil påvirke omfanget av lisensjakt på gaupe og jerv.

Det er dessuten spesielt vanskelig å finne kadavre etter rein drept av rovvilt i snøfrie perioder fordi kadaver som ikke er frosset luktes enklere og fortæres raskere av åtseletende fugler og dyr. En annen grunn er at man ikke har rovviltspor å følge etter i denne perioden. I tillegg vil sporene etter kadaveret (blod, hår og vom-innhold) være mindre synlige på barmark enn som kontrast til snøen. Det er også slik at høyere sommertemperaturer kan føre til at kadavre enda raskere blir spist av larver som klekkes i kadavrene. Når både andelen dokumenterte kadavre og estimatet på antall rovvilt svekkes, vil dette kunne påvirke sannsynliggjorte tap som erstattes til reineier negativt.

Økt uforutsigbarhet

Klimaendringer vil i framtiden kunne påvirke reindriften på flere måter, som nevnt i avsnittene ovenfor. Det at man ikke alltid vet sikkert hvilke effekter klimaendringene fører med seg i hvert enkelt område, gir en økt uforutsigbarhet. Det kan på den ene siden være effekter knyttet til vegetasjon og beiteforhold for reinsdyrene, og på den andre siden effekter knyttet til reineiernes behov for å gjøre tilpasninger i arbeidet. Med tanke på den uforutsigbarheten reindriften opplever, er det viktig at det finnes værvarslingssystemer som fungerer godt og er tilpasset reindriften.

4 Tilgangen på beitearealer

Tilgang på tilstrekkelig beiteareal av god kvalitet er en forutsetning for reindriften. Arealendringer som følge av utbygging og inngrep vil kunne påvirke reindriften gjennom direkte tap av beitearealer, og indirekte gjennom blant annet unnvikelse hos reinsdyrene. I tillegg kan arealendringer skje ved at vegetasjonen og artssammensetningen i et område endrer seg som følge av klimaendringer og/eller reinens egen beiting. Det at det i dag skjer utbygging, samtidig som klimaendringer er i fokus, gjør det relevant å vite mer om både dagens situasjon, hvilke endringer som kan forventes og hvordan reindriften påvirkes av arealendringer.

4.1 Arealendringer påvirker reindriften

Reindriftens behov for arealer

Reindriftens tradisjonelle driftsform med sesongbasert flytting mellom årstidsbeiter utgjør en sentral forutsetning for reindriftens økologiske, økonomiske og kulturelle bærekraft¹⁸. Reinens behov varierer gjennom året, og reinen trekker mellom årstidsbeiter med ulike naturkvaliteter. Reinens atferd påvirkes av en rekke naturgitte og menneskeskapt faktorer, som kan resultere i variasjoner i driftsmønstre mellom år og mellom geografiske områder. På grunn av sin nomadiske driftsform er reindriften en arealavhengig næring som foregår på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og noen steder over grensen til Sverige.

Tilgang til alle typer årstidsbeiter og nødvendige beitearealer bidrar til god produksjon og lønnsomhet, tilfredsstillende dyrevelferd og utnyttelse av marginale arealressurser¹⁸. Gode beiteforhold og god økologisk bærekraft gir generelt større motstandskraft mot effektene av arealinngrep¹⁹. Videre er tilgjengelige flyttleier mellom de ulike beiteområdene særskilt viktig, og flyttleier er derfor gitt et spesielt vern i reindriftsloven.

Effekter av inngrep og forstyrrelser

Inngrep i reinbeiteområdene kan deles inn i direkte lokale effekter, indirekte regionale effekter og kumulative effekter^{19 20 22}. Det er viktig å ta skala i betraktning når man ser på effekter av inngrep og forstyrrelser på reinsdyr.²¹

¹⁸ Prop. 98 S (2023-2024). <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-98-s-20232024/id3036336/>

¹⁹ Karlegging av forskning på reindriftsområdet – kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov NIBIO rapport 1532 (2021). <https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2835162>

²⁰ The matter of spatial and temporal scales: A review of reindeer and caribou response to human activity (Vistnes og Nellemann 2007). https://www.researchgate.net/publication/225393726_The_matter_of_spatial_and_temporal_scales_A_review_of_reindeer_and_caribou_response_to_human_activity

²¹ Do human activity and infrastructure disturb domesticated reindeer? The need for the reindeer's perspective. (Skarin og Åhman 2014). https://www.researchgate.net/publication/261947154_Do_human_activity_and_infrastructure_disturb_domesticated_reindeer_The_need_for_the_reindeer%27s_perspective

Direkte effekter omfatter fysisk tap av beite og forstyrrelser i nærheten av inngrep som berører enkelt dyr²². Inngrep kan være vindkraft, landbruk, skogdrift, vannkraft, kraftlinjer, gruvedrift, hytter, jernbane, veier og turisme/rekreasjon. **Indirekte effekter** er for eksempel unnvikelses- og barriereeffekter, som ofte er langvarige og berører hele flokken i det aktuelle området^{19 22}. Tamrein reagerer i likhet med villrein med frykt og flukt fra menneskelige forstyrrelser, selv om villrein kan ha lengre fluktavstand og det kan være betydelige individuelle variasjoner^{19 21}. Studier har for eksempel vist at merka stier og turistløyper påvirker villreinens arealbruk betydelig, ved å endre atferd og hindre naturlige trekkmuligheter. Økt menneskelig aktivitet har vist økt grad av unnvikelse^{23 24}.

Kumulative effekter refererer til den samlede påvirkningen av tidligere, nåværende og planlagte inngrep og forstyrrelser. Inngrep som hver for seg har begrensede konsekvenser, kan i sum ha stor negativ effekt på reindriften¹⁹. Dette kan for eksempel skje gjennom oppstyking av reinbeiteområder og hindring i flytt- og trekkleier. Den nomadiske driftens årssyklus henger sammen, og inngrep og forstyrrelser i et av distriktets årstidsbeiter vil kunne få konsekvenser for hele driften. For eksempel kan reduserte muligheter til beiting om sommeren gi redusert drektighet, kalvingsprosent, kalvingsoverlevelse, slaktevekt og dermed redusert produksjon.²²

Arealtap som følge av reinens unnvikelsesatferd kan variere og er vanskelig å måle. For tekniske anlegg er effekten ofte ulik i etablerings- og driftsfase²³. Forskning på vill- og tamrein viser at reinsdyr unngår arealer med menneskelig aktivitet og infrastruktur på mellom 1-12 kilometers avstand¹⁹. Dyr påvirkes i ulik grad av inngrep og forstyrrelser, og simler og kalv er i kalvingstida spesielt utsatt²¹. Et område med forstyrrelser kan imidlertid ha andre kvaliteter, som få insekter, og rein vil under visse forutsetninger velge å bruke områder med forstyrrelser for å få dekket et behov²³. Dyr som oppholder seg i områder med forstyrrelser har imidlertid risiko for å bli mer urolige og få mindre beitero²⁵.

NIBIO (2021)¹⁹ har kartlagt forskningen på reindriftsområdet. Forskningen viser at inngrep gjør reindriften mer sårbar. Nedbygging av arealer gjør at det blir færre områder som kan tas i bruk ved forstyrrelser og klimaendringer, og det blir redusert mulighet til å la beiteområder hvile i noen år for å bygge seg opp. Behovet for gjeting, gjerdning og tilleggsfôring kan øke, og med det arbeidsbelastningen. Det kan bli økt beitepress på de mer uberørte arealene, som kan føre til vegetasjonsforandringer og økt parasittbelastning, samt mer problemer med rein på innmark. Mangel på sammenhengende arealer kan gjøre det nødvendig å bruke biltransport for å flytte reinen mellom årstidsbeiter. I tillegg til å være stressende for reinen, er slik transport en økonomisk belastning for reindriftsutøveren, og det bryter med premisene for tradisjonell reindrift. Videre kan inngrep og forstyrrelser føre til at reinsdyr og rovdyr tvinges til å bruke mer av de samme utmarksområdene^{20 22}, som forsterker effekten av inngrep. Rein som stadig møter menneskelig aktivitet vil bruke mer energi, få mindre tid til å beite og får lavere kroppsvekt²⁶.

Forskere fra Norge og Sverige gjorde i 2017 en gjennomgang av forskningen på vindkraft og reinsdyr²³. De konkluderte med at «et vindkraftanlegg alltid har potensial for å gi negative effekter på miljø og samfunn». Omtrent halvparten av studiene har vist redusert bruk av områder i 3-5 km fra vindkraftanlegg, mens den andre halvparten ikke har vist en slik tendens. Forskerne skriver at de forskjellige resultatene kan skyldes forskjeller mellom sesong, naturlig variasjon mellom år,

²² Inngrep i reinbeiteland. Biologi, jus og strategier i utbyggingssaker. Vistnes m.fl. (2004) <https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2837705>

²³ Vindkraft og reinsdyr – en kunnskapssyntese. NINA rapport 1305 (Strand m.fl. 2017) <https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2446889>

²⁴ Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda. Anbefalinger og tiltak. NINA rapport 2361 (Gundersen m.fl. 2021) <https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2759600>

²⁵ Effekter av landbasert vindkraft på renar och renskötsel. Lindberget, Skarin og Sandström (2024) <https://www.samhallsforlaget.se/wp-content/uploads/2024/03/Lindberget-et-al-Vindkraften-och-rennaringen.pdf>

²⁶ Meld. St. 32 (2016-2017) Reindrift – Lang tradisjon – unike muligheter <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-32-20162017/id2547907/>

forskjeller i gjennomføringen av studier, ulikheter i topografi og beiteforhold, nærhet til infrastruktur og ulik atferd mellom flokker. Det er behov for studier som tar hensyn til langtidseffekter og kumulative effekter, som bruker soner med tilstrekkelig stor avstand fra utbygging (opp mot 10-15 km) og som inkluderer alle årstider²³. Effekten av kraftledninger er uklar. I anleggsfasen kan reinen unngå områdene. I driftsfasen om sommeren er det ikke vist tilsvarende effekt, men i mørketiden kan reinen bli forstyrret på grunn av evne til å se i UV-spekteret. Det kreves mer forskning om påvirkningen vindkraftanlegg har på reinsdyr^{19 23}.

4.2 Tilgjengeligheten av eksisterende beitearealer

Det samiske reinbeiteområdet dekker om lag 40 prosent av Norges areal. I dette arealet ligger store områder som er utilgjengelig eller mindre egnet til reinbeite. Det kan være byer og tettsteder, landbruksområder, vann, isbre, bratt terreng, veier, industri og turistanlegg.


Det finnes i dag ikke en god nok oversikt over hvor stor del av reinbeitedistriktene areal som er tilgjengelig for beite. Det jobbes med å lage en arealstatistikk for reinbeitedistriktene. En arbeidsgruppe satt sammen av Norske Reindrifsamers landsforbund, Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, NIBIO og SSB utga i 2022 en rapport med anbefalinger til hvordan en arealstatistikk for reindriften kan utformes²⁷. Et arealregnskap for reindriften vil bygge videre på disse anbefalingene.

Riksrevisjonen la i 2006-2007 frem en rapport som tok for seg arealdisponering i Norge²⁸. Riksrevisjonen viste til at utbygging har skjedd spredt og at store, sammenhengende naturområder har vært under stadig nedbygging. Rundt år 1900 var omtrent 50 prosent av Norges areal villmarkspregede. I januar 2023 var tallet redusert til 11,2 prosent. Fra 1988 til 2023 ble den villmarkspregede naturen i Norge redusert med om lag 7,4 prosent²⁹. Andelen beiteland i de samiske reindrifsområdene som ligger lengre enn 5 km fra infrastruktur er redusert med 71 prosent fra 1900 til 2019¹⁹.

²⁷ Statistikk for arealbruk i reinbeitedistrikter. NRL, NIBIO, SSB, Landbruksdirektoratet og LMD (2022)
<https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/rapporter/statistikk-for-arealbruk-i-reinbeitedistrikter?resultId=0.0&searchQuery=Statistikk+for+arealbruk+i+reinbeitedistrikter>

²⁸ Undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge, Riksrevisjonen Dokument 3:11 (2006-2007)
<https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2006-2007/undersokelse-av-barekraftig-arealplanlegging-og-arealdisponering-i-norge/>

²⁹ Miljødirektoratet, «Inngrepsfrie naturområder» lastet ned 12.11.2024.
<https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/naturkartlegging/Inngrepsfrie-naturomrader/>




Figur 4.1. Figuren viser tap av areal lengre enn 5 km fra nærmeste infrastruktur («low impact areas») mellom 1900 og 2019. Kilde: Nellemann m.fl. 2003. Hentet fra NIBIO (2021)¹⁶.

SSB gjorde en undersøkelse i 2020³⁰ som viste at ca. 89 prosent av den samiske reindriftens årstidsbeiter og flyttleier ligger innenfor 5 kilometer fra fysiske inngrep som bygninger og infrastruktur. Studien viste blant annet et betydelig inngrepspress på vinterbeiteområdene. Vårvinterbeiter er minimumsbeite for de fleste reinbeitedistriktene og det som begrenser flokkstørrelsen. Tilleggsforstyrrelser i kalvingsperioden og for senvinterbeiter kan få store konsekvenser for dyrenes kondisjon²¹.

Arealressurser og arealbruk i reinbeiteområdene

Figur 4.2 og tabell 4.1 viser andel av de ulike arealressursene skog, åpen myr, snaumark, snø/isbre, ferskvann, bebyggt areal og jordbruk i reinbeiteområdene:

³⁰ SSB analyse 2020/16 Utbygging får konsekvenser for reinbeiteområder. Lastet ned 12.11.24. <https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/utbygging-far-konsekvenser-for-reinbeiteomrader>




Figur 4.2. Arealressurser i reinbeiteområdene (prosent). Figuren er basert på tall fra NIBIO (2024), utviklet på bestilling fra Landbruks- og matdepartementet. Datagrunnlag: Grunnkart for arealregnskap.

Tabell 4.1 Arealressurser i reinbeiteområdene (km²). Basert på tall fra NIBIO (2024), utviklet på bestilling fra Landbruks- og matdepartementet.

REINBEITEOMRÅDE	Skog	Åpen Myr	Snaumark	Snø/isbre	Ferskvann	Bebygd	Jordbruk	Total
ØST-FINNMARK	7 834	1 681	19 316	0.42	1 749	103	101	30 785
VEST-FINNMARK	5 720	1 886	15 058	94	1 378	73	82	24 292
TROMS	6 601	961	11 239	173	863	196	332	20 367
NORDLAND	9 657	954	18 415	880	1 999	280	553	32 738
NORD-TRØNDELAG	9 094	2 442	8 131	0.39	1 649	201	710	22 227
SØR-TRØND./HEDM.	2 210	763	2 664	0.01	414	35	86	6 173
REINLAGENE	2 164	847	6 486	73	427	36	33	10 066
HELE REINDRIFTEN	43 281	9 534	81 310	1 222	8 479	924	1 898	146 647

Figur 4.3 viser hva de bebygde arealene i reinbeitedistriktene består av, delt inn i kategoriene bolig, annen bebyggelse, fritidsbebyggelse, industri og bergverk, samferdsel og energiforsyning.



Figur 4.3. Bebygd areal i reinbeiteområdene (prosent). Figuren er basert på tall fra NIBIO (2024), utviklet på bestilling fra Landbruks- og matdepartementet. Datagrunnlag: Grunnkart for arealregnskap. Kraftlinjer og traktorveier er ikke med i arealstatistikken.

4.3 Beitekvalitet

St. Prop. 98 S (2023–2024) legger vekt på at beiteressurser av god kvalitet er avgjørende for reindriften. Det er to mulige metoder for å si noe om beitekvaliteten i et reinbeiteområde. Den ene metoden går ut på direkte kartlegging og overvåkning av arealene, mens den andre metoden er indirekte ved å la forhold innad i reindriften fortelle om beitenes kvalitet, med vekter eller reintall som beiteindikator. De gjennomsnittlige slaktevektene har vært spesielt lave for områdene i Finnmark over tid sammenlignet med andre reinbeiteområder (tabell 6.1, 6.2 og 6.3). Dette kan på den ene siden indikere at det er lite beitearealer i forhold til antallet reinsdyr, men det kan også si noe om kvaliteten på beitearealene i Finnmark. På grunn av de lave slaktevektene og dessuten et over tid høyt reintall i forhold til det fastsatte øvre reintallet flere steder i Finnmark, er det spesielt viktig å kunne se nærmere på vegetasjonen og beitekvaliteten i de aktuelle områdene.

Gjennom overvåkning av vegetasjonstyper på reinbeiteområdene over tid er det mulig å si noe direkte om utviklingen i beitekvalitet i reinbeiteområdene. For perioden 1973-2000 ble det dokumentert en generell reduksjon i lavdekket på Finnmarksvidda, samtidig som reintallet i deler av perioden økte sterkt i det samme området. Den negative utviklingen i lavbeitet fram til 2000 ble dokumentert gjennom ulike typer undersøkelser utført av Hans Prestbakmo³¹ og NORUT³².

I 1998 ble det av reindriftsforvaltningen initiert et prosjekt for reinbeiteområdene i indre Finnmark: *Overvåkingsprogrammet for Indre Finnmark*. Prosjektets første beitekartleggingsdata går tilbake til år 2000, og siden da har det vært jevnlig oppdateringer omtrent hvert 5. år.

³¹ Prestbakmo, H. 1994. Lavbeitene på Finnmarksvidda. Endringer fra 1960 til 1990. Småskrift Reindriftsadministrasjonen nr. 1 1994.


³² Johansen, B. og Karlsen, S.R. 2000. Finnmarksvidda - kartlegging og overvåkning av reinbeiter – status 1998. NORUT Rapport IT546/1-2000.

Overvåkningsprogrammet har tidligere år brukt både feltregistreringer og satellittdata i sin metodikk. NORUT har hatt ansvaret for satellittdelen³³, mens NINA har gjort bakkeregistreringene³⁴. Siste års rapport er fra 2023 og ble utarbeidet av NORCE (tidligere NORUT), og det ble brukt satellittdata til å si noe om sammensetningen av beitenene.³⁵

Lavmark på vinterbeitene

I sin rapport fra 2013 (som også var en del av overvåkningsprogrammet for indre Finnmark) utarbeidet NORUT (i dag NORCE) en framstilling av data på vegetasjonen i Finnmarks vinterbeiteområder der de tok med data helt tilbake til 1987.³⁶ Disse tallene, i kombinasjon med nyere tall fra overvåkningsprogrammet (rapport 2023)³⁵, utgjør dataene i figur 4.4.

Det framgår tydelig av figuren at det var en negativ utvikling i andelen intakt lavmark på vinterbeitene i indre Finnmark mellom år 1987 (19,0% lavmark) til år 2000 (5,6% lavmark). Til sammenligning økte andelen slitte lavheier fra 1987 (0,9%) til 2000 (10,0%). Det kan indikere at mye beiting i området var med på å gjøre store deler av den tidligere intakte lavmarken om til slitte lavheier. Etter år 2000 har andelen lavmark på vinterbeitene gått både opp og ned, med et bunnpunkt i 2013 (kun 4,0% lavmark på vinterbeitene). I 2018 fikk andelen lavmark på vinterbeitene en oppgang til 7,2%, det høyeste tallet siden 1996 (8,4%). Det ble imidlertid en ny nedgang mot 2023, da det var 5,8% lavmark. Andelen slitte lavheier, som tidligere økte fram mot år 2000, har variert noe, men likevel samlet sett hatt en nedgang fra år 2000 (12,3%) til år 2023 (3,9%).



Figur 4.4. Andelen lavmark (% av totalt areal) og slitte lavheier på vinterbeitet i indre Finnmark. Data er hentet fra NORCE sin rapport «Kartlegging og overvåking av reinbeiter» fra 2023, og NORUT sin rapport «Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter – status 2013» fra 2014.

³³ Johansen, B. og Karlsen, S.R. 2000. Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter – status 1998. - NORUT Informasjonsteknologi Rapport IT546/1-2000.

³⁴ Gaare, E. og Tømmervik, H. 2000. Overvåking av lavbeiter i Finnmark. NINA Oppdragsmelding 638.


³⁵ Karlsen, Stein Rune, Daniel Johansen Trosten, and Bernt Johansen. "Kartlegging og overvåking av reinbeiter." (2023).

³⁶ Johansen, Bernt, et al. "Finnmarksvidda – kartlegging og overvåking av reinbeiter – status 2013." (2014).

Mellom Øst-Finnmark og Vest-Finnmark var det på vinterbeitene i 2023 noen forskjeller i andelen intakt lavmark og andelen slitte lavheier. Vest-Finnmark (Kautokeino østre, midtre og vestre sone) hadde 7,6% intakt lavmark og 5,2% slitte lavheier på vinterbeitene i 2023, mens Øst-Finnmark (karasjok østre og vestre sone) hadde 1,9% lavmark og 1,1% slitte lavheier.

Lavmark på vår- og høstbeitene

For vår- og høstbeitene i indre Finnmark har andelen intakt lavmark vært lav helt fra år 2000 (0,2%), til 2023 (1,4%) (figur 4.5). Andelen slitte lavheier siden 2000 har variert noe gjennom perioden, men hadde et bunnpunkt etter siste kartlegging (fra 12,5% i 2000 til 5,4% i 2023).




Figur 4.5. Andelen lavmark (% av totalt areal) og slitte lavheier på vår- og høstbeitet i indre Finnmark. Data er hentet fra NORCE sin rapport «Kartlegging og overvåking av reinbeiter» fra 2023

Mellom Øst-Finnmark og Vest-Finnmark var det også på vår- og høstbeitene i 2023 noen forskjeller i andelen intakt lavmark og andelen slitte lavheier. På vår- og høstbeitene var det i 2023 0,2% intakt lavmark og 6,0% slitte lavheier i Vest-Finnmark (vinterbeitene til Kautokeino østre, midtre og østre sone). For Øst-Finnmark (karasjok østre og vestre sone) var tallene 2,7% lavmark og 4,9% slitte lavheier.

Økning i andelen «lyng-, risheier og vierkratt»

For både vår- og høstbeitene og for vinterbeitene har andelen lyng- risheier og vierkratt i indre Finnmark hatt en økning siden år 2000 (figur 4.6). For 2023 er denne andelen på 30,8% for vår/høstbeitene og 15,6% for vinterbeitene. Dette indikerer at Finnmarksvidda tettes til noe med dvergbjørk og busker. Disse vekstene har noe lavinnhold, men for reindriften kan dette likevel føre med seg utfordringer. Lyng og dvergbjørk kan virke som snøoppsamlere, noe som vil kunne gjøre

beitene mindre tilgjengelig på sen vinteren. Trenden med økt plantevekst er en forventet utvikling relatert til klimaendringer.³⁷



Figur 4.6 Andelen lyng- risheier og vierkratt (% av totalt areal) på vinterbeitet og vår/høstbeitet i indre Finnmark. Data er hentet fra NORCE sin rapport «Kartlegging og overvåking av reinbeiter» fra 2023. For vår/høstbeitet var det ingen arealberegninger i 2013, da det ikke ble utført feltregistreringer og laget vegetasjonskart for vår/høstbeitet dette året.

Betydningen av funn fra beitekartleggingen

Generelt ser vi at andelen lavmark på vår- og høstbeitene i indre Finnmark over tid har vært lav (figur 4.5). Andelen lavmark på vinterbeitene har vært noe høyere enn den for vår- og høstbeitene, men samtidig har vi hatt en stor nedgang siden 1987 (figur 4.4). Den lave andelen intakt lavmark på høst-, vår- og vinterbeitene indikerer at beitekvaliteten i flere områder i Finnmark ikke er optimal i dag. Dette kan ha sammenheng med at man over flere år har sett lavere gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i Finnmark enn i andre reindriftsområder.

Det har også siden år 2000 blitt registrert indikasjoner på en gjengroing av lyng- risheier og vierkratt i indre Finnmark (figur 4.6). Denne observerte økningen vil potensielt kunne gi mer utfordrende beiteforhold i framtiden dersom utviklingen fortsetter, ettersom lyng og dvergbjørk kan virke snøoppsamlende når vinden flytter på snøen, og dermed redusere beitetilgangen. Som allerede nevnt er den observerte økningen en forventet utvikling, klimaendringene tatt i betraktning.

For å opprettholde en økologisk bærekraftig reindrift må reindriften ha tilgang på beiteressurser av god kvalitet året rundt. Da må antallet rein i områdene samsvare med beitearealene, både i forhold til mengden tilgjengelige arealer, og med tanke på selve beitekvaliteten. Oppfølging av reintallet i Finnmark vil derfor være viktig framover, i tillegg til videre overvåking av vegetasjonen på

³⁷ Karlsen, S.R., Tømmervik, H., Johansen, B. and Riseth J.Å. 2017. Future forest distribution on Finnmarksvidda, North Norway. *Clim Res.* 73:125-133.

Finnmarksvidda. I tillegg bør det tas i betraktning at påvirkningen av klimaendringer vil fortsette å ha betydning for vegetasjonen og dermed også beitekvaliteten i reinbeiteområdene, slik at både tilpasninger i et korttidsperspektiv og en langsiktig tankegang blir nødvendig.

5 Slakteuttak og produktivitet i reindriftsnæringen

Årlig uttak av slaktedyr er avhengig av kalvetilgangen, tap av dyr, og hvor mange dyr reineier setter til livdyr. Utvelgelsen av slakterein med hensyn til antall og type dyr er en svært viktig beslutning den enkelte reineier gjør i løpet av driftsåret. De valg som her foretas har følger for framtidig avl, struktur på flokken, innvirkning på tap ved at tapsutsatte dyregrupper slaktes, og ikke minst vedkommende reineiers framtidige inntekt. Slaktedyr leveres i hovedsak til slakteri, men i tillegg slaktes det rein både til eget forbruk og for privat salg.

5.1 Slakteuttak

Utviklingen i antall slaktedyr og slaktekvantum for de siste 10 driftsårene er vist i tabell 5.1, tabell 5.2 og figur 5.1. Oversiktene omfatter både leveranser til slakteri, privat salg og eget forbruk.

Som tabellene 5.1 og 5.2 viser, ble det i driftsåret 2024/25 slaktet 64 207 dyr for hele landet. I kvantum utgjorde dette 1536 tonn. Gjennomsnittet for hele 10- års perioden ligger på rundt 1601 tonn. Det vil si at slaktekvantum for 2024/25 ligger under gjennomsnittet.

I hele reindriften har det vært en 9% nedgang i antallet slaktedyr siden forrige sesong. Antallet slaktedyr har gått ned i alle soner og områder utenom Kautokeino østre sone, Nord-Trøndelag og Reinlagene. Største prosentvise nedgang fra fjoråret i antall slaktedyr var i Karasjok vestre sone (-27%), mens høyeste økning var i Nord-Trøndelag (8,6%).

Det totale slaktekvantumet har generelt sett hatt en nedgang (5,5%) siden forrige sesong. Slaktekvantumet i alle soner utenom Kautokeino østre sone, Nord-Trøndelag og reinlagene har gått ned. Største prosentvise nedgang fra fjoråret i slaktekvantum var i Karasjok vestre sone (-20%), mens høyeste økning var i Nord-Trøndelag (8,1%).

Tabell 5.1. Totalt antall slaktedyr for de siste 10 driftsårene. Slaktedyr til eget forbruk og privat omsetning, basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmeldinger, er medregnet.

REINBEITEOMRÅDE	TOTALT ANTALL SLAKTEDYR									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25 ¹
ØST-FINNMARK	26 530	31 391	16 278	29 118	26 468	18 601	26 642	21 292	23 998	20 218
Polmak/Varanger	13 119	14 941	6 328	13 242	11 977	9 951	13 432	10 529	11 250	10 283
Karasjok østre sone	5 021	7 968	2 662	5 311	6 246	3 378	5 496	4 412	4 444	3 849
Karasjok vestre sone	8 390	8 482	7 288	10 565	8 245	5 272	7 714	6 351	8 304	6 086
VEST-FINNMARK	30 584	26 984	22 865	23 924	26 497	16 174	20 012	19 359	23 204	20 908
Kautokeino østre sone	7 630	8 524	5 418	7 018	8 321	4 529	6 515	6 969	7 610	7 625
Kautokeino midtre sone	11 769	10 399	9 578	9 518	9 890	6 703	7 719	7 743	10 136	8 426
Kautokeino vestre sone	11 185	8 061	7 869	7 388	8 286	4 942	5 778	4 647	5 458	4 857
TROMS	1 898	2 071	1 615	1 991	2 192	1 671	2 067	2 378	2 318	2 126
NORDLAND	2 415	2 420	2 117	2 439	2 167	1 698	1 864	1 917	1 895	1 612
NORD-TRØNDELAGE	5 383	4 802	5 250	5 227	4 212	4 305	4 287	4 639	4 067	4 416
SØR-TRØND./HEDM.	7 277	6 348	7 646	8 291	6 979	6 536	8 201	7 777	8 037	7 550
REINLAGENE	7 313	4 210	7 403	6 464	7 546	7 147	7 460	7 425	7 131	7 377
HELE REINDRIFTEN	81 400	78 226	63 174	77 454	76 061	56 132	70 533	64 787	70 650	64 207

Landbruksdirektoratet 2025

¹ Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 9.

Øst- og Vest-Finnmark har den siste ti-årsperioden hatt stor variasjon i slakteuttak og slaktekvantum. Antall slaktedyr i Øst-Finnmark har variert fra 16 278 til 31 391 dyr totalt i 10- års perioden. Siste endring fra 2023/24 til 2024/25 har vært fra 23 998 slaktedyr til 20 218, en nedgang på 16%. Slaktekvantum for Øst-Finnmark har også hatt stor variasjon i perioden, og fra forrige sesong har det vært en nedgang på 11% (fra 503 til 446 tonn).

For Vest-Finnmark har antallet slaktedyr variert fra 16 174 til 30 584 i løpet av 10-årsperioden. Fra sesong 2023/24 til 2024/25 har antall slaktedyr gått ned fra 23 204 til 20 908, en nedgang på 10%. Vest-Finnmark produserte i 2023/24 et slaktekvantum på 497 tonn, mens i 2024/25 var slaktekvantumet på 463 tonn. Dette gir en nedgang på 7% fra 2023/24 til 2024/2025.

Generelt sett har tallene på både antall slaktedyr og slaktekvantum i Finnmark for 2024/2025 vært noe av det laveste vi har sett i hele tiårsperioden. Denne observasjonen, samt de større variasjonene mellom år vi har sett i Finnmark nylig, kan ha sammenheng med de hyppige beitekrisene som har rammet Finnmark de siste årene.

Tabell 5.2. Totalt slaktekvantum for de siste 10 driftsårene. Slaktedyr til eget forbruk og privat omsetning, basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding, er medregnet.

REINBEITEOMRÅDE	TOTALT SLAKTEKVANTUM (tonn)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25 ^{1,2}
ØST-FINNMARK	580	687	360	598	548	412	565	487	503	446
Polmak/Varanger	295	334	152	283	266	332	294	245	245	233
Karasjok østre sone	110	179	60	109	127	75	113	100	96	86
Karasjok vestre sone	175	174	148	203	152	117	158	142	161	128
VEST-FINNMARK	562	548	430	441	490	324	397	444	497	463
Kautokeino østre sone	150	175	111	133	169	97	142	162	163	173
Kautokeino midtre sone	212	209	177	173	177	134	156	176	211	180
Kautokeino vestre sone	200	164	142	135	143	93	99	106	123	110
TROMS	45	60	43	50	57	44	59	69	64	63
NORDLAND	70	75	64	68	64	51	59	65	58	50
NORD-TRØNDELAG	144	125	135	126	97	110	104	111	99	107
SØR-TRØND./HEDM.	192	170	182	199	157	155	199	194	197	187
REINLAGENE	214	115	222	188	221	210	218	224	209	220
HELE REINDRIFTEN	1 808	1 776	1 435	1 683	1 640	1 306	1 601	1 595	1 626	1 536

Landbruksdirektoratet 2025


- 1 Kvantum privatslakt er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlige slaktevekter og oppgitt privat uttak.
- 2 Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 9.

Figur 5.1 viser at for Troms og Nordland (mørkegrønn og mørkeblå stiplede linje) har prosentvis slakteuttak av vårflokk på lang sikt vært betydelig lavere enn i øvrige områder. En stor del av forklaringen på dette er utfordrende vinterbeiteforhold og tap til rovvilt. Slakteuttaket har tidligere vært en del høyere i Nordland enn i Troms, men dette har endret seg i løpet av de siste driftsårene. Man må tilbake til begynnelsen av 80-tallet for å finne et tilsvarende lavt prosentvis slakteuttak i Nordland som for den siste tiårsperioden.

Nord-Trøndelag hadde i perioden 2009/10 til 2013/14 det laveste prosentvise slakteuttaket siden begynnelsen av 1980-tallet. Store kalvetap over flere år utgjør en vesentlig del av årsaken til reduksjonen i slaktekvantum og slakteprosent. Siden bunnåret i 2012/13 har Nord-Trøndelag hatt en økning til i underkant av 40%. Senere har det prosentvise slakteuttaket igjen gått ned, og det prosentvise slakteuttaket har i løpet av de fem siste driftsårligget på 29-33% for Nord-Trøndelag.

Reinlagene har over tid hatt det høyeste prosentvise slakteuttaket i landet, og slakteuttaket har holdt seg stabilt. Viktige årsaker til dette er at tapene i reinlagene har vært lave og at kalvetilgangen fortsatt er høy (se figur 6.1, 7.1 og 7.2). Av figur 5.1 fremkommer det at også Sør-Trøndelag/Hedmark over tid har hatt et høyt prosentvis slakteuttak. Dette har sammenheng med god kalvetilgang og en høy andel kalv i slakteuttaket. Trenden med et høyt prosentvis slakteuttak i reinlagene og i Sør-Trøndelag/Hedmark har vært gjeldende helt siden tidlig på 1980-tallet. Polmak/Varanger har også over flere år hatt et høyt prosentvis slakteuttak, men med mindre stabilitet da det var en større nedgang i 2014/15 samt i 2017/18.

Fra sesong 2023/24 til 2024/25 har alle soner og områder utenom Kautokeino østre sone, Nord-Trøndelag og reinlagene, hatt en nedgang i prosentvis slakteuttak. Størst nedgang i slakteuttaket siden fjoråret målt i prosentpoeng var i Karasjok vestre sone (nedgang fra 33% til 24%), mens høyeste økning i prosentpoeng fra året før var i Reinlagene (økning fra 62% til 70%).



Figur 5.1. Prosentvis slakteuttak for de siste 10 driftsårene. Uttaket er beregnet i % av reintall ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars). Slaktedyr til eget forbruk og privat omsetning, basert på opplysninger fra reieneiernes reindriftsmelding, er medregnet. Tilsvarende data på distriktsnivåer er gitt i vedlegg 2-8, tabell 9.

5.2 Produktivitet

Produktivitet oppgis henholdsvis som slakteproduksjon per livrein og totalproduksjon per livrein. Med slakteproduksjon per livrein menes slakteuttak i kilo per livrein i vårflokk for driftsåret. Med

totalproduksjon menes slakteuttak i kilo per livrein hvor det også er korrigert for endringer i reintallet, fra driftsårets start til driftsårets slutt, omregnet til kg. Dersom reintallet et år ikke endrer seg, vil de to produktivetsberegningene gi samme resultat.

Totalproduksjon og slakteproduksjon relatert til reintall kan fortelle mye om hvordan tilpasningen mellom rein og beite er i et område. Eksempelvis vil en høy totalproduksjon per livrein ofte innebære god kalvetilgang, lave tap og gode slaktevekter, mens en lav totalproduksjon per livrein gir signaler om lav kalvetilgang, høye tap og/eller lave slaktevekter.

Selv om det er en sammenheng mellom de to produktivetsmålene, kan en noe forenklet si at totalproduksjon per livrein er et mål for hvor effektiv en reinflokk er til å produsere reinkjøtt. Når en snakker om produktivitet, er maksimalt varig avkastning et sentralt begrep. Med maksimalt varig avkastning menes den tilpasning mellom reintall, beitegrunnlag og driftsform som gir den høyeste stabile avkastningen over tid uten å forringe beitegrunnlaget.

Tabell 5.3 viser produktivitet per livrein for de siste fem årene, beregnet både på grunnlag av slakteproduksjon og totalproduksjon. Beregningen for det siste året (2024/25) bygger på reintall som ikke er korrigert og må derfor betraktes som et foreløpig anslag.

Tabell 5.3 viser at det er betydelige forskjeller i produktivitet mellom områder og mellom år, samt innenfor de enkelte områdene. Variasjonene fra år til år er en naturlig konsekvens av at reindrift utøves under uforutsigbare klimatiske forhold. Variasjonen mellom år er imidlertid ikke like stor i alle områdene.

Tabell 5.3. Produktivitet relatert til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars), de siste fem driftsårene. Produktiviteten er beregnet på grunnlag av både «slakteproduksjon» og «totalproduksjon» (slakteproduksjon korrigert for endring i reintallet omregnet til kg). Basert på opplysninger fra reineierens reindriftsmelding og slakteriene.

REINBEITEOMRÅDE	SLAKTEPRODUKSJON					TOTALPRODUKSJON				
	PR. LIVREIN (kg pr. dyr)					PR. LIVREIN ¹ (kg pr. dyr)				
	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25 ¹	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25 ^{1,2}
ØST-FINNMARK	5,8	7,8	6,7	7,0	6,2	6,2	7,8	6,4	7,6	6,5
Polmak/Varanger	8,8	11,6	10,0	10,1	9,5	8,8	11,0	9,5	10,6	8,7
Karasjok østre sone	3,3	4,7	4,2	4,4	3,8	5,0	4,4	2,3	4,6	4,0
Karasjok vestre sone	5,0	6,9	5,9	6,4	4,9	4,5	7,6	7,4	7,3	6,5
VEST-FINNMARK	4,1	5,1	5,7	6,4	6,0	3,9	5,2	5,4	6,2	6,1
Kautokeino østre sone	4,2	6,4	7,2	7,1	7,9	3,6	6,6	7,2	6,0	7,4
Kautokeino midtre sone	4,2	4,8	5,4	6,8	5,8	4,5	4,8	4,8	6,5	5,8
Kautokeino vestre sone	3,9	4,3	4,5	5,2	4,5	3,3	4,3	4,5	6,0	5,4
TROMS	3,6	4,8	5,4	5,1	4,9	3,3	6,0	5,2	5,8	5,5
NORDLAND	3,6	4,2	4,6	4,2	3,6	3,7	4,3	4,3	3,7	3,7
NORD-TRØNDELAG	7,8	7,4	8,0	7,0	7,6	7,6	7,1	8,3	6,7	7,5
SØR-TRØND./HEDM.	11,2	14,3	13,9	14,0	13,3	11,4	14,4	14,3	13,9	13,4
REINLAGENE	17,7	20,5	19,0	18,2	20,8	19,4	18,3	21,5	20,0	20,6
HELE REINDRIFTEN	6,0	7,4	7,3	7,6	7,1	6,1	7,4	7,1	7,7	7,3

Landbruksdirektoratet 2025

1 Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tab. 9.

2 Foreløpig tall hvor reintallsendringen er beregnet på grunnlag ukorrigert reintall for det siste året.

I hele reindriften var det for driftsåret 2024/25 en nedgang i slakteproduksjon og totalproduksjon fra forrige driftsår (tabell 5.3). I et femårsperspektiv er årets tall på slakteproduksjon lik gjennomsnittet for perioden (7,1), mens årets tall på slakteproduksjon (7,3) er litt over snittet for perioden (7,1). Slakteproduksjonen og totalproduksjonen gikk fra 2023/2024 til 2024/2025 ned for hele Øst-Finnmark, Kautokeino midtre sone, Kautokeino vestre sone, Troms og Sør-Trøndelag/Hedmark. For

Kautokeino østre sone, Nord-Trøndelag og reinlagene har både slakteproduksjonen og totalproduksjonen økt siden året før. For Nordland økte slakteproduksjonen, mens totalproduksjonen holdt seg stabil.

I et femårsperspektiv fra 2020/2021 og til i dag er Polmak/Varanger sitt foreløpige tall på totalproduksjon for 2024/2025 (8,7) det laveste de har hatt gjennom perioden (tabell 5.3). For Karasjok vestre sone er årets tall på slakteproduksjon (4,9) også det laveste de har hatt gjennom femårsperioden. Nordland i år har sitt laveste tall på slakteproduksjon (3,6, likt tallet fra 2020/2021) og totalproduksjon (3,7, likt tallene fra 2020/2021 og 2023/2024) gjennom femårsperioden. Kautokeino østre sone, derimot, har i år sitt høyeste tall på både slakteproduksjon (7,9) og totalproduksjon (7,4) gjennom perioden. Og for reinlagene er også årets tall på slakteproduksjon (20,8) det høyeste de har hatt i hele femårsperioden.

Fôring av rein

Fôring av rein har betydning for overlevelse, tap og kalvetilgang, og påvirker dermed produktiviteten i flokken. Ved beitekriser er fôring av rein et vanlig tiltak som del av beredskapen.³⁸ Fôringen kan både være i form av kraftfôr og annet fôr (som rundballer). Det er ikke innhentet tall på fôring fra rundballer. Tabell 5.4 gir en oversikt over mengden kraftfôr solgt av Felleskjøpet og Fiskå Mølle i en seksårsperiode, fra 2020 – 2025. Toppåret i seksårsperioden er samlet sett, samt for både Troms og Finnmark og for Trøndelag, i år (2025) med 7 902 tonn solgt kraftfôr totalt. For Nordland var det høyeste salget av kraftfôr i 2022. Troms og Finnmark har alle seks årene kjøpt mest fôr, og Trøndelag minst. Gjennomsnittet for hele seksårsperioden ligger på 5 786 tonn solgt kraftfôr.

Tabell 5.4. Antall solgte tonn reinfôr fra Felleskjøpet og Fiskå mølle fordelt på årstall og fylke, i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag. Dataene er hentet fra Felleskjøpet og Fiskå mølle. Tallene fra Felleskjøpet som ble publisert i fjorårets utgave av ressursregnskapet, ble korrigert tilbake i tid i mars 2025 av Felleskjøpet.

Fylke	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Troms og Finnmark	4 389	1 718	6 711	2 734	6 408	6 957
Nordland	825	628	1 099	945	1 089	842
Trøndelag	40	40	45	66	77	103
Totalt	5 254	2 386	7 855	3 745	7 574	7 902

*Per 31.10.2025

Målet med å ha et beredskapssystem i reindriften, som inkluderer tiltak som fôring, er å bedre dyrevelferd, overlevelse og framtidig produksjon.³⁸ Dersom tilleggsfôringen i år med vanskelige beiteforhold fungerer etter hensikt vil den altså bidra til å sikre produktiviteten i reindriften disse årene.

³⁸ Beredskap i Reindriften. Landbruksdirektoratet. [Beredskap i reindriften - Landbruksdirektoratet](#)

6 Kalvetilgang og slakteveker

Årlig kalvetilgang og slakteveker varierer markant mellom reinbeiteområdene i Norge. Dette er forskjeller som har vært gjeldende over tid og skyldes blant annet ulike driftsbetingelser og ulik driftstilpasning til disse betingelsene. Utviklingen i årlig kalvetilgang og slakteveker er viktige indikatorer for å vurdere økologisk og økonomisk bærekraft i reindriftsnæringen.

Videre følger en redegjørelse over de siste års utvikling av tilvekst og slakteveker som danner utgangspunktet for årlig produksjon, slakteuttak og økonomisk inntjening.

6.1 Utvikling i slakteveker

Siden sesongen 1998/99 er det systematisk innhentet slakteveker fra slakteriene. Slaktevektene er sammen med andel merket kalv og slakteuttak per livrein, utgangspunktet for vurdering av om reintallet og beitebelastningen er økologisk bærekraftig for et reinbeitedistrikt.

Landbruks- og matdepartementet nedsatte i 2008 et utvalg som skulle utarbeide kriterier for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall. Utvalget besto av deltagere fra reindriftsnæringen, forskere, Reindriftsforvaltningen og Landbruks- og matdepartementet. Kriteriene skal være et hjelpemiddel både for næringen og myndighetene i arbeidet med å fastsette et bærekraftig reintall. For de ulike kriteriene følger det normer for måloppnåelse ved et økologisk bærekraftig reintall. Kriteriene for å vurdere økologisk bærekraftig reintall er variasjon i kalveprosent, kjøttavkastning per livrein i vårflokk (slakteuttak) og gjennomsnittlig slaktevekt for kalv, simle over 2 år og okse 1-2 år.

Normene for å fastsette et bærekraftig reintall er som følger:

- Normen for variasjon i kalveprosent på høsten (andel kalv i forhold til andel voksne simler) er fastsatt til å være innenfor 10-15 % mellom ulike driftsår.
- Normen for gjennomsnittlig slakteuttak per livrein i vårflokk er satt til minst å være mellom 8 og 9 kg.
- Normene for gjennomsnittlige slakteveker er 17-19 kg for kalv, 25-27 kg for okse 1-2 år og 27-29 kg for simler over 2 år. Det skal også være samsvar mellom disse kriteriene når reintallet skal fastsettes.

Verdier som er under norm over flere år indikerer at reintallet er for høyt for det gjeldende reinbeitedistrikt.³⁹ Vedlegg 9 gir en oversikt over gjeldende rammebetingelser for de ulike reinbeitedistriktene, herunder også gjeldende øvre reintall.

Tabellene 6.1, 6.2 og 6.3 viser tidsserier av gjennomsnittlige slakteveker både for kalv, okser 1-2 år (*varit*) og simler over 2 år (*aldu/rotnu*). Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 11-14.

³⁹ Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall, desember 2008, Landbruks- og Matdepartementet.

Tabell 6.1. Gjennomsnittlige slaktevekter på kalver som er levert slakteri, de siste 10 driftsårene.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (<i>miessi/miesie</i>) (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
ØST-FINNMARK	19,5	19,9	18,0	18,6	19,0	18,8	18,9	19,6	18,8	18,4
Polmak/Varanger	20,6	21,0	19,5	19,6	20,1	19,2	19,7	20,1	20,0	19,2
Karasjok østre sone	19,5	19,8	17,9	18,7	18,9	18,3	18,4	19,0	18,7	18,2
Karasjok vestre sone	17,5	17,9	16,7	17,0	17,1	18,4	18,1	19,1	17,2	17,1
VEST-FINNMARK	16,5	17,2	16,1	16,8	16,9	16,7	17,5	18,9	17,6	18,3
Kautokeino østre sone	18,1	18,2	17,8	17,6	18,5	18,0	19,3	19,6	18,1	19,1
Kautokeino midtre sone	15,9	16,5	15,5	16,4	16,4	16,4	17,2	18,5	17,3	17,7
Kautokeino vestre sone	15,9	16,7	15,7	16,7	15,9	15,7	15,7	18,2	17,5	18,1
TROMS	22,8	23,5	23,3	22,9	21,8	22,3	22,4	23,3	22,7	22,2
NORDLAND	21,7	23,0	22,1	21,8	21,9	21,8	21,9	21,7	22,4	21,2
NORD-TRØNDELAGE	19,8	21,0	20,3	19,7	19,7	19,8	19,7	19,8	19,7	19,8
SØR-TRØND./HEDM.	21,3	22,3	20,4	20,2	19,7	19,9	20,4	21,5	20,6	21,2
REINLAGENE	24,4	24,0	25,2	23,9	24,2	24,8	24,6	25,6	24,6	25,7
HELE REINDRIFTEN	19,0	19,6	18,8	18,9	18,8	19,4	19,4	20,5	19,4	19,8

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 6.2. Gjennomsnittlige slaktevekter på okser 1-2 år som er levert slakteri, de siste 10 driftsårene.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (<i>varit</i>) (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
ØST-FINNMARK	26,7	28,5	28,2	27,2	26,7	27,7	27,4	28,4	27,5	27,8
Polmak/Varanger	27,4	30,5	30,5	28,7	28,4	28,0	28,6	29,7	31,0	29,7
Karasjok østre sone	27,4	29,9	28,1	28,2	27,0	28,2	26,9	27,2	27,5	27,5
Karasjok vestre sone	24,7	26,0	26,1	26,0	24,0	26,3	24,4	26,9	24,8	25,6
VEST-FINNMARK	23,1	25,0	26,8	25,1	24,2	26,1	26,0	27,3	26,6	26,8
Kautokeino østre sone	26,6	25,8	27,2	23,9	23,7	27,9	27,2	25,6	26,2	26,8
Kautokeino midtre sone	23,3	25,2	27,2	25,6	24,3	26,3	28,4	28,5	26,7	27,8
Kautokeino vestre sone	22,0	23,7	23,6	25,4	24,4	24,1	21,2	26,0	26,5	26,2
TROMS	33,4	33,4	36,1	32,3	33,9	32,8	34,2	37,4	34,0	34,2
NORDLAND	36,9	36,6	36,5	36,4	34,2	34,4	40,1	35,6	35,6	41,6
NORD-TRØNDELAGE	29,3	31,6	29,9	29,6	28,7	29,5	28,7	28,8	29,2	28,6
SØR-TRØND./HEDM.	33,0	33,3	30,6	31,7	31,6	30,5	31,9	33,7	33,1	33,1
REINLAGENE	39,5	38,9	40,9	38,8	40,4	39,0	40,4	42,1	41,2	40,2
HELE REINDRIFTEN	30,5	30,6	32,5	31,7	31,8	31,8	34,1	33,8	33,9	33,2

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 6.3. Gjennomsnittlige slaktevekter på simler over 2 år som er levert slakteri, de siste 10 driftsårene.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (aldu/rotmu) (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
ØST-FINNMARK	29,4	30,4	30,4	29,4	28,5	30,9	28,4	32,3	31,3	31,6
Polmak/Varanger	31,6	32,2	33,6	30,9	30,8	32,1	29,9	34,3	32,1	32,6
Karasjok østre sone	29,8	30,9	31,3	29,8	28,4	31,2	27,7	30,0	29,2	31,0
Karasjok vestre sone	26,4	27,5	27,1	27,6	25,8	28,8	26,4	29,2	26,3	28,4
VEST-FINNMARK	25,2	28,2	26,4	27,6	26,4	28,4	26,7	29,9	27,2	29,1
Kautokeino østre sone	28,5	29,6	29,6	28,4	27,8	29,1	27,2	31,4	26,8	30,8
Kautokeino midtre sone	24,3	26,9	24,9	27,2	25,5	28,3	27,0	29,8	27,0	27,6
Kautokeino vestre sone	24,8	28,8	26,2	27,3	25,7	27,7	24,6	28,8	27,9	29,1
TROMS	36,1	36,9	38,0	36,6	36,5	37,8	35,5	36,9	36,8	36,2
NORDLAND	34,4	35,6	35,3	34,4	35,9	34,9	34,6	34,5	35,5	33,3
NORD-TRØNDELAGE	32,6	33,6	33,8	32,7	32,3	33,7	32,1	33,1	32,4	31,2
SØR-TRØND./HEDM.	34,2	33,9	32,6	33,2	33,0	34,6	34,3	35,1	34,1	34,1
REINLAGENE	39,7	38,6	39,1	38,7	40,3	40,2	40,8	41,0	39,8	39,4
HELE REINDRIFTEN	30,2	30,7	31,0	30,7	29,9	32,2	31,1	33,2	31,2	32,3

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 6.1 - 6.3 viser en økning i gjennomsnittlige slaktevekter for kalv og for simle over 2 år i 2024/2025 sammenlignet med forrige driftsår. For okse 1-2 år var det en liten nedgang i gjennomsnittlige slaktevekter sammenlignet med fjoråret. I alle tilfellene var gjennomsnittlig slaktevekt i 2024/2025 (19,8 kg for kalv, 33,2 kg for okse 1-2 år og 32,3 kg for simle over 2 år) høyere enn gjennomsnittet over hele tiårsperioden (19,4 kg for kalv, 32,3 kg for okse 1-2 år og 31,2 kg for simle over 2 år). Variasjoner i slaktevekter mellom år kan blant annet skyldes variasjoner i beiteforhold forutgående vinter og sommeren før, og/eller variasjoner i insektsplager. Lave slaktevekter over år indikerer for høyt reintall i forhold til beitegrunnlaget. De siste årene er det en liten økning i slaktevektene flere steder i Finnmark, noe som kan ha sammenheng med økt bruk av fôr på vinteren.

Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområde

De laveste slaktevektene forekommer i de distriktene som over tid også har hatt de største utfordringene med høy dyretetthet, store tap og et lavt slakteuttak.

Det fremheves at det er stor spredning i gjennomsnittlige slaktevekter mellom de ulike sommerbeitedistriktene/sommersiidaene i Vest-Finnmark og Karasjok. Noen av sommerbeitedistriktene har slaktevekter og et reintall som er i samsvar med en økologisk bærekraftig reindrift. Flere av sommerbeitedistriktene har imidlertid hatt slaktevekter som har ligget under den nedre normen for en økologisk bærekraftig reindrift tidlig i tiårsperioden, noe som indikerer et for høyt reintall i forhold til beitenes bæreevne.

Polmak/Varanger hadde i 2024/2025 (sammen med i 2020/2021) de laveste gjennomsnittlige slaktevektene for kalv de har hatt gjennom hele tiårsperioden (19,2 kg). Kautokeino vestre sone hadde i 2024/2025 de høyeste gjennomsnittlige slaktevektene på simle over 2 år gjennom perioden (29,1 kg).

Områdene sør for Finnmark

Områdene sør for Finnmark har generelt sett høyere gjennomsnittlige slaktevekter enn Øst- og Vest-Finnmark (se tabellene 6.1, 6.2 og 6.3). Variasjoner i slaktevektene i områdene sør for Finnmark kan skyldes naturlige årlige variasjoner i klima, samtidig som vedvarende lave vekter også kan forklares gjennom beitetilgang, beitekvalitet og reintall. De høyeste slaktevektene over tid er i reinlagene. For siste driftsår var gjennomsnittsvektene på kalv, okser 1-2 år og simler over 2 år i reinlagene henholdsvis 25,7 kg, 40,2 kg og 39,4 kg.


Nordland hadde i 2024/2025 de laveste gjennomsnittlige slaktevektene på kalv (21,2 kg) og simle over 2 år (33,3 kg) gjennom hele tiårsperioden. Samtidig hadde Nordland også de høyeste gjennomsnittlige slaktevektene på okse 1-2 år (41,6 kg) gjennom hele perioden. Reinlagene hadde i 2024/2025 de høyeste gjennomsnittlige slaktevektene på kalv gjennom perioden (25,7 kg). Nord-Trøndelag hadde i 2024/2025 de laveste gjennomsnittlige slaktevektene på okse 1-2 år (28,6 kg) og simle over 2 år (31,2 kg) gjennom tiårsperioden.

6.2 Kalvetilgang

Simlen sin kondisjon har betydning for selve kalvingsresultatet, som igjen påvirker hvor mange kalver som kan slaktes. Samtidig vil en simle som mister kalven tidlig i sesongen kunne bygge kondisjonen og ha større mulighet for å bære fram kalv påfølgende sesong. Dermed vil man stort sett kunne forvente en god kalvetilgang året etter en dårlig kalvingssesong.

Figur 6.1 viser kalvetilgang etter tap for de fem siste driftsår. De oppgitte tallene er gitt som «kalv etter tap». Kalv etter tap er den andelen kalv som enten går til slakt eller til påsett i forhold til antall voksne simler i vårflokk. Dette gir en indikasjon på hvor stor del av kalveproduksjonen som reineier sitter igjen med i form av slaktedyr og kalver til nyrekruttering i flokken. I vedlegg 1-8 (tabell 4) gis det også en oversikt over andel født og merket kalv på områdenivå og distriktsnivå.

Best resultat i kalvetilgang etter tap gjennom de siste fem driftsårene er i reinlagene (86-91%) etterfulgt av Sør-Trøndelag/Hedmark (69-80%). Forskjellene mellom områder i antall kalver etter tap kan i hovedsak tilskrives forhold som klima, rovvilttap eller dyretetthet avhengig av hvilke regionale utfordringer som gjør seg mest gjeldene.




Figur 6.1. Kalver etter tap (antall kalver til slakt og til påsett) for de siste fem driftsårene. Beregnet i % av antall simler ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars). Basert på opplysninger fra reieneiernes reindriftsmelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 4.

7 Tap av rein

Tap av rein er en utfordring for mange i reindriftsnæringen, da det negativt påvirker produksjon, lønnsomhet og dyrevelferd i næringen. For å kunne ha en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindriftsnæring er det derfor et mål at tapet av rein reduseres. I sine reindriftsmeldinger oppgir reineierne hvor stort tap de har hatt totalt i driftsåret. Omfanget av reineiernes oppgitte tap av rein for de 5 siste driftsårene er vist i figur 7.1 og 7.2. Tapstallene er tall som reineier årlig gir på skjemaet «Melding om reindrift».⁴⁰


Figur 7.1 viser at reinlagene har hatt de laveste oppgitte kalvetapene over tid, etterfulgt av Sør-Trøndelag/Hedmark og Polmak/Varanger. Kalvetapene i Øst-Finnmark var for siste driftsår (2024/2025) mellom 32% og 56% i Polmak/Varanger, Karasjok østre sone og Karasjok vestre sone. Kalvetapene i de tre sonene i Vest-Finnmark var for 2024/2025 mellom 46 % og 52 %.



Figur 7.1. Tap av kalv for de siste fem driftsårene. De prosentvise tapene er beregnet i forhold til antall fødte kalver. Basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 5.

Troms og Nordland har over tid hatt de høyeste oppgitte tapene både av kalv og voksne dyr (figur 7.1 og 7.2). Prosentvis tap av kalv for disse områdene har vært på 53-62% gjennom alle fem driftsår. Økningen i tap av voksne dyr i 2022/2023 for Karasjok østre sone kan skyldes at ett distrikt i dette reindriftsåret har meldt inn et tilnærmet dobbelt så stort tap av voksne dyr som året før (2021/2022).


⁴⁰ Eventuelle korreksjoner i reintallet skjer på påfølgende års melding. Dersom reintallet i sluttstatus på meldingen seinere blir korrigert opp får det som konsekvens at det tidligere oppgitte reintroppet korrigeres ned. Denne korreksjonen er det ikke tatt hensyn til i tabellen, slik at tapstallene i de tilfeller der reintroppet er korrigert opp blir for høye (og motsatt i de tilfeller der reintroppet er korrigert ned). Korreksjoner er som regel et resultat av offentlig kontrollert reintropping.



Figur 7.2. Tap av voksne dyr de siste fem driftsårene. De prosentvise tapene er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars). Basert på opplysninger fra reieneiernes reindriftsmelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 5.


Rein tapes av flere årsaker hvorav de viktigste anses å være rovdyr, sykdom, ernæringsvikt eller ulykker. I søknad om erstatning for rovvilttap oppgir reieneierne hvor stor del av det totale tapet de antar er forårsaket av fredet rovvilt og hvor stor del av tapet som skyldes andre årsaker enn rovvilt, fordelt på kjente og ukjente årsaker. Figur 7.3 og 7.4 viser tap som reieneierne har oppgitt, fordelt på kategoriene tap til fredet rovvilt, tap av rein til annen kjent årsak og tap av rein til annen ukjent tapsårsak for reindriftsåret 2024/2025.

Figur 7.3 viser at for alle reindriftsområder er den viktigste årsaken til kalvetap rovvilt i 2024/2025. Av totaltapet for kalver i hele reindriften, ble 91% meldt å være tapt til rovvilt. For annen kjent årsak var denne andelen på 3%, og for annen ukjent årsak på 6%.



Figur 7.3. Tap av kalver fordelt på årsak (fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak) som andel av det totale tapet. Basert på opplysninger fra reieneiernes reindriftsmelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 6.

Figur 7.4 viser at også for voksne dyr er andelen meldt tapt til rovvilt stor for alle områder i 2024/2025. Det er kun for Kautokeino østre sone (64%), Karasjok vestre sone (67%) og reinlagene (68%) at denne andelen er lavere enn 70 %. For hele reindriften samlet ble 79% av voksne dyr som ble meldt tapt, meldt tapt til rovvilt. 11% av tapte voksne dyr ble meldt tapt til andre kjente tapsårsaker, mens 10% ble meldt tapt til andre ukjente tapsårsaker.



Figur 7.4. Tap av voksne dyr fordelt på årsak (fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak) som andel av det totale tapet. Basert på opplysninger fra reineierens reindriftsmelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 6.

7.1 Tap av rein til rovvilt

Rovviltpolitikken har en todelt målsetting, der både rovvilt og beitenæring skal ivaretas. Bakgrunnen for denne målsettingen kommer fra Rovviltforliket som ble inngått i 2011, som er en videreutvikling av det første rovviltforliket vedtatt i 2004. Bestemmelsene i naturmangfoldloven danner en ramme for hvordan rovviltforvaltningen skal skje. Norge forpliktet seg også internasjonalt i 1986 til beskyttelse av rovvilt, gjennom undertegnelsen av Bernkonvensjonen som først ble vedtatt i 1979.

Den todelte rovviltpolitikken i Norge er til dels konfliktfylt, og en av årsakene til dette er mangel på objektive data rundt andelen rein som tapes til rovvilt. I tillegg til dokumenterte tap, må tap av rein til rovvilt kunne sannsynliggjøres gjennom undersøkelser eller andre omstendigheter for at det skal kunne utbetales erstatning til reieiere.⁴¹ Men for bare ca. 5% av rein det blir søkt rovvilterstatning for er det mulig å fastslå dødsårsaken.⁴² I arbeidet med erstatningsutmåling gjør forvaltningen skjønnsmessige vurderinger av flere forhold som påvirker tapsbildet. Dette understreker behovet for enda sikrere tall på antall rein drept av rovvilt.

Generelt er utbetaling av erstatning for rein tapt til rovvilt en viktig del av det økonomiske bildet i reindriften. For reindriftsåret 2023/2024 ble det totalt utbetalt 107,2 millioner kr til erstatning av rein tapt til rovvilt.⁴³ Det er likevel et stort sprik mellom hvor mye rein som blir omsøkt tapt til rovvilt og hvor mye som faktisk blir erstattet. For reindriftsåret 2023/2024 ble det omsøkt rovvilterstatning for 90% av all tapt rein i reindriftnæringen, hvorav 29% av det omsøkte tapet ble erstattet (tilsvarende 26% av det totale tapet).⁴³

⁴¹ Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt, 2001, §7-8


⁴² Mattisson, Jenny, et al. "Gaup og jerv i reinbeiteland. Sluttrapport for Scandlynx Troms og Finnmark 2007-2014." (2015).

⁴³ Rovbase (Miljødirektoratet).

Fordelingen av tap til fredet rovvilt


I tillegg til å oppgi hvor mange rein som går tapt til fredet rovvilt, oppgir også reineierne hvilket fredet rovvilt de mener reinsdyrene ble tapt til (ulv, bjørn, kongeørn, jerv eller gaupe). Figur 7.5 og 7.6 viser fordelingen av all rein meldt tapt til fredet rovvilt, fordelt på ulv, bjørn, kongeørn, jerv og gaupe, for reindriftsåret 2024/2025.

Figur 7.5 viser at samlet sett er kongeørn det fredede rovviltet som klart flest kalver ble meldt tapt til i 2024/2025, med en tapsandel på 49% i hele reindriften. I alle områder utenom Nordland og Nord-Trøndelag er kongeørn meldt å være det rovviltet som tar mest kalv. I Nordland er det i stedet gaupe som tar mest kalv (35%), mens i Nord-Trøndelag er det jerv (44%). Gaupe og jerv tar også mye kalv i andre områder, med tapsandeler i hele reindriften på henholdsvis 23% og 25%. For gaupe er kalvetapet klart lavest i reinlagene (5%), mens for jerv er kalvetapet lavest i Kautokeino østre sone (13%), Troms (14%) og reinlagene (14%). Bjørn og ulv er samlet sett de minst vanlige tapsårsakene for kalv, med tapsandeler på henholdsvis 2% og 1% i hele reindriften samlet. Kalvetap til ulv er mest vanlig i Polmak/Varanger (8%), og kalvetap til bjørn er mest vanlig i Sør-Trøndelag/Hedmark (8%).



Figur 7.5. Tap av kalver til rovvilt fordelt på rovvilt (ulv, bjørn, kongeørn, jerv og gaupe) som andel av det totale rovvilttapet. Basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 6.


Figur 7.6 viser at det er jerv som meldes å ha tatt flest voksne reinsdyr i 2024/2025, med en tapsandel på 46% i hele reindriften. Deretter kommer gaupe med en tapsandel på 40% i hele reindriften. Jerv er rovviltet som meldes å ha tatt flest voksne dyr i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark, reinlagene, Kautokeino østre sone, Kautokeino vestre sone og i hele Øst-Finnmark (Polmak/Varanger og Karasjok østre og vestre sone). Gaupe er mest vanlig i Troms og Kautokeino midtre sone. I Nordland meldes jerv og gaupe til å ha tatt flest voksne dyr (begge med like store tapsandeler på 47%). Samlet sett meldes bjørn til kun å ha tatt 3% av voksne dyr, med høyest andel i Sør-Trøndelag/Hedmark (12%). Kongeørn meldes å ha tatt 9% av rovvilt-tapte voksne dyr i hele reindriften (mest utpreget i Kautokeino østre sone med en tapsandel på 24%). I hele reindriften samlet er det ulv som er minst vanlig, med en tapsandel på kun 2% av rovvilt-tapte voksne dyr. Tap av voksne dyr til ulv er mest utpreget i Polmak/Varanger, med en tapsandel på 12%.



Figur 7.6. Tap av voksne dyr til rovvilt fordelt på rovvilt (ulv, bjørn, kongeørn, jerv og gaupe) som andel av det totale rovvilttapet. Basert på opplysninger fra reieneiernes reindriftsmelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 6.


Overlappet mellom kalvingsområder for rein og prioriterte rovviltområder

Gaupe, jerv, ulv og bjørn har enkelte prioriterte områder (forvaltningsområder) der terskelen er høyere for uttak av rovvilt. For å redusere tapet av rein til rovvilt er det ønskelig at rovviltprioriterte områder ikke inngår i kalvingsområdene for rein. Figur 7.7 og figur 7.8 gir en visuell oversikt over grensene til forvaltningsområdene for rovvilt (for gaupe, jerv, ulv og/eller bjørn) og kalvingsområdene.




Figur 7.7. Overlappet mellom forvaltningsområder for rovvilt (ulv, bjørn, jerv og gaupe) og kalvingsområder for reindriften i Troms og Finnmark. Kartdata er fra Miljødirektoratet (forvaltningsområdene), Landbruksdirektoratet (kalvingsland) og Kartverket (bakgrunnskart).

Forvaltningsområder for rovdyr
(gaupe, jerv, ulv, bjørn) og
kalvingsområder for rein



Figur 7.8. Overlappet mellom forvaltningsområder for rovvilt (ulv, bjørn, jerv og gaupe) og kalvingsområder for reindriften i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark og i konsesjonsområdene. Kartdata er fra Miljødirektoratet (forvaltningsområdene), Landbruksdirektoratet (kalvingsland) og Kartverket (bakgrunnskart).

Figur 7.9 viser dekningsgraden av forvaltningsområder innenfor kalvingslandet for hvert reinbeiteområde. I Nordland (99,8%), Nord-Trøndelag (93,5%) og Sør-Trøndelag/Hedmark (92,4%) dekkes svært store deler av kalvingslandet av forvaltningsområder for rovvilt. Høye overlappstall har vi også for spesielt Reinlagene (69,1%) og Vest-Finnmark (47,8%). Øst-Finnmark og Troms har de laveste tallene (23,8% og 11,1%). I hele reindriften-Norge er andelen kalvingsområder som dekkes av rovvilt-forvaltningsområder på 57,6%. Det at det i noen områder er et veldig stort overlapp mellom rovvilt-forvaltningsområder og kalvingsområder, gir en økt risiko for tap av reinkalver til rovvilt i de gitte områdene.



Figur 7.9. Prosentvis andel (y-aksen) av kalvingsområdene i reindriften som dekkes av forvaltningsområder for rovvilt, fordelt på område (x-aksen). I tillegg vises overlappandelen for hele reindriften som en rød strek i diagrammet. For Sør-Trøndelag/Hedmark er data fra konsesjonsdriften i Trollheimen medregnet. Tallene er regnet ut basert på kartdata fra Miljødirektoratet (forvaltningsområdene) og Landbruksdirektoratet (kalvingsland).

I statistikken om overlappet mellom kalvingsområder og forvaltningsområder for rovvilt (figur 7.7 – 7.9) er ikke kongeørn tatt med, da den ikke har et eget forvaltningsområde slik som de andre aktuelle rovdirene. Likevel mener mange reineiere at tap av kalv til kongeørn i kalvingsperioden er stort problem, noe som gjenspeiles i statistikken over tap som meldes inn (figur 7.5). Et forskningsprosjekt i Sverige fra 2024, som fokuserte på både kongeørn og havørn, fant at forekomsten av ørn var høyere tidlig i kalvingstiden enn tiden før og etter.⁴⁴ Derfor bør også forekomst av kongeørn i kalvingsområdene ses på når risikoen for tap til rovvilt i et område skal vurderes.

Generelt sett peker forskningen også på at kongeørn virker å være viktig i tapsbildet for reinkalv.^{45 46} Samtidig er kongeørns predasjon på rein et av de temaene forvaltningen mangler forskningsbasert

⁴⁴ van der Meiden, Aemilius Johannes, et al. "Interactions between eagles and semidomestic reindeer: lessons learned from field surveys and deterrents." *arXiv preprint arXiv:2405.02381* (2024).

⁴⁵ Nieminen, Mauri, Harri Norberg, and Veikko Majjala. "Mortality and survival of semi-domesticated reindeer (*Rangifer tarandus tarandus* L.) calves in northern Finland." *Rangifer* 31.1 (2011): 71-84.


⁴⁶ Norberg, Harri, et al. "Predation by golden eagle *Aquila chrysaetos* on semi-domesticated reindeer *Rangifer tarandus* calves in northeastern Finnish Lapland." *Wildlife Biology* 12.4 (2006): 393-402.

kunnskap om. Det er blant annet viktig å vite mer om hvor mange kongeørn som fins i de ulike områdene, ørnens drapstakt og deres bevegelse i områder hvor det fins rein. I tillegg er kongeørnen generalist, altså både rovdyr og åtseleter.⁴⁷ Derfor, der kongeørn blir sett med et reinsdyrkadaver, er det også mulig at det ikke var ørnen som drepte dyret.⁴⁴ Det er med på å gjøre det vanskeligere å være sikker på akkurat hvor mange rein som tapes til kongeørn, og på å understreke behovet for mer kunnskap om kongeørn som predator på rein.

7.2 Andre tapsårsaker

I tillegg til å oppgi hvor mange rein som går tapt til andre tapsårsaker (kjente og ukjente) enn fredet rovvilt, oppgir også reineierne hvilke andre tapsårsaker enn fredet rovvilt de mener reinsdyrene ble tapt til (trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak eller annen ukjent årsak). Figur 7.10 og 7.11 viser fordelingen av all rein meldt tapt til andre tapsårsaker enn fredet rovvilt, fordelt på trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak og annen ukjent årsak, for reindriftsåret 2024/2025.


Figur 7.10 viser at for kalver tapt til andre årsaker enn fredet rovvilt, var det mest vanlige at reineierne ikke visste tapsårsaken (annen ukjent årsak), med en andel på 67%. Annen ukjent årsak var dessuten også størst for alle områder og soner enkeltvis. Annen kjent årsak, der reineierne visste årsaken, utgjorde i hele reindriften 9% av kalv tapt til annet enn fredet rovvilt (høyest andel i Nordland). Ulykke utgjorde i hele reindriften en andel på 13% (høyest andel i Kautokeino midtre sone), sykdom utgjorde 7% (høyest andel i Nordland). Trafikk var den minst utpregede årsaken og utgjorde 4% (høyest andel i Polmak/Varanger og Nordland).



Figur 7.10. Tap av kalver til andre årsaker enn rovvilt fordelt på årsak (trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak og annen ukjent årsak) som andel av det totale rovvilttapet. Basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 6.

Figur 7.11 viser at for voksne dyr tapt til andre årsaker enn rovvilt i 2024/2025, var den mest vanlige tapsårsaken annen ukjent årsak, med en andel på 48%. Høyest var andelen i Kautokeino østre sone (72%). Annen ukjent årsak var den mest vanlige tapsårsaken i alle områder utenom Kautokeino vestre sone og Nordland. Deretter følger ulykke (17%), trafikk (16%), annen kjent årsak (14%) og sykdom (5%). I Nordland var trafikk den vanligste årsaken til tap med en andel på 41%, mens i Kautokeino vestre sone var den vanligste årsaken ulykke (53%). Sykdom som tapsårsak hos voksne var mest vanlig i Nord-Trøndelag (53%). Annen kjent årsak var mest utpreget i Karasjok vestre sone (34%).

⁴⁷ Hansen, Inger, Snorre Hagen, and Geir-Harald Strand. "Tap og drapstakter på rein og sau forårsaket av fredet rovvilt. En litteraturgjennomgang." NIBIO Rapport (2023).



Figur 7.11. Tap av voksne dyr til andre årsaker enn rovvilt fordelt på årsak (trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak og annen ukjent årsak) som andel av det totale rovvilttapet. Basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 6.

Også for andre tapsårsaker enn rovvilt er det behov for mer kunnskap og bedre dokumentasjon i reindriften.⁴⁸ Store deler av tapet til andre tapsårsaker enn rovvilt er dessuten tapt av årsaker som er oppgitt som ukjente for reineierne (det gjelder 67% av kalvetapet og 48% av tapet av voksne dyr). Det vil være vanskelig for reineierne å være helt sikker på hva som er tapsårsaken, selv om man har en formening og melder inn det man tenker er årsaken.

⁴⁸ Hansen, Inger, Snorre Hagen, and Geir-Harald Strand. "Tap og drapstakter på rein og sau forårsaket av fredet rovvilt. En litteraturgjennomgang." NIBIO Rapport (2023).

8 Utviklingstrekk i reindriftsnæringen

Det gis her en gjennomgang av reintallsutviklingen som har funnet sted i perioden 1979/80 og frem til i dag for reinbeiteområdene i Norge. Her omtales de generelle virkningene denne utviklingen har hatt for de ulike områdene med hensyn til beitesituasjon, tapsutvikling, potensial for årlig bestandsvekst og produksjon. Hvordan reintettheten på beitearealene og klimatiske faktorer har påvirket driftssituasjonen i de ulike områdene i Finnmark blir også presentert. Det gis en fremstilling av totalt slaktekvantum, totalt antall slaktedyr og gjennomsnittlig reintall i vårflokk for de siste driftsår for de ulike områdene i en egen oversikt. I tillegg gis det en sammenfattende oversikt over de kriterier og indikatorer i henhold til St. Prop. 98 S (2023–2024) som er relevante for ressursregnskapet.

8.1 Reintallsutvikling i Finnmark – Reintetthet og virkninger

Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområde utgjør omtrent 70 % av den samlede reindriften i Norge og er delt inn i seks ulike soner. I Vest-Finnmark utgjør Kautokeino østre sone, midtre sone og vestre sone tre atskilte flyttesystemer. I Øst-Finnmark reinbeiteområde utgjør Karasjok vestre og østre sone to naturlig atskilte flyttesystemer. Lengst øst i ligger Polmak/Varanger hvor man har et eget flyttesystem.


Figur 8.1 viser reintallsutviklingen i de ulike områdene fra 1979/80 og frem til 2024/25 basert på reineiernes årlige innrapporterte reintall gjennom Melding om reindrift. Antallet rein er gitt per 31. mars. Siste års reintall (per 31. mars 2025) må sees på som et foreløpig tall inntil korrigert reintall⁴⁹ foreligger høsten 2026. Figur 4.1⁵⁰ viser at områdene i Finnmark siden begynnelsen på 1980-tallet har hatt den samme hovedtrenden i reintallsutvikling, med en vekst fram til 1988/89, etterfulgt av en generell nedgang fram til 2000/01. Den store beitekrisen som følge av store snømengder i 1997 og 2000 er årsaken til den markerte reintalls nedgangen i Vest-Finnmark og Karasjok øst og vest disse årene. Deretter fulgte en tiårsperiode med vekst utover på 2000-tallet. I etterkant av 2012/13 hadde reintallet en nedgang i alle områdene og har etter det stabilisert seg de siste seks til åtte år.

Reintallsutviklingen for de ulike områdene i Finnmark har hatt ulike virkninger, og vært påvirket av ulike kombinasjoner av faktorer. De bakenforliggende årsakene til svingningene er sammensatte, og det er også viktig at man vurderer utviklingen som har funnet sted i forhold til de tilgjengelige beitearealene for hvert av områdene. Likeledes er det betydelig variasjon mellom ulike sommer- og vintersidaers driftstilpasning innen de enkelte områdene, som igjen medfører at det innen de ulike områdene også er stor variasjon i produksjonsresultat (se vedleggsdel 1-8, hvor disse forskjellene kommer frem).

⁴⁹ Reintallet oppgis per 31. mars, det vil si slutten av driftsåret (1. april - 31. mars). Det reintallet per 31. mars (sluttstatus) som framkommer på reineiers melding, vil i noen tilfeller bli korrigert i påfølgende års melding (åpningsstatus). Slike korreksjoner kan skyldes at tellinger avdekker et annet reintall enn det som er oppgitt av reineier, eller at reineier i ettertid selv får bedre oversikt over sitt reintall.

⁵⁰ Den tilsynelatende økningen i reintall i Vest-Finnmark for driftsåret 1996/97 er ikke reell. Vinteren og våren 1997 ble reindriften i Finnmark rammet av låste beiter og omfattende tap, som tvert om førte til en nedgang i reintallet i driftsåret 1996/97. Årsaken til at statistikken sier noe annet er at tellinger høsten 1997 avdekket omfattende underrapportering i reintallet, som førte til en oppjustering av reintallet våren 1997. Det er grunn til å tro at tallene i årene forut for 1997 også reelt sett var høyere.

Karasjok og Vest-Finnmark har hatt et for høyt reintall over lang tid i forhold til bærekraftskriteriene. Dette har medført lave slaktevekter og en reduksjon av lavressursene på fellesbeitene. Dyr med redusert kondisjon, i kombinasjon med rovvilt og slitte vinterbeiter, innebærer en økt sårbarhet for tap under ugunstige klimatiske forhold. Disse forholdene har til sammen påvirket den langsiktige produktiviteten i Karasjok og Vest-Finnmark negativt.




Figur 8.1. Reintall ved driftsårets slutt i Polmak/Varanger, Karasjok østre sone, Karasjok vestre sone, Kautokeino østre, midtre og vestre sone, perioden 1979/80 - 2024/25 (per 31. mars). Basert på opplysninger fra reineierenes reindriftsmelding.

De markante ulikhetene i reintall og samlet beitebelastning for Polmak/Varanger og de øvrige områdene i Finnmark kan illustreres ved å se på utviklingen i tetthet av livrein per km² brutto beiteareal siden begynnelsen av 80-tallet. Figur 8.2. viser utviklingen i reintall i Finnmark i forhold til reintetthet per km² tilgjengelig bruttoareal.

Figur 8.2 viser at ved tusenårsskiftet var reintettheten i Vest-Finnmark og Karasjok vest mellom omtrent 1,9 og 2,5 livrein per km², mens Karasjok øst og Polmak/Varanger hadde en reintetthet på 1,3 livrein per km². De neste par årene fulgte en meget sterk bestandsvekst for alle soner i Finnmark unntatt Polmak/Varanger, som imidlertid hadde en svakere vekst. En viktig årsak til veksten i de fleste sonene var at det årlige overskuddet ikke ble tatt ut til slakt og økonomisk inntjening. For Polmak/Varanger var slakteuttaket høyere, noe som resulterte i en svakere vekst enn for øvrige soner. I 2003/04 stoppet denne veksten opp og man fikk en betydelig redusert produksjon i årene etter.

For de siste driftsårene har det vært stor variasjon mellom sonene i Finnmark når det gjelder tilpasning til dyretetthet på beitearealene og potensial for økonomisk inntjening som følge av dette. Polmak/Varanger har over tid hatt en reintetthet på beitearealene som er betydelig lavere enn de andre sonene i Finnmark, med under 2,0 livdyr per kvadratkilometer brutto beiteareal. Dette kan være en viktig årsak til at Polmak Varanger over tid også har hatt relativt gode tall på produktivitet (tabell 5.3) og noe lavere tap (figur 7.1) enn andre områder.



Figur 8.2. Tetthet av rein i vårflokk pr. kvadratkilometer brutto beiteareal ved driftsårets slutt i Polmak/Varanger, Karasjok østre- og vestre sone, Kautokeino østre, midtre og vestre sone i perioden 1979/80 - 2024/25 (pr. 31. mars). Basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding.

For perioden 1979/80-2024/25 har reinbeitedistriktene som er en del av reindriften i Polmak/Varanger hatt en gjennomsnittlig reintetthet på mellom 1,3 og 2,0 livrein per km² bruttoareal beiteland. Samtidig har reintettheten og den samlede beitebelastningen i de andre sonene i Finnmark variert betydelig, og vært langt høyere enn områdene i Polmak/Varanger. For 2014/15 gikk dyretettheten i Karasjok vest og sonene i Kautokeino noe ned som følge av planlagte reintallsreduksjoner og store tap.

Ut ifra målsetningen om en økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift, kan det være et betydelig potensial som kan realiseres i Vest-Finnmark og Karasjok gjennom en optimal tilpasning av reintallet til arealene og en økning i det prosentvise slakteuttaket i tiden fremover.


8.2 Reintallsutvikling i sør-områdene

Det er også betydelige forskjeller mellom sør-områdene når det gjelder driftsforhold og produksjon. De klimatiske forutsetningene for å drive reindrift er også ulike mellom reinbeiteområdene Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/Hedmark, samt reinlagene.

Mens Sør-Trøndelag/Hedmark og reinlagene er områder som har meget gode klimatiske betingelser for en produktiv reindrift på samme måte som i Finnmark, er de klimatiske vinterbeiteforholdene jevnt over mer utfordrende i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

Figur 8.3 viser reintallsutviklingen for perioden 1979/80-2024/25. Antallet rein er gitt per 31. mars, og utgjør det laveste reintallet i løpet av driftsåret. Siste års reintall (per 31. mars 2025) må sees på som et foreløpig tall inntil korrigert reintall⁵¹ foreligger høsten 2026.

Troms og Nordland har generelt hatt store svingninger i produksjonen, blant annet som følge av utfordrende vinterbeiter og ustabile klimatiske forhold. Vinterbeitene er sterkt påvirket av klimatiske forhold, og utgjør den mest begrensende faktoren for de fleste distrikter i disse to områdene. Imidlertid synes sommerbeitene generelt å ha meget høy kvalitet. Troms og Nordland ligger i toppen når det gjelder kjøttkvalitet og høye slaktevekter.



Figur 8.3. Reintall ved driftsårets slutt i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark og reinlagene i perioden 1979/80 - 2024/25 (pr. 31. mars). Basert på opplysninger fra reieneiernes reindrifsmelding. Fra 2023/2024 er det ikke lenger registrert et reintall på Rendalen renselskap, da de ikke er pliktige til å levere melding om reindrift.

Figur 8.3 viser at både Nordland og Troms, i likhet med Finnmark, hadde en oppgang i reintall på 1980-tallet. For Nordland varte oppgangen fram til 1992/93, mens for Troms startet nedgangen allerede i 1986/87. Troms og Nordland opplevde også beitekrise med rekordstore snømengder i 1997 og 2000. Fra 1999/00 økte både Troms og Nordland reintallet. Årsaken til denne økningen kan for en del knyttes til noe høyere prosentvis kalvetilgang (lavere tidligtap) enn i årene før oppgangen begynte, og et lavere prosentvis slakteuttak.

Til tross for høye slaktevekter, hadde begge områdene store tap, lav kalvetilgang, lav og ustabil produktivitet og minkende reintall i siste del av 1990-tallet.

⁵¹ Reintallet oppgis per 31. mars, det vil si slutten av driftsåret (1. april - 31. mars). Det reintallet per 31. mars (sluttstatus) som kommer fram på reieneiers melding, vil i noen tilfeller bli korrigert i påfølgende års melding (åpningsstatus). Slike korreksjoner kan skyldes at tellinger avdekker et annet reintall enn det som er oppgitt av reieneier, eller at reieneier i ettertid selv får bedre oversikt over sitt reintall.

Etter 2000/01 har reintallet økt både i Troms og Nordland. Siden 2005/06 har reintallet i Nordland vært på sitt høyeste siden 1979/80. Dette skyldes hovedsakelig oppbygning av reintall innenfor enkelte av distriktene.

Nord-Trøndelag hadde gjennom 1980-tallet og første del av 1990-tallet en meget høy produktivitet. Dette var et utslag av en bevisst strukturering av reinflokken. Fra figur 8.3 kommer det fram at ved slutten av 1990-tallet begynte reintallet å synke, og nedgangen fortsatte fram til 2005/06. Nedgangen i reintall skyldes delvis planlagte justeringer av reintall i forhold til beitegrunnlaget i noen distrikter, men er også en følge av økende tap de siste årene. Parallelt med økte tap gikk også produktiviteten ned.

Fra begynnelsen av 80-tallet og frem til 2002/03 hadde Nord-Trøndelag årlige slakteuttak som lå mellom 150 og 200 tonn. I perioden som har fulgt etter 2002/03 har det årlige slakteuttaket gått betydelig ned og lagt seg på rundt 100 tonn for de siste ti driftsårene.


I Sør-Trøndelag/Hedmark og i reinlagene har reintallet holdt seg stabilt over tid, med henholdsvis ca. 13 000 og 12 000 dyr. Disse områdene har generelt hatt stabilitet både i reintall, produksjon og kvalitet (slakteveker). Fra 2023/2024 registreres det ikke lenger noe reintall for Rendalen renselskap, da de ikke er pliktige til å levere melding om reindrift. I hovedsak er dette grunnen til den store nedgangen figur 8.3 viser for Reinlagene fra reindriftsåret 2022/2023 til 2023/2024 - reinlagene har altså ikke reelt sett hatt en stor nedgang.

8.3 Samlet oversikt – Slakteuttak, antall slaktedyr, tap og reintall i vårflokk

Figurene 8.4 og 8.5 gir en fremstilling av totalverdier for slakteproduksjon og tap over en tiårsperiode fordelt på reinbeiteområder og soner i Finnmark. Hensikten med en slik fremstilling er å vise trender og forskjeller mellom områder og soner.

For 2024/2025 er det ikke lenger registrert et reintall for Rendalen renselskap, da de ikke er pliktige til å levere melding om reindrift. Mangelen på et reintall for Rendalen fra 2024/2025 vil påvirke tallene for Reinlagene i diagrammet, gjennom at Reinlagenes gjennomsnittlige reintall over tiårsperioden trekkes noe ned. Reintallet for Reinlagene i figuren vil påvirkes litt og litt mer i negativ retning for hvert år framover det fortsatt ikke registreres et reintall for Rendalen.

Figur 8.4 gir en områdevis fremstilling av gjennomsnittlig reintall i vårflokk (per 31. mars) ved slutten av forrige driftsår (x-aksen), totalt antall slaktedyr (y-aksen) og totalt slaktekvantum målt i tonn (boblene i diagrammet) for driftsårene 2015/16 - 2024/25.



Figur 8.4. Områdevis fremstilling av gjennomsnittlig reintall i vårflokk (per 31.mars) ved slutten av forrige driftsår, totalt antall slaktedyr og totalt slaktekvantum inkludert privat slakt (boblene i diagrammet) målt i tonn for driftsårene 2015/16-2024/25. Boblenes størrelse samsvarer med totalt slaktekvantum inkludert privat slakt i tidsperioden.

Av figuren fremgår det at områdene Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark og reinlagene i gjennomsnitt har hatt et reintall i vårflokk på mellom 12 000 og 15 000 dyr. Samtidig er det stor forskjell mellom disse to områdene i totalt antall slaktedyr i denne tiårsperioden. Troms har totalt 20 327 slakt, mens Sør-Trøndelag/Hedmark har over 74 000 slakt. Sør-Trøndelag/Hedmark og reinlagene har hatt et samlet slakteuttak for tiårsperioden på henholdsvis 1 832 og 2 041 tonn, som er omtrent tre ganger så mye som både Troms (551 tonn) og Nordland (623 tonn) i samme periode.


Innad i Finnmark fremgår det også at Kautokeino vestre sone, Kautokeino østre sone, Karasjok vestre sone og Polmak/Varanger, alle har hatt et gjennomsnittlig reintall på 22 000 - 25 000 i vårflokk for tiårsperioden. Selv med et tilnærmet likt gjennomsnittlige reintall har Polmak/Varanger produsert mellom 65% og 95% mer i totalt slaktekvantum (2569 tonn) enn hver enkelt av de tre andre områdene, som har hatt uttak på mellom 1 315 og 1 557 tonn. Slakteuttaket i Sør-Trøndelag/Hedmark og i reinlagene har også vært høyere enn i Kautokeino vestre sone, Kautokeino østre sone og Karasjok vestre sone. Gjennomsnittlige reintall i Sør-Trøndelag/Hedmark og i reinlagene (enkeltvis) ligger på omtrent 55% av reintallet i hver av de tre nevnte sonene i Finnmark.

Selv om Kautokeino midtre sone for tiårsperioden har hatt et gjennomsnittlig reintall på omtrent 32 000, har Polmak/Varanger slaktet flere dyr, og hatt ca. 42% høyere samlet slakteuttak i tonn sammenlignet med Kautokeino midtre sone.

Sør-Trøndelag/Hedmark og reinlagene (enkeltvis) har hatt gjennomsnittlige reintall på ca. 40% av reintallet i Kautokeino midtre sone. Samtidig viser oversikten at de tre områdene for perioden har hatt et forholdsvis likt slakteuttak med henholdsvis 1 832, 2 041 og 1 804 tonn.

I Karasjok østre sone har det blitt produsert 1055 tonn, noe som er litt mindre enn i Nord-Trøndelag (1157 tonn). Dette selv om reintallet i Karasjok østre sone (21 840) er høyere enn i Nord-Trøndelag (ca. 14 114).

Også i forhold til tap for perioden 2015/16-2024/25 finnes det betydelige forskjeller mellom de ulike reinbeiteområdene. Figur 8.5. gir en områdevis fremstilling av gjennomsnittlig reintall i vårflokk (per 31. mars), totalt antall slaktedyr og totalt tap (boblene i diagrammet) for driftsårene 2015/16 - 2024/25. Boblenes størrelse samsvarer med samlet tap.



Figur 8.5. Områdevis fremstilling av gjennomsnittlig reintall i vårflokk (per 31. mars) ved slutten av forrige driftsår, totalt antall slaktedyr og totalt tap (boblene i diagrammet) for driftsårene 2015/16-2024/25. Boblenes størrelse samsvarer med samlet tap i tidsperioden.

Sør-Trøndelag/Hedmark hadde et totalt tap for tiårsperioden på 26 721, tilsvarende bare 20 % av det samlede tapet i Kautokeino midtre sone hvor 135 824 rein ble meldt tapt i tiårsperioden (figur 8.5). Dette til tross for at Sør-Trøndelag/Hedmark og Kautokeino midtre sone har slaktet omtrent like mye (henholdsvis 1832 og 1804 tonn) (figur 8.4).

Polmak/Varanger rapporterer et langt lavere tap enn Karasjok vestre sone, Kautokeino østre og vestre sone. Det vil si at selv med et relativt likt reintall som de andre aktuelle sonene, har Polmak/Varanger både lavere tap (figur 8.5) og som tidligere nevnt bedre slakte- og produksjonstall (figur 8.4). Tapet som ble rapportert i Polmak/Varanger var også under halvparten av tapet rapportert i Kautokeino midtre sone (figur 8.5), til tross for at slaktekvantumet i Polmak/Varanger er 42% høyere enn Kautokeino midtre sone (figur 8.4).

De totale tapstallene kan også ses i sammenheng med totalt antall slaktedyr for tiårsperioden. Kautokeino midtre sone har oppgitt 1,5 rein tapt for hver rein som er blitt slaktet for perioden 2015/16–2024/25. Til sammenligning er det tapt 0,5 rein i Polmak/Varanger for hver rein som er blitt slaktet. For Troms og Nordland er henholdsvis 2,9 og 3,6 rein blitt tapt for hver slaktede rein. I Sør-Trøndelag/Hedmark og reinlagene er henholdsvis 0,4 og 0,1 rein meldt tapt for hver rein som er blitt meldt slaktet.

8.4 Kriterier for bærekraftsmålene i reindriftspolitikken

I henhold til St. Prop. 98 S (2023–2024) er det ulike bærekraftskriterier som beskriver gitte tilstander relatert til målsettingene for å oppnå en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindriftsnæring. Under hvert kriterium fins indikatorer som forteller hvordan tilstandene under kriteriene kan beskrives, og som kan vise en utvikling over tid. Sammen med SSB arealbruk, Totalregnskapet for reindriftsnæringen og Miljødirektoratet skal Ressursregnskapet for reindriftsnæringen danne et datagrunnlag for de gitte indikatorene. Det er ofte relevant å si noe om utviklingen til de ulike indikatorene over tid. I noen tilfeller fins det allerede eksisterende tidsserier, eller tallgrunnlag tilbake i tid, som sier noe om indikatorene. I andre tilfeller er det mer begrenset hva som per i dag finnes av data. De bærekraftskriteriene og indikatorene som er relevante for ressursregnskapet, samt hvilke tall som finnes på disse presenteres i dette kapittelet.

Kriterium: Reindriftens driftsform opprettholdes med naturlig flytting og bruk av årstidsbeitene

For å kunne bevare den kulturelle bærekraften er det viktig at reindriftens driftsform, flytting mellom årstidsbeitene, opprettholdes. Flyttingen mellom årstidsbeitene er også en forutsetning for at reindriften har nok beitearealer, noe som knyttes til den økologiske bærekraften. Den tradisjonelle driftsformen er også viktig for den økonomiske bærekraften, ved bruken av marginale beiteressurser som ikke har alternative utnyttelsesformer. Det er lagt til grunn tre indikatorer for å fortelle noe om dette kriteriet. To av indikatorene som sier noe om dette kriteriet: antall omlegginger av flyttleier som er godkjent av Landbruks- og matdepartementet, og endringer i beitetider, fokuseres det ikke på i Ressursregnskapet. Den siste indikatoren gir imidlertid Ressursregnskapet informasjon om, og denne vil presenteres nedenfor.

Indikator: Salg av kraftfôr (mengde)

Mengden salg av kraftfôr for ulike reinbeiteområder vil si noe om endringer i utnyttelsen av årstidsbeitene. Tabell 5.4 gir en slik oversikt for perioden 2020 – 2025, med data fra Felleskjøpet og Fiskå Mølle. For 2024 var tallet på 7574 tonn i hele Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag samlet. Dette er et høyt tall sammenlignet med seksårsperioden, som hadde et snitt på 5786 tonn. De foreløpige tallene for årets salg av kraftfôr er på 7902 tonn, noe som allerede er det høyeste tallet så langt sett fra et seksårsperspektiv.

Mellom områder har det vært store forskjeller i salget. I Troms og Finnmark ble det i 2025 kjøpt 6957 tonn, i Nordland 842 tonn og i Trøndelag 103 tonn (foreløpige tall per 31.10.2025). For hvert år i hele perioden ble det solgt klart mest kraftfôr i Troms og Finnmark, nest mest i Nordland og minst i Trøndelag.

Kriterium: Dyrevelferden er god

Et annet av kriteriene på en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift, er at dyrevelferden er god. Det legges vekt på at tilgang på vann og beite, samt lite forstyrrelser fra rovvilt, er viktig for dyrevelferden. I tillegg vil dårlige værforhold og annen bruk av reindriftsarealene være negativt for dyrevelferden. Under kriteriet om god dyrevelferd er det lagt til grunn tre indikatorer som beskriver hva som skal til for å oppnå god dyrevelferd, og alle disse indikatorene vil presenteres nedenfor.

Indikator: Kalveandel av totalt slakt

Kalveandelen av total slakt skal si noe om beitesituasjonen som har vært gjennom vinteren og våren, og hvordan tapssituasjonen etter kalving har vært. Lav kalvetilgang kan skyldes vanskelige beiteforhold og/eller tap til rovvilt. Siste driftsår er andelen kalv av total slakt for hele reindriften på 79% (vedlegg 1, tabell 10). I et femårsperspektiv (2020/2021 – 2024/2025) har andelen totalt sett variert mellom 74% - 81%. Sammenlignet med de fire tidligere reindriftsårene så er årets kalveandel av total slakt (79%) i det høyere sjiktet. Samtidig er det noe variasjon i kalveandelen av total slakt mellom områder. Nordland og Nord-Trøndelag hadde for 2024/2025 de laveste andelene, med henholdsvis 67% og 69%. De høyeste andelene for samme reindriftsår var å finne i Karasjok vestre sone (88%) og Kautokeino østre sone (86%).

Indikator: Slaktevekt for kalv

Slaktevekter for kalv vil indikere om utvikling i mattilgang, samt reinens kondisjon, er god. Relevant i denne sammenheng er å se på normene for fastsettelse av et bærekraftig reintall (beskrevet i kapittel 6.1), der normene for gjennomsnittlige slaktevekter er satt til å være 17-19 kg for kalv. Dette kan brukes til å si noe om betydningen av årets tall, samt tidligere tall på gjennomsnittlige slaktevekter for kalv.

For reindriften samlet var de gjennomsnittlige kalveslaktevektene på 19,8 kg i 2024/2025 (tabell 6.1). Dette var litt høyere enn året før (19,4 kg). De områdene og sonene som hadde en økning i gjennomsnittlige slaktevekter for kalv fra året før var hele alle sonene i Vest-Finnmark, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark og reinlagene. De områdene og sonene som imidlertid hadde en nedgang var alle sonene i Øst-Finnmark, Troms og Nordland. Det var ingen områder som i 2024/2025 hadde gjennomsnittlige kalveslaktevekter på under 17 kg. Karasjok østre sone, Karasjok vestre sone, Kautokeino midtre sone og Kautokeino vestre sone hadde gjennomsnittlige kalveslaktevekter på mellom 17 og 19 kg. De resterende områdene hadde kalveslaktevekter på over 19 kg.

I et tiårsperspektiv er årets tall for hele reindriften samlet (19,8 kg) litt over snittet (snittet over 10 år er på 19,4 kg). Generelt er både årets tall for hele reindriften, og gjennomsnittet i et tiårsperspektiv, over normene. Det er likevel en del regionale forskjeller i slaktevektene for kalv også i tiårsperioden.

For hvert år i hele perioden mellom 2015/2016 og 2024/2025 har de gjennomsnittlige slaktevektene av kalv for Polmak/Varanger, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark og reinlagene vært over normene (mer enn 19,0 kg). I alle sonene i Finnmark utenom Polmak/Varanger har slaktevektene for enkelte år har vært lavere enn dette. Karasjok østre og vestre sone, samt Kautokeino østre sone, har i løpet av tiårsperioden hatt gjennomsnittlige slaktevekter på mellom 17 kg og 19 kg. I et tiårsperspektiv har Kautokeino midtre og vestre sone hatt de laveste slaktevektene for kalv, med henholdsvis 16,8 kg og 16,6 kg i gjennomsnitt.

Når verdiene er under normene over flere år, tyder det på at reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget. Dersom man ser på tallene som finnes for slaktevekter hos kalv, kan det derfor

indikere at mattilgangen ikke har vært god over tid i Finnmark med unntak av i Polmak/Varanger. Tall på distriktsnivå over en tiårsperiode finnes i vedlegg 1-8, tabell 14.

Indikator: Kalvetilgang etter tap

Kalvetilgangen etter tap viser hvor stor produksjonen er, og hvor utsatt reindriften er for tap av kalv. For 2024/2025 var denne andelen for hele reindriften på 51% (vedlegg 1, tabell 4). I et femårsperspektiv (2020/2021 – 2024/2025) har andelen totalt sett variert mellom 44% - 54%. Det vil si at i et femårsperspektiv er årets kalvetilgang etter tap (51%) litt over normalen. Det er likevel relativt store regionale forskjeller. I år har Reinlagene (91%) og Sør-Trøndelag/Hedmark (73%) hatt de høyeste kalvetilgangene etter tap. De laveste kalvetilgangene etter tap for 2024/2025 finnes i Karasjok østre sone (37%) Nordland (40%), Kautokeino vestre sone (41%) og Troms (41%). Tall på kalvetilgangen etter tap for hvert område enkeltvis finnes i vedlegg 1-8, tabell 4.

Kriterium: Tap av rein er redusert

At tap av rein er redusert, er også viktig for både den økologiske, økonomiske og kulturelle bærekraften i reindriften. Tap av rein er en utfordring for reindriften, da produksjon og lønnsomhet vil bli negativt påvirket ved høye tap. Under kriteriet om at tap av rein er redusert, er det lagt til grunn fire indikatorer som beskriver hva som skal til for å oppnå god dyrevelferd. To av indikatorene som sier noe om dette kriteriet: andel (av reintall) omsøkt og erstattet tap av rein til rovvilt, og erstattede rovvilttap i andel av reintall, fokuseres det ikke på i Ressursregnskapet i dag. Tall på omsøkt og erstattet tap finnes i Miljødirektoratet sin Rovbase⁴¹. Det er likevel to andre indikatorer under dette kriteriet som kan beskrives på bakgrunn av informasjon fra Ressursregnskapet. Disse to indikatorene vil presenteres nedenfor.

Indikator: Tap av tamrein av andre årsaker enn rovvilt

Å si noe om hvor mange rein som blir tapt til andre tapseårsaker enn rovvilt, er med på å vise helheten i tapssituasjonen i reindriften. For 2024/2025 var det totalt 9% av tapte kalver og 21% av tapte voksne dyr som ble meldt tapt til andre tapseårsaker enn fredet rovvilt (figur 7.3 og 7.4). Tapsfordelingene mellom fredet rovvilt og andre tapseårsaker på distriktsnivå finnes i vedlegg 1-8, tabell 6. Gjennom å se på denne tapsfordelingen også i årene framover vil det kunne gi et bilde av utvikling over tid.

For 2024/2025 var det noen regionale forskjeller i tapsandelene til andre årsaker enn fredet rovvilt. For kalver var andelen meldt tapt til andre årsaker enn fredet rovvilt lavest for Reinlagene (3%) og Nord-Trøndelag (4%). Høyest var dette tallet for Karasjok østre sone (13%) og Karasjok østre sone (11%). For voksne dyr var andelen lavest for Nord-Trøndelag (12%), Polmak/Varanger (14%) og for Karasjok østre sone (15%). Tallet var høyest for Kautokeino østre sone (36%), Karasjok vestre sone (33%) og Reinlagene (32%).

Indikator: Andel overlapp mellom prioriterte rovviltområder og reindriftens kalvingsområder

Andelen overlapp mellom prioriterte rovviltområder og reindriftens kalvingsområder vil indikere risikoen for tap av rein til rovvilt i de aktuelle områdene. Figur 7.7 – 7.8 gir en visuell oversikt over hvor mye av reindriftens kalvingsområder som er dekt av prioriterte rovviltområder. Figur 7.9 gir tall på overlappet for hvert område. I hele reindriften er andelen kalvingsområder som er dekt av prioriterte rovviltområder på 57,6% (figur 7.9), altså gjelder det mer enn halvparten av reindriftsområdet. Ellers er det store variasjoner i denne andelen per område. Troms og Øst-Finnmark

har de laveste tallene, på henholdsvis 11,1% og 23,8%. De høyeste tallene finnes for Nordland (99,8%), Nord-Trøndelag (93,5%) og Sør-Trøndelag/Hedmark (92,4%).

Kriterium: Reindriften har tilgang på beiteressurser av god kvalitet

For å kunne ha en økologisk bærekraftig reindriftsnæring er det viktig at reindriften har tilgang på beiteressurser av god kvalitet. Både naturgrunnlaget, beitedyr, klima og annen aktivitet i et område påvirker tilveksten av beiteplanter.⁵² Klimaendringer vil være en viktig påvirkningsfaktor for tilgangen på beiteressurser framover. På sikt er det ønskelig å ta med en indikator som også sier noe om dette. Per i dag er det lagt til grunn to indikatorer på dette kriteriet, og disse indikatorene vil presenteres nedenfor.

Indikator: Andel lavrik mark av totalt areal

For Finnmark finnes det gjennom overvåkningsprogrammet for Finnmarksvidda tall på andelen lavrik mark på vinterbeiter og på vår/høstbeiter. For vinterbeitene av andelen lavmark på 5,8% i 2023 (figur 4.4). For vår/høstbeitene var tallet på 1,4% (figur 4.5). Mer om utviklingen i andelen lavmark over tid, samt vurderinger rundt betydningen av disse funnene, finnes i kapittel 4.3. Kort sammenfattet kan det sies at andelen lavmark på vinterbeite har gått sterkt ned siden målinger i 1987, og andelen lavmark på vår/høstbeite har vært lav siden år 2000. Med lavdekke som indikator kan beitekvaliteten på fellesbeitene i store deler av Finnmark betegnes som dårlig. For andre områder enn Finnmark fins ikke den samme kartleggingen per i dag, noe som gjør det vanskelig å si noe om beitekvaliteten i disse områdene ved hjelp av denne indikatoren.

Indikator: Reintall per 31. mars

Reintall er tatt med som indikator på dette kriteriet fordi det er viktig for bestemmelse av beitetrykket i reinbeiteområdene, og dermed påvirker det også beitekvaliteten. Reintallet over tid i ulike områder kan ses grafisk i figur 8.1 og 8.3. Tabell 2 i vedlegg 1-8 viser dessuten utviklingen i reintallet over tid for ulike distrikter. For 2024/2025 var reintallet i Norge (før korrigering) 217 152. Dette totaltallet har holdt seg relativt stabilt sett i et tiårsperspektiv, men det bør merkes at årets reintall er det høyeste i hele tiårsperioden. I tillegg er det interessant å se på utviklingen område for område, som er nærmere beskrevet i kapittel 8.1-8.2. Det er også mulig å se på reintallet opp mot fastsatt reintall (vedlegg 9) for de ulike områdene.

For 2024/2025 ligger Karasjok østre og vestre sone over sitt fastsatte reintall, mens Polmak/Varanger ligger under sitt fastsatte reintall. For Vest-Finnmark ligger Kautokeino midtre og vestre sone over sitt fastsatte reintall, mens Kautokeino østre sone ligger under sitt fastsatte reintall. Både Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/Hedmark er under sitt fastsatte reintall. Reinlagene har ikke fastsatte reintall.

Kriterium: Reindriftens arealressurser blir ivaretatt

Også relatert til økologisk bærekraft er kriteriet om at reindriftens arealressurser blir ivaretatt. Dette er viktig for produksjon og lønnsomhet i reindriften. Det er lagt til grunn fem indikatorer som skal si noe om dette kriteriet. I ressursregnskapet kommenterer vi en av disse indikatorene.

⁵² Kriterier/indikatorer for økologisk bærekraftig reintall. Rapport fra arbeidsgruppe. Juni 2008 s. 6

Indikator: Andel av reinbeitedistriktenes areal som er tilgjengelig for reinbeite

Å se på andelen av reinbeitedistriktenes areal som er tilgjengelig for reinbeite over tid gir en indikasjon på hvor mye areal som ikke lenger kan brukes til reinbeite, grunnet utbygging og annen arealbruk. Et godt og fullstendig arealregnskap som også viser en utvikling over tid, er ikke på plass i dag. Det finnes likevel en viss statistikk på hva arealene i reinbeiteområdene består av (figur 4.2 og tabell 4.1). Hoveddelen av de arealene som kan brukes av reindriften er i utgangspunktet utmarksarealer (snaumark, skog og åpen myr). Mer informasjon om tilgjengeligheten av eksisterende beitearealer finnes i kapittel 4.2. Statistikken som presenteres der tar imidlertid ikke høyde for barriere- og unnvikelseeffekter. Kapittel 4.1 sier mer om hvordan arealendringer i reinbeitene påvirker reindriften, både direkte og indirekte.

Kriterium: Reindriften har god produktivitet

For den økonomiske bærekraften er det viktig at reindriften har god produktivitet. Produktivitet indikerer om produksjonsgrunnlaget utnyttes godt (produksjon i forhold til innsats), da det beskriver forholdet mellom produksjonsgrunnlaget og det som produseres. Det er lagt til grunn tre indikatorer på dette kriteriet. Den ene indikatoren er antall årsverk i reindriften, noe Totalregnskapet for reindriftsnæringen gir informasjon om. De to indikatorene på dette kriteriet som Ressursregnskapet gir informasjon om, presenteres nedenfor.

Indikator: Slakteuttak (antall rein)

Utviklingen i slakteuttak vil si noe om totalvolumet over tid. Tabell 5.1 viser dessuten en utvikling i slakteuttak over tid. Den samme oversikten for årets tall, på distriktsnivå, finnes i vedlegg 1-8, tabell 9. Antallet slaktedyr (slakteri, privat omsetning og eget forbruk) var for 2024/2025 på 64 207 dyr. I et tiårsperspektiv (2015/2016 – 2024/2025) er gjennomsnittet på 70 262 slaktedyr. Sammenlignet med de tidligere 9 årene er altså årets tall lavere enn snittet for tiårperioden. Mellom områder var det noen forskjeller i slakteuttaket. For 2024/2025 var slakteuttaket høyes for Polmak/Varanger (10 283 dyr) og for Kautokeino midtre sone (8 426 dyr). De laveste slakteuttakene var i Nordland (1 612 dyr) og Troms (2 126 dyr).

Indikator: Totalproduksjon per livrein

Totalproduksjonen per livrein er slakt per livdyr korrigert for reintallsendringer. Totalproduksjon forteller noe om hvor effektiv en reinflokk er til å produsere kjøtt. Tall for dette, inkludert en utvikling over tid (en tiårperiode), finnes i tabell 5.3 Årets tall finnes også på distriktsnivå, i vedlegg 1-8 tabell 9. I hele reindriften samlet var tallet på totalproduksjon per livrein på 7,3 for 2024/2025. Dette er litt høyere enn gjennomsnittet på fem år (2020/2021 – 2024/2025) som var på 7,1. Samtidig var det også for 2024/2025 store forskjeller mellom områder. De høyeste tallene på totalproduksjon var for Reinlagene (20,6), Sør-Trøndelag/Hedmark (13,4) og Polmak/Varanger (8,7). De laveste tallene var for Nordland (3,7) og Karasjok østre sone (4,0).

Vedlegg

Generelle kommentarer til næringsoversikter (vedlegg 1-8)

- Vedlegg 1 - Næringsoversikt alle områder**
- Vedlegg 2 - Næringsoversikt Øst-Finnmark**
- Vedlegg 3 - Næringsoversikt Vest-Finnmark**
- Vedlegg 4 - Næringsoversikt Troms**
- Vedlegg 5 - Næringsoversikt Nordland**
- Vedlegg 6 - Næringsoversikt Nord-Trøndelag**
- Vedlegg 7 - Næringsoversikt Sør-Trøndelag/Hedmark**
- Vedlegg 8 - Næringsoversikt reinlagene**
- Vedlegg 9 - Rammebetingelser for reindriften**

Generelle kommentarer til næringsoversikten

Næringsoversikten (vedlegg 1-8) bygger i hovedsak på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding og søknad om erstatning for rovvilttap. Tabellene kan grovt inndeles i følgende hovedtema:

- Organisering (tabell 1)
- Reinbestanden (tabell 2-4)
- Tap (tabell 5-8)
- Slakt (tabell 9-10)
- Slaktevekter (tabell 11-14)

I tabell 1 er det oppgitt antall siidaandeler med rein og antall personer innunder disse. Det er også gitt en oversikt over antall sommer- og vintersiidaer.

I tabell 2 (reintall) er reintallene korrigerte, med unntak av siste år.

Som grunnlag for tabell 3 (flokk sammensetning) benyttes ukorrigert reintall ved driftsårets slutt (per 31. mars 2025). Som grunnlag for tabell 4 (kalvetilvekst), tabell 5 (tap) og tabell 6 (slakteprosent og slakteuttak pr. livrein) benyttes det korrigerte reintallet før kalving (per 31. mars 2024).

I tabell 9 er totalproduksjon pr. livrein blitt regnet ut gjennom å ta totalproduksjonen i kg dividert med korrigert reintall ved slutten av forrige driftsår. Totalproduksjonen i kg tilsvarer totalt slaktekvantum pluss en reintallsending omregnet til kg. Denne reintallsendingen tilsvarer endringen i reintall mellom sluttstatus for gjeldende driftsår og korrigert sluttstatus for forrige driftsår. Reintallsendingen pr. okse, simle og kalv er blitt multiplisert med gjennomsnittlige slaktevekter fra slakteri for okse, simle og kalv på område- og sonenivå for det gjeldende driftsåret. Summen av reintallsendingen i kg for okse, simle og kalv pluss det totale slaktekvantumet pr. område/sone/distrikt/siida utgjør totalproduksjonen, og denne divideres med korrigert reintall ved slutten av forrige driftsår for å finne produksjonen pr. livrein.

I tabell 9 inkluderer totalt slakteuttak og totalt slaktekvantum både slakteri-slakt, privat salg og eget forbruk. Den delen av det totale slaktekvantumet som kommer fra privat slakting er beregnet på grunnlag av antall dyr og gjennomsnittlige slaktevekter på område- og sonenivå for voksne dyr fra slakteri.

I tabell 10 (fordeling av slakteuttak etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt) omfatter kategorien «registrert slakteri» både slakteuttak ved mobilt og ikke mobilt slakteri. Kategorien «privat slakting» omfatter slakteuttak til privat omsetning eller eget forbruk. Dette uttaket er udokumentert. Dato som skiller før/etter brunst er her blitt satt til 15. oktober (det som ble slaktet innen 15. oktober er slaktet før brunst, mens det som ble slaktet fra og med 16. oktober regnes som slakt etter brunst). Totalt antall slaktedyr i tabell 10 inkluderer kun slakterislakt (ikke privat slakt).

Fordeling av slakteuttak etter dyrekategori og slaktetidspunkt (tabell 10) og gjennomsnittlige slaktevekter (tabell 11-14) bygger på data fra registrerte slakteribedrifter.

Vedlegg 1 - Næringsoversikt alle områder

Tabell 1. Antall siidaandeler med rein og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2024/25 (per 31. mars 2025). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEOMRÅDE	PERSONER		SIIDAER	
	SIIDAANDELER	i siidaandelene	Sommer	Vinter
ØST-FINNMARK	165	881	19	48
Polmak/Varanger	43	224	6	10
Karasjok østre sone	51	284	4	15
Karasjok vestre sone	71	373	9	23
VEST-FINNMARK	213	1 440	36	52
Kautokeino østre sone	62	399	14	14
Kautokeino midtre sone	93	738	16	23
Kautokeino vestre sone	58	303	6	15
TROMS	50	204	15	17
NORDLAND	41	216	15	17
NORD-TRØNDELAG	39	180	10	10
SØR-TRØND./HEDM.	30	142	4	4
SAMISK REINDRIFT	538	3 063	99	152

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEOMRÅDE	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
ØST-FINNMARK	68 803	68 537	70 345	70 176	71 400	72 371	72 301	71 355	72 544	74 051
Polmak/Varanger	24 697	24 260	24 434	24 481	25 161	25 268	24 502	24 303	24 417	23 966
Karasjok østre sone	20 652	20 003	21 017	22 238	22 822	24 148	23 875	22 005	22 273	22 369
Karasjok vestre sone	23 454	24 274	24 894	23 457	23 417	22 955	23 924	25 047	25 854	27 716
VEST-FINNMARK	80 909	79 076	77 483	78 576	78 729	77 846	78 268	77 594	77 174	77 758
Kautokeino østre sone	23 159	23 529	22 797	23 408	23 076	22 324	22 651	22 853	21 807	21 409
Kautokeino midtre sone	34 205	32 939	31 723	32 070	31 864	32 235	32 245	31 208	31 028	31 169
Kautokeino vestre sone	23 545	22 608	22 963	23 466	23 789	23 287	23 372	23 533	24 339	25 180
TROMS	11 971	11 943	12 055	12 150	12 340	12 249	12 779	12 599	12 908	13 124
NORDLAND	14 366	14 219	13 884	13 960	14 079	13 977	13 992	13 932	13 835	13 798
NORD-TRØNDELAG	14 164	14 206	14 168	13 921	14 173	14 078	13 996	14 063	13 971	13 923
SØR-TRØND./HEDM.	13 166	13 766	14 608	13 773	13 766	13 874	13 949	14 068	14 036	14 014
REINLAGENE	13 004	13 102	13 050	12 145	11 859	11 813	11 773	11 487	10 551	10 484
HELE REINDRIFTEN	216 383	214 849	215 593	214 701	216 346	216 208	217 058	215 098	215 019	217 152

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2024/25 (ukorrigert reintall per 31. mars 2025).

REINBEITEOMRÅDE	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL
	Okserlein	Simlerlein	Kalv	pr. 31.03.25
ØST-FINNMARK	5 %	77 %	18 %	74 051
Polmak/Varanger	4 %	79 %	16 %	23 966
Karasjok østre sone	6 %	77 %	17 %	22 369
Karasjok vestre sone	6 %	74 %	20 %	27 716
VEST-FINNMARK	7 %	78 %	16 %	77 758
Kautokeino østre sone	7 %	80 %	13 %	21 409
Kautokeino midtre sone	6 %	78 %	16 %	31 169
Kautokeino vestre sone	7 %	75 %	18 %	25 180
TROMS	10 %	72 %	18 %	13 124
NORDLAND	10 %	69 %	21 %	13 798
NORD-TRØNDELAG	5 %	76 %	19 %	13 923
SØR-TRØND./HEDM.	5 %	79 %	17 %	14 014
REINLAGENE	0 %	78 %	21 %	10 484
HELE REINDRIFTEN	6 %	76 %	17 %	217 152

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2024/25. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved slutten av forrige driftsår (korrigert simletall per 31. mars 2024). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEOMRÅDE	SIMLER i vårflokk	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
		Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
ØST-FINNMARK	57 105	49 769	37 300	28 482	87 %	65 %	50 %
Polmak/Varanger	19 774	17 476	14 033	11 941	88 %	71 %	60 %
Karasjok østre sone	17 366	14 718	9 974	6 448	85 %	57 %	37 %
Karasjok vestre sone	19 965	17 575	13 293	10 093	88 %	67 %	51 %
VEST-FINNMARK	60 725	53 653	40 554	27 258	88 %	67 %	45 %
Kautokeino østre sone	17 379	15 457	11 120	8 326	89 %	64 %	48 %
Kautokeino midtre sone	24 706	22 273	17 087	11 283	90 %	69 %	46 %
Kautokeino vestre sone	18 640	15 923	12 347	7 649	85 %	66 %	41 %
TROMS	9 338	8 422	5 631	3 791	90 %	60 %	41 %
NORDLAND	9 684	9 151	7 066	3 835	94 %	73 %	40 %
NORD-TRØNDELAG	10 631	10 139	7 889	5 469	95 %	74 %	51 %
SØR-TRØND./HEDM.	10 910	10 371	8 477	8 016	95 %	78 %	73 %
REINLAGENE	8 218	7 889	4 917	7 481	96 %	60 %	91 %
HELE REINDRIFTEN	166 611	149 394	111 834	84 332	90 %	67 %	51 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2024/25. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2024, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2024.

REINBEITEOMRÅDE	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
ØST-FINNMARK ¹	12 234	8 880	21 287	1 153	5 886	7039	28 326	43 %	10 %	23 %
Polmak/Varanger ¹	3 208	2 154	5 535	250	2 024	2274	7 809	32 %	9 %	19 %
Karasjok østre sone	4 744	3 526	8 270	446	2 058	2504	10 774	56 %	11 %	29 %
Karasjok vestre sone	4 282	3 200	7 482	457	1 804	2261	9 743	43 %	9 %	22 %
VEST-FINNMARK ¹	12 306	13 428	26 395	1 308	5 177	6485	32 880	49 %	8 %	25 %
Kautokeino østre sone ¹	3 544	2 926	7 131	479	1 310	1789	8 920	46 %	8 %	24 %
Kautokeino midtre sone	5 186	5 804	10 990	482	2 179	2661	13 651	49 %	9 %	26 %
Kautokeino vestre sone	3 576	4 698	8 274	347	1 688	2035	10 309	52 %	8 %	26 %
TROMS ¹	2 791	1 840	4 631	380	1 048	1428	6 059	55 %	11 %	28 %
NORDLAND	2 085	3 231	5 316	510	1 794	2304	7 620	58 %	17 %	33 %
NORD-TRØNDELAG	2 250	2 420	4 670	174	1 194	1368	6 038	46 %	10 %	25 %
SØR-TRØND./HEDM. ¹	883	701	2 355	133	502	635	2 990	23 %	5 %	12 %
REINLAGENE ¹	171	90	408	29	120	149	557	5 %	1 %	3 %
HELE REINDRIFTEN ¹	32 720	30 590	65 062	3 687	15 721	19 408	84 470	44 %	9 %	23 %

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Tall fra Rákkonjárga, Fálá, Vannøy, Riast/Hylling, Lom og Fram er ikke tatt med i beregningene på sone- og områdenivå (heller ikke for hele reindriften samlet) for tap av kalver før og etter merking, grunnet mangel på datagrunnlag.

Tabell 6. Tap av kalver og voksne dyr for driftsåret 2024/25, fordelt på tapsårsak (fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEOMRÅDE	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR		
	<i>Fredet rovvilt</i>	<i>Annen kjent</i>	<i>Annen ukjent</i>	<i>Fredet rovvilt</i>	<i>Annen kjent</i>	<i>Annen ukjent</i>
ØST-FINNMARK	90 %	2 %	8 %	80 %	9 %	11 %
Polmak/Varanger	93 %	2 %	5 %	86 %	7 %	7 %
Karasjok østre sone	88 %	2 %	11 %	85 %	4 %	11 %
Karasjok vestre sone	90 %	3 %	7 %	67 %	17 %	16 %
VEST-FINNMARK	91 %	3 %	6 %	76 %	12 %	12 %
Kautokeino østre sone	89 %	2 %	9 %	64 %	10 %	26 %
Kautokeino midtre sone	90 %	5 %	5 %	84 %	9 %	7 %
Kautokeino vestre sone	93 %	3 %	5 %	75 %	18 %	7 %
TROMS	91 %	4 %	4 %	74 %	16 %	9 %
NORDLAND	93 %	5 %	2 %	84 %	13 %	3 %
NORD-TRØNDELAG	96 %	1 %	3 %	88 %	7 %	5 %
SØR-TRØND./HEDM.	92 %	1 %	7 %	78 %	9 %	13 %
REINLAGENE	97 %	2 %	1 %	68 %	11 %	21 %
HELE REINDRIFTEN	91 %	3 %	6 %	79 %	11 %	10 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 7. Tap av kalver og voksne dyr til rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på rovvilt (ulv, bjørn, kongeørn, jerv og gaupe).

REINBEITEOMRÅDE	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	<i>Ulv</i>	<i>Bjørn</i>	<i>Kongeørn</i>	<i>Jerv</i>	<i>Gaupe</i>	<i>Ulv</i>	<i>Bjørn</i>	<i>Kongeørn</i>	<i>Jerv</i>	<i>Gaupe</i>
ØST-FINNMARK	2 %	3 %	42 %	29 %	24 %	4 %	5 %	6 %	50 %	35 %
Polmak/Varanger	8 %	3 %	34 %	32 %	22 %	12 %	2 %	4 %	53 %	29 %
Karasjok østre sone	0 %	4 %	42 %	29 %	25 %	0 %	7 %	5 %	51 %	37 %
Karasjok vestre sone	0 %	2 %	48 %	25 %	24 %	0 %	5 %	9 %	46 %	40 %
VEST-FINNMARK	0 %	1 %	61 %	18 %	21 %	0 %	1 %	14 %	43 %	42 %
Kautokeino østre sone	0 %	2 %	73 %	13 %	12 %	0 %	2 %	24 %	40 %	33 %
Kautokeino midtre sone	0 %	0 %	57 %	20 %	23 %	0 %	0 %	12 %	40 %	47 %
Kautokeino vestre sone	0 %	0 %	56 %	19 %	24 %	1 %	1 %	7 %	50 %	42 %
TROMS	0 %	0 %	62 %	14 %	24 %	0 %	0 %	18 %	29 %	53 %
NORDLAND	0 %	1 %	31 %	33 %	35 %	0 %	1 %	6 %	47 %	47 %
NORD-TRØNDELAG	1 %	5 %	26 %	44 %	25 %	1 %	4 %	5 %	57 %	34 %
SØR-TRØND./HEDM.	3 %	8 %	39 %	35 %	14 %	5 %	12 %	13 %	45 %	25 %
REINLAGENE	0 %	0 %	81 %	14 %	5 %	0 %	0 %	8 %	63 %	29 %
HELE REINDRIFTEN	1 %	2 %	49 %	25 %	23 %	2 %	3 %	9 %	46 %	40 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 8. Tap av kalver og voksne dyr til andre årsaker enn rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på årsak (trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEOMRÅDE	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent
ØST-FINNMARK	3 %	7 %	5 %	9 %	76 %	9 %	11 %	3 %	21 %	56 %
Polmak/Varanger	9 %	14 %	4 %	5 %	67 %	23 %	20 %	3 %	3 %	52 %
Karasjok østre sone	2 %	4 %	3 %	5 %	86 %	8 %	7 %	1 %	9 %	75 %
Karasjok vestre sone	2 %	6 %	8 %	17 %	67 %	4 %	10 %	4 %	34 %	48 %
VEST-FINNMARK	3 %	18 %	6 %	8 %	65 %	11 %	22 %	5 %	11 %	51 %
Kautokeino østre sone	3 %	6 %	7 %	3 %	80 %	11 %	6 %	4 %	6 %	72 %
Kautokeino midtre sone	3 %	29 %	3 %	11 %	54 %	16 %	9 %	2 %	27 %	46 %
Kautokeino vestre sone	1 %	16 %	10 %	9 %	64 %	6 %	53 %	9 %	3 %	29 %
TROMS	7 %	17 %	12 %	12 %	51 %	26 %	19 %	9 %	10 %	36 %
NORDLAND	9 %	22 %	15 %	26 %	27 %	41 %	23 %	8 %	12 %	16 %
NORD-TRØNDELAG	5 %	8 %	6 %	1 %	80 %	37 %	8 %	12 %	1 %	43 %
SØR-TRØND./HEDM.	6 %	7 %	3 %	2 %	82 %	28 %	6 %	4 %	3 %	59 %
REINLAGENE	8 %	23 %	0 %	23 %	46 %	15 %	11 %	0 %	9 %	66 %
HELE REINDRIFTEN	4 %	13 %	7 %	9 %	67 %	16 %	17 %	5 %	14 %	48 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 9. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvis slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2024/25. Prosentvis slakteuttak og slakteproduksjon per livrein er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Med totalproduksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsendring omregnet til kg per rein i vårflokk (nærmere beskrevet i generelle kommentarer til næringsoversikten).

REINBEITEOMRÅDE	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SLPRODUKSJON	TOTALPRODUKSJON	
	SLUTTAK	SLKVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	24/25	24/25	24/25	24/25	23/24	24/25 ¹
ØST-FINNMARK	20 218	446 374	28 %	6,2	7,6	6,5
Polmak/Varanger	10 283	233 002	42 %	9,5	10,6	8,7
Karasjok østre sone	3 849	85 524	17 %	3,8	4,6	4,0
Karasjok vestre sone	6 086	127 848	24 %	4,9	7,3	6,5
VEST-FINNMARK	20 908	462 798	27 %	6,0	6,2	6,1
Kautokeino østre sone	7 625	173 266	35 %	7,9	6,0	7,4
Kautokeino midtre sone	8 426	179 518	27 %	5,8	6,5	5,8
Kautokeino vestre sone	4 857	110 014	20 %	4,5	6,0	5,4
TROMS	2 126	63 136	16 %	4,9	5,8	5,5
NORDLAND	1 612	50 077	12 %	3,6	3,7	3,7
NORD-TRØNDELAG	4 416	106 579	32 %	7,6	6,7	7,5
SØR-TRØND./HEDM.	7 550	187 061	54 %	13,3	13,9	13,4
REINLAGENE	7 377	219 692	70 %	20,8	20,0	20,6
HELE REINDRIFTEN	64 207	1 535 717	30 %	7,1	7,7	7,3

Landbruksdirektoratet 2025

1 Siste års tall på totalproduksjon per livrein er foreløpig og beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.

Tabell 10. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2024/25. Prosentfordelingen på dyrekategori og slaktetidspunkt er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift. Totalt antall slaktedyr tilsvarer her kun slakt fra registrerte slakterier.

REINBEITEOMRÅDE	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt
	Okse- rein	Simle- rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	
ØST-FINNMARK	5 %	12 %	82 %	90 %	10 %	45 %	46 %	9 %	18 226
Polmak/Varanger	4 %	16 %	80 %	96 %	4 %	44 %	50 %	5 %	9 910
Karasjok østre sone	10 %	10 %	81 %	85 %	15 %	21 %	51 %	28 %	3 263
Karasjok vestre sone	4 %	8 %	88 %	83 %	17 %	61 %	35 %	4 %	5 053
VEST-FINNMARK	6 %	12 %	82 %	86 %	14 %	56 %	34 %	10 %	17 972
Kautokeino østre sone	3 %	11 %	86 %	88 %	12 %	59 %	41 %	0 %	6 724
Kautokeino midtre sone	4 %	13 %	83 %	83 %	17 %	82 %	18 %	0 %	7 022
Kautokeino vestre sone	13 %	14 %	73 %	87 %	13 %	8 %	49 %	43 %	4 226
TROMS	14 %	11 %	75 %	82 %	18 %	27 %	60 %	13 %	1 750
NORDLAND	14 %	19 %	67 %	81 %	19 %	30 %	60 %	11 %	1 306
NORD-TRØNDELAG	14 %	16 %	69 %	96 %	4 %	27 %	39 %	33 %	4 223
SØR-TRØND./HEDM.	10 %	10 %	79 %	97 %	3 %	9 %	61 %	30 %	7 306
REINLAGENE	15 %	14 %	71 %	100 %	0 %	49 %	28 %	23 %	7 371
HELE REINDRIFTEN	8 %	13 %	79 %	91 %	9 %	42 %	42 %	16 %	58 154

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2024/25. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktedyr (n) til grunn for beregningene på slaktevekter er gitt i parentes.

REINBEITEOMRÅDE		Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
ØST-FINNMARK		48,9	(453)	27,8	(498)	31,6	(2054)	26,6	(204)	18,4	(15017)
Polmak/Varanger		52,8	(238)	29,7	(166)	32,6	(1404)	27,4	(159)	19,2	(7943)
Karasjok østre sone		39,6	(98)	27,5	(222)	31,0	(283)	24,9	(31)	18,2	(2629)
Karasjok vestre sone		48,5	(117)	25,6	(110)	28,4	(367)	22,0	(14)	17,1	(4445)
VEST-FINNMARK		47,0	(500)	26,8	(554)	29,1	(2063)	23,2	(116)	18,3	(14739)
Kautokeino østre sone		51,5	(164)	26,8	(47)	30,8	(692)	25,3	(22)	19,1	(5799)
Kautokeino midtre sone		49,2	(114)	27,8	(178)	27,6	(830)	22,7	(55)	17,7	(5845)
Kautokeino vestre sone		42,5	(222)	26,2	(329)	29,1	(541)	22,6	(39)	18,1	(3095)
TROMS		53,8	(157)	34,2	(89)	36,2	(171)	30,8	(17)	22,2	(1316)
NORDLAND		57,8	(151)	41,6	(37)	33,3	(234)	35,7	(14)	21,2	(870)
NORD-TRØNDELAG		43,2	(285)	28,6	(315)	31,2	(596)	25,5	(94)	19,8	(2933)
SØR-TRØND./HEDM.		56,3	(229)	33,1	(519)	34,1	(688)	26,1	(77)	21,2	(5793)
REINLAGENE		51,9	(56)	40,2	(1051)	39,4	(967)	31,9	(31)	25,7	(5266)
HELE REINDRIFTEN		49,7	(1831)	33,2	(3063)	32,3	(6773)	26,3	(553)	19,8	(45934)

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 12. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år (varit) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
ØST-FINNMARK	26,7	28,5	28,2	27,2	26,7	27,7	27,4	28,4	27,5	27,8
Polmak/Varanger	27,4	30,5	30,5	28,7	28,4	28,0	28,6	29,7	31,0	29,7
Karasjok østre sone	27,4	29,9	28,1	28,2	27,0	28,2	26,9	27,2	27,5	27,5
Karasjok vestre sone	24,7	26,0	26,1	26,0	24,0	26,3	24,4	26,9	24,8	25,6
VEST-FINNMARK	23,1	25,0	26,8	25,1	24,2	26,1	26,0	27,3	26,6	26,8
Kautokeino østre sone	26,6	25,8	27,2	23,9	23,7	27,9	27,2	25,6	26,2	26,8
Kautokeino midtre sone	23,3	25,2	27,2	25,6	24,3	26,3	28,4	28,5	26,7	27,8
Kautokeino vestre sone	22,0	23,7	23,6	25,4	24,4	24,1	21,2	26,0	26,5	26,2
TROMS	33,4	33,4	36,1	32,3	33,9	32,8	34,2	37,4	34,0	34,2
NORDLAND	36,9	36,6	36,5	36,4	34,2	34,4	40,1	35,6	35,6	41,6
NORD-TRØNDELAG	29,3	31,6	29,9	29,6	28,7	29,5	28,7	28,8	29,2	28,6
SØR-TRØND./HEDM.	33,0	33,3	30,6	31,7	31,6	30,5	31,9	33,7	33,1	33,1
REINLAGENE	39,5	38,9	40,9	38,8	40,4	39,0	40,4	42,1	41,2	40,2
HELE REINDRIFTEN	30,5	30,6	32,5	31,7	31,8	31,8	34,1	33,8	33,9	33,2

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 13. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år (aldu/rotnu) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
ØST-FINNMARK	29,4	30,4	30,4	29,4	28,5	30,9	28,4	32,3	31,3	31,6
Polmak/Varanger	31,6	32,2	33,6	30,9	30,8	32,1	29,9	34,3	32,1	32,6
Karasjok østre sone	29,8	30,9	31,3	29,8	28,4	31,2	27,7	30,0	29,2	31,0
Karasjok vestre sone	26,4	27,5	27,1	27,6	25,8	28,8	26,4	29,2	26,3	28,4
VEST-FINNMARK	25,2	28,2	26,4	27,6	26,4	28,4	26,7	29,9	27,2	29,1
Kautokeino østre sone	28,5	29,6	29,6	28,4	27,8	29,1	27,2	31,4	26,8	30,8
Kautokeino midtre sone	24,3	26,9	24,9	27,2	25,5	28,3	27,0	29,8	27,0	27,6
Kautokeino vestre sone	24,8	28,8	26,2	27,3	25,7	27,7	24,6	28,8	27,9	29,1
TROMS	36,1	36,9	38,0	36,6	36,5	37,8	35,5	36,9	36,8	36,2
NORDLAND	34,4	35,6	35,3	34,4	35,9	34,9	34,6	34,5	35,5	33,3
NORD-TRØNDELAGE	32,6	33,6	33,8	32,7	32,3	33,7	32,1	33,1	32,4	31,2
SØR-TRØND./HEDM.	34,2	33,9	32,6	33,2	33,0	34,6	34,3	35,1	34,1	34,1
REINLAGENE	39,7	38,6	39,1	38,7	40,3	40,2	40,8	41,0	39,8	39,4
HELE REINDRIFTEN	30,2	30,7	31,0	30,7	29,9	32,2	31,1	33,2	31,2	32,3

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 14. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv (miessi) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
ØST-FINNMARK	19,5	19,9	18,0	18,6	19,0	18,8	18,9	19,6	18,8	18,4
Polmak/Varanger	20,6	21,0	19,5	19,6	20,1	19,2	19,7	20,1	20,0	19,2
Karasjok østre sone	19,5	19,8	17,9	18,7	18,9	18,3	18,4	19,0	18,7	18,2
Karasjok vestre sone	17,5	17,9	16,7	17,0	17,1	18,4	18,1	19,1	17,2	17,1
VEST-FINNMARK	16,5	17,2	16,1	16,8	16,9	16,7	17,5	18,9	17,6	18,3
Kautokeino østre sone	18,1	18,2	17,8	17,6	18,5	18,0	19,3	19,6	18,1	19,1
Kautokeino midtre sone	15,9	16,5	15,5	16,4	16,4	16,4	17,2	18,5	17,3	17,7
Kautokeino vestre sone	15,9	16,7	15,7	16,7	15,9	15,7	15,7	18,2	17,5	18,1
TROMS	22,8	23,5	23,3	22,9	21,8	22,3	22,4	23,3	22,7	22,2
NORDLAND	21,7	23,0	22,1	21,8	21,9	21,8	21,9	21,7	22,4	21,2
NORD-TRØNDELAGE	19,8	21,0	20,3	19,7	19,7	19,8	19,7	19,8	19,7	19,8
SØR-TRØND./HEDM.	21,3	22,3	20,4	20,2	19,7	19,9	20,4	21,5	20,6	21,2
REINLAGENE	24,4	24,0	25,2	23,9	24,2	24,8	24,6	25,6	24,6	25,7
HELE REINDRIFTEN	19,0	19,6	18,8	18,9	18,8	19,4	19,4	20,5	19,4	19,8

Landbruksdirektoratet 2025

Vedlegg 2 - Næringsoversikt Øst-Finnmark

Tabell 1. Antall siidaandeler med rein og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2024/25 (per 31. mars 2025). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER	SIIDAER	
		i siidaandelene	Sommer	Vinter
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	2	3	1	1
5A - Pasvik	4	18	1	1
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	4	23	1	1
6 - Várjjatnjárga	15	73	1	1
7 - Rákkonjárga	8	25	1	2
9 - Čorgaš	10	82	1	4
Polmak/Varanger	43	224	6	10
13 - Lágesduottar	19	91	1	5
14 - Spierttanjárga	11	54	1	1
14A - Spierttagáisá	21	139	2	9
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	14	103	1	7
Munkavári siida	7	36	1	3
Karasjok østre sone	51	284	4	15
16 - Kárašjoga oarjabealli	71	373	9	23 ²
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	10	59	1	3 ^{1a}
Skuohtanjárgga siida	18	75	1	5 ^{1a, 1b}
Skáiddeduottar siida	6	39	1	2
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	7	36	1	2 ^{1b}
Jáhkenjárgga siida	3	15	1	4 ^{1c}
Rávdol siida	4	13	1	2
Láhtin siida	8	70	1	3 ^{1c}
Njeaiddán siida	8	35	1	3
Vuorje siida	7	31	1	2
Karasjok vestre sone	71	373	9	23
ØST-FINNMARK	165	881	19	48

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Felles vintersiida mellom a. Máhkaravjju- og Skuohtanjárgga siida, b. Skuohtanjárgga- og Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida, c. Jáhkenjárgga- og Láhtin siida.
- 2 Sumtallet for distrikt 16 er korrigert ned med 3 siidaer på grunn av felles vintersiidaer mellom siidaandeler fra ulike sommersiidaer.

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars, med unntak av siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	538	553	589	621	668	711	681	642	816	677
5A - Pasvik	2 530	2 449	2 403	2 433	2 403	2 293	2 214	2 140	2 000	1 776
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	1 799	1 776	1 841	1 926	2 001	2 000	1 986	1 976	1 989	1 979
6 - Várjjatnjárga	10 865	10 394	10 600	10 250	10 719	10 724	10 981	10 976	10 987	10 994
7 - Rákkonjárga	3 972	4 032	3 871	3 941	4 026	4 175	3 918	3 776	3 743	3 682
9 - Čorgaš	4 993	5 056	5 130	5 310	5 344	5 365	4 722	4 793	4 882	4 858
Polmak/Varanger	24 697	24 260	24 434	24 481	25 161	25 268	24 502	24 303	24 417	23 966
13 - Lágesduottar	10 734	10 056	10 877	11 540	11 702	12 479	12 182	9 977	10 107	10 086
14 - Spierrttanjárga	2 857	3 207	3 363	3 876	4 357	4 737	4 784	4 946	5 065	5 367
14A - Spierrttagáisá	7 061	6 740	6 777	6 822	6 763	6 932	6 909	7 082	7 101	6 916
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	4 652	4 530	4 474	4 205	4 124	4 159	4 214	4 412	4 414	4 308
Munkavári siida	2 409	2 210	2 303	2 617	2 639	2 773	2 695	2 670	2 687	2 608
Karasjok østre sone	20 652	20 003	21 017	22 238	22 822	24 148	23 875	22 005	22 273	22 369
16 - Kárašjoga oarjabealli	23 454	24 274	24 894	23 457	23 417	22 955	23 924	25 047	25 854	27 716
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	3 488	3 472	3 927	3 908	3 899	3 582	3 738	3 875	4 208	4 464
Skuohtanjárgga siida	3 993	4 409	4 622	4 699	4 574	4 659	4 681	5 048	5 481	5 848
Skáiddeduottar siida	5 458	5 700	5 181	4 106	4 424	4 438	4 970	5 406	5 096	5 919
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	2 557	2 571	2 549	2 559	2 553	2 567	2 574	2 556	2 582	2 585
Jáhkenjárgga siida	1 317	1 325	1 453	1 332	1 041	835	920	985	1 080	1 076
Rávdol siida	1 219	1 204	1 377	1 238	1 237	1 196	1 225	1 386	1 498	1 380
Láhtin siida	1 603	1 781	1 816	1 625	1 633	1 611	1 696	1 734	1 811	1 933
Njeaiddán siida	1 908	1 902	1 999	2 024	2 029	2 021	2 023	1 926	1 977	2 034
Vuorje siida	1 911	1 910	1 970	1 966	2 027	2 046	2 097	2 131	2 121	2 477
Karasjok vestre sone	23 454	24 274	24 894	23 457	23 417	22 955	23 924	25 047	25 854	27 716
ØST-FINNMARK	68 803	68 537	70 345	70 176	71 400	72 371	72 301	71 355	72 544	74 051

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2024/25 (ukorrigert reintall per 31. mars 2025).

	<i>Okserlein</i>	<i>Simlerein</i>	<i>Kalv</i>	<i>pr. 31.03.25</i>
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	8 %	77 %	15 %	677
5A - Pasvik	4 %	86 %	10 %	1 776
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	6 %	74 %	19 %	1 979
6 - Várjjatnjárga	4 %	80 %	16 %	10 994
7 - Rákkonjárga	7 %	77 %	17 %	3 682
9 - Čorgaš	3 %	79 %	18 %	4 858
Polmak/Varanger	4 %	79 %	16 %	23 966
13 - Lágesduottar	3 %	79 %	17 %	10 086
14 - Spierttanjárga	12 %	68 %	20 %	5 367
14A - Spierttagáisa	5 %	81 %	13 %	6 916
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	6 %	81 %	14 %	4 308
Munkavári siida	5 %	83 %	13 %	2 608
Karasjok østre sone	6 %	77 %	17 %	22 369
16 - Kárašjoga oarjabealli	6 %	74 %	20 %	27 716
Máhkáravjju ja Stikonjágga siida	5 %	75 %	20 %	4 464
Skuohtanjágga siida	6 %	76 %	18 %	5 848
Skáiddeduottar siida	3 %	70 %	27 %	5 919
Márrenjágga ja Boalotnjágga siida	8 %	76 %	16 %	2 585
Jáhkenjágga siida	7 %	73 %	20 %	1 076
Rávdol siida	9 %	74 %	17 %	1 380
Láhtin siida	9 %	70 %	20 %	1 933
Njeaiddán siida	3 %	84 %	13 %	2 034
Vuorje siida	9 %	69 %	22 %	2 477
Karasjok vestre sone	6 %	74 %	20 %	27 716
ØST-FINNMARK	5 %	77 %	18 %	74 051

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2024/25. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved slutten av forrige driftsår (korrigert simletall per 31. mars 2024). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER i vårflokk	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
		Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	592	538	473	438	91 %	80 %	74 %
5A - Pasvik	1 673	1 603	1 133	1 051	96 %	68 %	63 %
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	1 493	1 391	1 321	976	93 %	88 %	65 %
6 - Várjjatnjárga	8 990	7 589	5 599	4 234	84 %	62 %	47 %
7 - Rákkonjárga	3 090	2 931	2 696	2 758	95 %	87 %	89 %
9 - Čorgaš	3 936	3 424	2 811	2 484	87 %	71 %	63 %
Polmak/Varanger	19 774	17 476	14 033	11 941	88 %	71 %	60 %
13 - Lágesduottar	8 143	6 747	4 790	2 951	83 %	59 %	36 %
14 - Spierttanjárga	3 572	2 964	1 853	1 499	83 %	52 %	42 %
14A - Spierttagáisá	5 651	5 007	3 331	1 998	89 %	59 %	35 %
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	3 532	3 281	1 976	1 283	93 %	56 %	36 %
Munkavári siida	2 119	1 726	1 355	715	81 %	64 %	34 %
Karasjok østre sone	17 366	14 718	9 974	6 448	85 %	57 %	37 %
16 - Kárašjoga oarjabealli	19 965	17 575	13 293	10 093	88 %	67 %	51 %
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	3 114	2 573	1 610	1 320	83 %	52 %	42 %
Skuohtanjárgga siida	4 087	3 749	3 127	2 419	92 %	77 %	59 %
Skáiddeduottar siida	4 424	3 926	3 089	2 298	89 %	70 %	52 %
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	1 994	1 772	1 164	845	89 %	58 %	42 %
Jáhkenjárgga siida	744	677	472	353	91 %	63 %	47 %
Rávdol siida	1 016	796	640	457	78 %	63 %	45 %
Láhtin siida	1 278	1 126	789	728	88 %	62 %	57 %
Njeaiddán siida	1 652	1 529	1 261	747	93 %	76 %	45 %
Vuorje siida	1 656	1 427	1 141	926	86 %	69 %	56 %
Karasjok vestre sone	19 965	17 575	13 293	10 093	88 %	67 %	51 %
ØST-FINNMARK	57 105	49 769	37 300	28 482	87 %	65 %	50 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2024/25. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2024, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2024.

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt	TAP	Kalv	Voksne	Totalt
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	65	35	100	2	10	12	112	19 %	1 %	8 %
5A - Pasvik	470	82	552	18	256	274	826	34 %	14 %	23 %
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	70	345	415	12	126	138	553	30 %	7 %	16 %
6 - Várjjatnjárga	1 990	1 365	3 355	150	1 122	1 272	4 627	44 %	12 %	25 %
7 - Rákkonjárga	1	1	173	19	71	90	263	6 %	2 %	4 %
9 - Čorgaš	613	327	940	49	439	488	1 428	27 %	10 %	17 %
Polmak/Varanger ²	3 208	2 154	5 355	250	2 024	2 274	7 809	32 %	9 %	19 %
13 - Lágesduottar	1 957	1 839	3 796	179	987	1 166	4 962	56 %	12 %	29 %
14 - Spiertanjárga	1 111	354	1 465	158	445	603	2 068	49 %	12 %	26 %
14A - Spierttagáisá	1 676	1 333	3 009	109	626	735	3 744	60 %	10 %	31 %
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	1 305	693	1 998	75	409	484	2 482	61 %	11 %	32 %
Munkavári siida	371	640	1 011	34	217	251	1 262	59 %	9 %	29 %
Karasjok østre sone	4 744	3 526	8 270	446	2 058	2 504	10 774	56 %	11 %	29 %
16 - Kárašjoga oarjabealli	4 282	3 200	7 482	457	1 804	2 261	9 743	43 %	9 %	22 %
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	963	290	1 253	64	299	363	1 616	49 %	9 %	24 %
Skuohtanjárgga siida	622	708	1 330	48	215	263	1 593	35 %	5 %	17 %
Skáiddeduottar siida	837	791	1 628	68	535	603	2 231	41 %	12 %	25 %
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	608	319	927	57	249	306	1 233	52 %	12 %	28 %
Jáhkenjárgga siida	205	119	324	53	70	123	447	48 %	11 %	25 %
Rávdol siida	156	183	339	66	197	263	602	43 %	18 %	26 %
Láhtin siida	337	61	398	33	105	138	536	35 %	8 %	18 %
Njeaiddán siida	268	514	782	21	88	109	891	51 %	6 %	25 %
Vuorje siida	286	215	501	47	46	93	594	35 %	4 %	17 %
Karasjok vestre sone	4 282	3 200	7 482	457	1 804	2 261	9 743	43 %	9 %	22 %
ØST-FINNMARK ²	12 234	8 880	21 287	1 153	5 886	7 039	28 326	43 %	10 %	23 %

Landbruksdirektoratet 2025

- Ikke oppgitt grunnet mangel på datagrunnlag. Tidspunkt for merking i de enkelte siidaandelene kan påvirke datagrunnlaget.
- Tall for kalvetap før og etter merking i Rákkonjárga er ikke tatt med i totalberegningene for verken Polmak/Varanger eller Øst-Finnmark, grunnet mangel på datagrunnlag.

Tabell 6. Tap av kalver og voksne dyr for driftsåret 2024/25, fordelt på tapsårsak (fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR		
	<i>Fredet rovvilt</i>	<i>Annen kjent</i>	<i>Annen ukjent</i>	<i>Fredet rovvilt</i>	<i>Annen kjent</i>	<i>Annen ukjent</i>
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	100 %	0 %	0 %	83 %	17 %	0 %
5A - Pasvik	96 %	4 %	0 %	96 %	3 %	1 %
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	92 %	5 %	3 %	70 %	25 %	5 %
6 - Várjjatnjárga	95 %	2 %	2 %	88 %	7 %	5 %
7 - Rákkonjárga	98 %	0 %	2 %	90 %	6 %	4 %
9 - Čorgaš	79 %	2 %	19 %	78 %	3 %	19 %
Polmak/Varanger	93 %	2 %	5 %	86 %	7 %	7 %
13 - Lágesduottar	84 %	1 %	15 %	87 %	2 %	11 %
14 - Spierttanjárga	89 %	6 %	5 %	79 %	8 %	13 %
14A - Spierttagáisa	91 %	1 %	8 %	87 %	3 %	10 %
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	94 %	1 %	5 %	92 %	3 %	5 %
Munkavári siida	85 %	2 %	12 %	79 %	3 %	18 %
Karasjok østre sone	88 %	2 %	11 %	85 %	4 %	11 %
16 - Kárašjoga oarjabealli	90 %	3 %	7 %	67 %	17 %	16 %
Máhkáravju ja Stikonjárgga siida	88 %	4 %	8 %	52 %	20 %	28 %
Skuohtanjárgga siida	93 %	3 %	4 %	86 %	8 %	5 %
Skáiddeduottar siida	89 %	6 %	5 %	57 %	34 %	8 %
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	90 %	1 %	10 %	82 %	6 %	12 %
Jáhkenjárgga siida	85 %	0 %	15 %	80 %	5 %	15 %
Rávdol siida	86 %	6 %	8 %	74 %	10 %	16 %
Láhtin siida	92 %	5 %	3 %	59 %	12 %	30 %
Njeaiddán siida	96 %	1 %	3 %	72 %	13 %	16 %
Vuorje siida	89 %	1 %	10 %	55 %	2 %	43 %
Karasjok vestre sone	90 %	3 %	7 %	67 %	17 %	16 %
ØST-FINNMARK	90 %	2 %	8 %	80 %	9 %	11 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 7. Tap av kalver og voksne dyr til rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på rovvilt (ulv, bjørn, kongeørn, jerv og gaupe).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	20 %	50 %	10 %	10 %	10 %	50 %	0 %	0 %	20 %	30 %
5A - Pasvik	64 %	14 %	5 %	8 %	10 %	81 %	10 %	1 %	4 %	5 %
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	9 %	10 %	35 %	24 %	21 %	17 %	17 %	4 %	38 %	25 %
6 - Várjjatnjárga	0 %	0 %	41 %	36 %	22 %	0 %	0 %	4 %	64 %	32 %
7 - Rákkonjárga	0 %	0 %	39 %	36 %	24 %	0 %	0 %	6 %	68 %	26 %
9 - Čorgaš	0 %	0 %	28 %	39 %	33 %	0 %	0 %	7 %	53 %	40 %
Polmak/Varanger	8 %	3 %	34 %	32 %	22 %	12 %	2 %	4 %	53 %	29 %
13 - Lágesduottar	0 %	3 %	40 %	34 %	24 %	0 %	5 %	4 %	58 %	34 %
14 - Spierttanjárga	0 %	0 %	51 %	24 %	25 %	0 %	0 %	9 %	45 %	46 %
14A - Spierttagáisá	0 %	8 %	39 %	26 %	27 %	0 %	15 %	4 %	44 %	37 %
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	0 %	8 %	43 %	24 %	24 %	0 %	16 %	4 %	46 %	35 %
Munkavári siida	0 %	7 %	31 %	30 %	32 %	0 %	15 %	5 %	39 %	41 %
Karasjok østre sone	0 %	4 %	42 %	29 %	25 %	0 %	7 %	5 %	51 %	37 %
16 - Kárašjoga oarjabealli	0 %	2 %	48 %	25 %	24 %	0 %	5 %	9 %	46 %	40 %
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	0 %	5 %	49 %	21 %	25 %	0 %	10 %	16 %	42 %	32 %
Skuohtanjárgga siida	0 %	5 %	54 %	19 %	21 %	1 %	11 %	5 %	44 %	38 %
Skáiddeduottar siida	0 %	0 %	48 %	31 %	21 %	0 %	0 %	10 %	48 %	42 %
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	0 %	2 %	37 %	32 %	30 %	0 %	4 %	1 %	44 %	51 %
Jáhkenjárgga siida	0 %	8 %	55 %	22 %	15 %	0 %	9 %	0 %	55 %	36 %
Rávdol siida	0 %	0 %	47 %	30 %	23 %	0 %	0 %	13 %	51 %	36 %
Láhtin siida	0 %	0 %	72 %	16 %	13 %	0 %	6 %	16 %	48 %	30 %
Njeaiddán siida	0 %	1 %	37 %	26 %	37 %	0 %	3 %	13 %	42 %	42 %
Vuorje siida	0 %	0 %	50 %	29 %	21 %	0 %	14 %	4 %	41 %	41 %
Karasjok vestre sone	0 %	2 %	48 %	25 %	24 %	0 %	5 %	9 %	46 %	40 %
ØST-FINNMARK	2 %	3 %	42 %	29 %	24 %	4 %	5 %	6 %	50 %	35 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 8. Tap av kalver og voksne dyr til andre årsaker enn rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på årsak (trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEOMRÅDE	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent
1/2/3 - Østre Sør-Varanger ¹	-	-	-	-	-	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5A - Pasvik	48 %	0 %	48 %	0 %	5 %	42 %	0 %	33 %	0 %	25 %
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	15 %	33 %	9 %	6 %	36 %	31 %	29 %	10 %	14 %	17 %
6 - Várjjatnjárga	12 %	28 %	2 %	9 %	49 %	27 %	30 %	1 %	1 %	40 %
7 - Rákkonjárga	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	44 %	0 %	0 %	11 %	44 %
9 - Čorgaš	3 %	2 %	0 %	3 %	92 %	7 %	7 %	0 %	0 %	87 %
Polmak/Varanger	9 %	14 %	4 %	5 %	67 %	23 %	20 %	3 %	3 %	52 %
13 - Lágesduottar	0 %	1 %	0 %	2 %	97 %	5 %	3 %	0 %	5 %	87 %
14 - Spierttanjárga	11 %	14 %	9 %	18 %	48 %	11 %	13 %	2 %	13 %	60 %
14A - Spierttagáisá	0 %	5 %	5 %	3 %	87 %	10 %	5 %	2 %	8 %	75 %
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	0 %	6 %	0 %	3 %	91 %	20 %	5 %	3 %	13 %	60 %
Munkavári siida	0 %	5 %	9 %	3 %	83 %	2 %	6 %	2 %	4 %	87 %
Karasjok østre sone	2 %	4 %	3 %	5 %	86 %	8 %	7 %	1 %	9 %	75 %
16 - Kárašjoga oarjabealli	2 %	6 %	8 %	17 %	67 %	4 %	10 %	4 %	34 %	48 %
Máhkáravju ja Stikonjárgga siida	1 %	5 %	16 %	9 %	69 %	1 %	24 %	8 %	10 %	57 %
Skuohtanjárgga siida	11 %	10 %	9 %	14 %	57 %	36 %	8 %	0 %	17 %	39 %
Skáiddeduottar siida	0 %	9 %	9 %	36 %	46 %	1 %	4 %	3 %	73 %	20 %
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	0 %	0 %	0 %	5 %	95 %	5 %	0 %	2 %	25 %	67 %
Jáhkenjárgga siida	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	25 %	0 %	0 %	0 %	75 %
Rávdol siida	2 %	9 %	7 %	24 %	59 %	1 %	9 %	4 %	24 %	62 %
Láhtin siida	0 %	0 %	17 %	47 %	37 %	0 %	0 %	4 %	25 %	72 %
Njeaidán siida	7 %	11 %	4 %	0 %	79 %	6 %	39 %	0 %	0 %	55 %
Vuorje siida	0 %	4 %	5 %	4 %	88 %	0 %	5 %	0 %	0 %	95 %
Karasjok vestre sone	2 %	6 %	8 %	17 %	67 %	4 %	10 %	4 %	34 %	48 %
ØST-FINNMARK	3 %	7 %	5 %	9 %	76 %	9 %	11 %	3 %	21 %	56 %

Landbruksdirektoratet 2025

1 I Østre Sør-Varanger ble ingen kalver meldt tapt til andre tapsårsaker enn fredet rovvilt.

Tabell 9. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvis slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2024/25. Prosentvis slakteuttak og slakteproduksjon per livrein er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Med totalproduksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsending omregnet til kg per rein i vårflokk (nærmere beskrevet i generelle kommentarer til næringsoversikten).

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT SLUTTAK (antall dyr) 24/25	TOTALT SLKVANTUM (antall kg) 24/25	SLAKTE- PROSENT (% av vårflokk) 24/25	SLPRODUKSJON pr.livrein (kg/dyr) 24/25	TOTALPRODUKSJON pr. livrein (kg/dyr) 23/24 24/25 ¹	
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	565	14 481	69 %	17,7	21,5	11,6
5A - Pasvik	1 001	23 642	50 %	11,8	11,3	8,7
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	848	17 593	43 %	8,8	8,5	8,8
6 - Várjjatnjárga	3 042	68 174	28 %	6,2	9,3	6,0
7 - Rákkonjárga	2 743	66 119	73 %	17,7	16,6	16,2
9 - Čorgaš	2 084	42 993	43 %	8,8	8,0	8,4
Polmak/Varanger	10 283	233 002	42 %	9,5	10,6	8,7
13 - Lágesduottar	1 810	39 570	18 %	3,9	4,3	3,8
14 - Spierttanjárga	588	12 917	12 %	2,6	4,2	4,0
14A - Spierttagáisá ²	1 451	33 037	20 %	4,7	5,4	4,2
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	905	20 438	21 %	4,6	5,3	4,0
Munkavári siida	543	12 511	20 %	4,7	5,5	4,4
Karasjok østre sone	3 849	85 524	17 %	3,8	4,6	4,0
16 - Kárašjoga oarjabealli ²	6 086	127 848	24 %	4,9	7,4	6,5
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	663	16 747	16 %	4,0	6,7	5,7
Skuohtanjárgga siida	1 719	34 481	31 %	6,3	8,7	8,1
Skáiddeduottar siida	872	16 909	17 %	3,3	7,8	5,5
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	674	14 464	26 %	5,6	6,1	5,7
Jáhkenjárgga siida	240	5 537	22 %	5,1	8,1	5,3
Rávdol siida	312	7 389	21 %	4,9	5,7	3,8
Láhtin siida	501	10 730	28 %	5,9	6,2	7,7
Njeaiddán siida	576	11 662	29 %	5,9	7,4	6,7
Vuorje siida	503	9 488	24 %	4,5	4,5	7,8
Karasjok vestre sone	6 086	127 848	24 %	4,9	7,3	6,5
ØST-FINNMARK	20 218	446 374	28 %	6,2	7,6	6,5

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Siste års tall på totalproduksjon per livrein er foreløpig og beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.
- 2 For Spierttagáisá og Kárašjoga oarjabealli er det noe av slaktet som ikke er registrert ned til siidanivå, noe som gir et høyere slakteuttak i disse distriktene enn hva som framgår i summen til siidaene.

Tabell 10. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2024/25. Prosentfordelingen på dyrekategori og slaktetidspunkt er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift. Totalt antall slaktedyr tilsvarer her kun slakt fra registrerte slakterier.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt Antall slaktedyr
	Okse- rein	Simle- rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	15 %	24 %	61 %	96 %	4 %	0 %	90 %	10 %	545
5A - Pasvik	2 %	11 %	87 %	99 %	1 %	0 %	100 %	0 %	995
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	5 %	24 %	71 %	96 %	4 %	1 %	99 %	0 %	816
6 - Várjjatnjárga	4 %	11 %	84 %	95 %	5 %	34 %	66 %	0 %	2 890
7 - Rákkonjárga	3 %	17 %	79 %	97 %	3 %	72 %	28 %	0 %	2 668
9 - Čorgaš	2 %	17 %	81 %	96 %	4 %	75 %	2 %	24 %	1 996
Polmak/Varanger	4 %	16 %	80 %	96 %	4 %	44 %	50 %	5 %	9 910
13 - Lágesduottar	14 %	13 %	73 %	90 %	10 %	7 %	49 %	44 %	1 638
14 - Spierttanjárga	5 %	5 %	90 %	86 %	14 %	0 %	71 %	29 %	504
14A - Spierttagáisá ¹	6 %	7 %	87 %	77 %	23 %	51 %	45 %	3 %	1 121
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	7 %	7 %	86 %	81 %	19 %	42 %	53 %	5 %	737
Munkavári siida	3 %	6 %	90 %	70 %	30 %	69 %	30 %	1 %	381
Karasjok østre sone	10 %	10 %	81 %	85 %	15 %	21 %	51 %	28 %	3 263
16 - Kárašjoga oarjabealli ¹	4 %	8 %	88 %	83 %	17 %	61 %	35 %	4 %	5 053
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	18 %	6 %	76 %	75 %	25 %	64 %	36 %	0 %	495
Skuohtanjárgga siida	3 %	6 %	91 %	83 %	17 %	62 %	38 %	0 %	1 433
Skáiddeduottar siida	0 %	3 %	97 %	84 %	16 %	99 %	1 %	0 %	731
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	3 %	4 %	94 %	85 %	15 %	99 %	1 %	0 %	575
Jáhkenjárgga siida	2 %	26 %	72 %	78 %	23 %	1 %	99 %	1 %	186
Rávdol siida	0 %	8 %	92 %	70 %	30 %	75 %	25 %	0 %	219
Láhtin siida	5 %	12 %	83 %	79 %	21 %	4 %	96 %	0 %	394
Njeaiddán siida	3 %	10 %	88 %	91 %	9 %	80 %	8 %	12 %	526
Vuorje siida	9 %	12 %	79 %	93 %	7 %	1 %	73 %	25 %	468
Karasjok vestre sone	4 %	8 %	88 %	83 %	17 %	61 %	35 %	4 %	5 053
ØST-FINNMARK	5 %	12 %	82 %	90 %	10 %	45 %	46 %	9 %	18 226

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 For Spierttagáisá og Kárašjoga oarjabealli er det noe av slaktet som ikke er registrert ned til siidanivå, noe som gir et høyere slakteuttak i disse distriktene enn hva som framgår i summen til siidaene.

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekt for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2024/25. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktedyr (n) til grunn for beregningene på slaktevekt er gitt i parentes.

REINBEITEDISTRIKT

	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	38,0	(15)	32,2	(67)	33,7	(81)	29,4	(49)	20,7	(333)
5A - Pasvik	1	(3)	30,6	(19)	38,3	(104)	1	(1)	21,6	(868)
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	40,0	(16)	25,9	(25)	27,9	(170)	24,3	(22)	17,0	(583)
6 - Várjatanjárga	52,2	(117)	27,2	(10)	31,9	(274)	27,3	(56)	19,0	(2433)
7 - Rákkonjárga	62,6	(73)	31,6	(12)	34,7	(458)	1	(8)	20,1	(2117)
9 - Čorgaš	40,1	(14)	27,0	(33)	30,4	(317)	25,3	(23)	17,6	(1609)
Polmak/Varanger	52,8	(238)	29,7	(166)	32,6	(1404)	27,4	(159)	19,2	(7943)
13 - Lágesduottar	40,4	(73)	27,2	(154)	30,6	(189)	24,5	(26)	17,3	(1196)
14 - Spierttanjárga	1	(8)	28,1	(18)	33,2	(23)	1	(2)	19,2	(453)
14A - Spierttagáisá ²	37,7	(17)	27,9	(50)	31,4	(71)	1	(3)	18,9	(980)
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	37,2	(15)	27,9	(38)	31,8	(46)	1	(2)	19,1	(636)
Munkavári siida	1	(2)	27,5	(11)	30,7	(24)	1	(0)	18,6	(344)
Karasjok østre sone	39,6	(98)	27,5	(222)	31,0	(283)	24,9	(31)	18,2	(2629)
16 - Kárašjoga oarjabealli ²	48,5	(117)	25,6	(110)	28,4	(367)	22,0	(14)	17,1	(4445)
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	51,9	(66)	27,9	(24)	30,3	(29)	1	(1)	17,2	(375)
Skuohtanjárgga siida	48,4	(12)	23,9	(28)	28,9	(85)	1	(1)	16,6	(1307)
Skáiddeduottar siida	1	(1)	1	(1)	27,0	(20)	1	(1)	16,7	(708)
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	47,4	(12)	1	(4)	30,0	(21)	1	(0)	18,6	(538)
Jáhkenjárgga siida	1	(2)	1	(2)	27,8	(48)	1	(0)	17,5	(134)
Rávdol siida	1	(0)	1	(0)	30,2	(17)	1	(1)	19,4	(201)
Láhtin siida	1	(9)	24,5	(10)	26,8	(47)	1	(1)	16,6	(327)
Njeaiddán siida	1	(0)	26,0	(14)	29,5	(48)	1	(2)	17,9	(462)
Vuorje siida	38,3	(15)	25,0	(27)	26,8	(52)	1	(6)	15,3	(368)
Karasjok vestre sone	48,5	(117)	25,6	(110)	28,4	(367)	22,0	(14)	17,1	(4445)
ØST-FINNMARK	48,9	(453)	27,8	(498)	31,6	(2054)	26,6	(204)	18,4	(15017)

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.
- 2 For Spierttagáisá og Kárašjoga oarjabealli er det noe av slaktet som ikke er registrert ned til siidanivå, noe som gir et høyere slakteuttak i disse distriktene enn hva som framgår i summen til siidaene.

Tabell 12. Gjennomsnittlige slaktevekt for okserein 1-2 år (varit) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)										
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	35,0	33,1	32,5	32,6	32,2
5A - Pasvik	32,0	33,7	32,7	30,5	30,6	33,3	32,2	35,4	31,5	30,6
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	25,6	26,6	26,1	27,1	24,8	25,6	25,6	27,6	– ¹	25,9
6 - Várjjatnjárga	26,3	– ¹	31,0	29,4	29,1	27,0	27,1	29,9	30,5	27,2
7 - Rákkonjárga	28,5	33,5	30,1	32,4	31,0	30,7	31,2	28,6	– ¹	31,6
9 - Čorgaš	32,2	32,3	31,3	27,7	30,0	29,7	28,8	27,6	– ¹	27,0
Polmak/Varanger	27,4	30,5	30,5	28,7	28,4	28,0	28,6	29,7	31,0	29,7
13 - Lágesduottar	27,5	29,8	27,2	27,5	27,2	27,5	25,8	26,9	26,6	27,2
14 - Spierttanjárga	26,6	32,0	29,6	30,0	28,1	29,0	28,5	– ¹	29,7	28,1
14A - Spierttagáísá	27,4	29,7	28,6	28,6	25,6	29,3	27,6	30,9	29,5	27,9
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	27,2	29,8	28,5	29,7	25,1	– ¹	27,4	– ¹	28,7	27,9
Munkavári siida	27,7	29,3	– ¹	26,7	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	27,5
Karasjok østre sone	27,4	29,9	28,1	28,2	27,0	28,2	26,9	27,2	27,5	27,5
16 - Kárašjoga oarjabealli	24,7	26,0	26,1	26,0	24,0	26,3	24,2	26,9	24,8	25,6
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	26,9	28,3	– ¹	25,8	25,1	– ¹	25,0	28,2	27,4	27,9
Skuohtanjárgga siida	24,6	26,2	– ¹	27,2	26,7	26,5	24,8	25,5	– ¹	23,9
Skáiddeduottar siida	24,9	25,8	26,7	27,8	25,7	26,9	– ¹	– ¹	24,5	– ¹
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	23,5	25,7	27,0	24,2	22,2	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Jáhkenjárgga siida	– ¹	25,6	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Rávdol siida	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Láhtin siida	20,1	23,0	23,0	24,1	22,7	23,6	– ¹	25,3	24,2	24,5
Njeaiddán siida	26,9	29,0	26,7	26,7	25,7	27,3	25,1	29,3	27,4	26,0
Vuorje siida	23,9	23,9	23,7	23,4	20,9	25,1	22,8	25,2	23,3	25,0
Karasjok vestre sone	24,7	26,0	26,1	26,0	24,0	26,3	24,4	26,9	24,8	25,6
ØST-FINNMARK	26,7	28,5	28,2	27,2	26,7	27,7	27,4	28,4	27,5	27,8

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 13. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år (aldu/rotnu) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)										
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	– ¹	35,2	– ¹	39,4	– ¹	– ¹	38,4	36,2	35,7	33,7
5A - Pasvik	33,4	36,9	38,0	37,7	32,3	38,7	37,0	39,5	36,7	38,3
4/5B - Sállan/Cizašnjárga	28,2	29,5	29,3	29,2	26,9	29,0	27,8	31,4	28,1	27,9
6 - Várjjatnjárga	30,1	30,3	31,5	27,9	28,9	30,8	28,6	32,9	30,3	31,9
7 - Rákkonjárga	36,4	35,8	37,3	34,9	36,1	35,3	33,2	35,9	34,3	34,7
9 - Čorgaš	30,2	31,6	32,1	28,5	29,5	31,1	28,8	32,4	29,5	30,4
Polmak/Varanger	31,6	32,2	33,6	30,9	30,8	32,1	29,9	34,3	32,1	32,6
13 - Lágesduottar	29,3	29,8	29,9	28,7	28,2	31,2	27,1	29,8	28,2	30,6
14 - Spierttanjárga	– ¹	31,6	– ¹	31,2	30,2	32,0	30,0	34,7	32,7	33,2
14A - Spierttagáisá	30,6	31,8	31,7	31,2	28,3	30,8	29,0	32,2	28,7	31,4
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	30,9	31,7	32,0	31,1	28,3	30,9	29,3	32,0	29,1	31,8
Munkavári siida	30,1	31,9	29,8	31,2	28,3	– ¹	28,5	32,9	28,1	30,7
Karasjok østre sone	29,8	30,9	31,3	29,8	28,4	31,2	27,7	30,0	29,2	31,0
16 - Kárašjoga oarjabealli	26,4	27,5	27,1	27,6	25,8	28,8	26,4	29,2	26,3	28,4
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	28,1	26,9	28,1	28,0	25,8	29,0	25	29,8	26,7	30,3
Skuohtanjárgga siida	25,4	27,8	26,6	28,2	25,9	28,7	25,9	29,2	25,8	28,9
Skáiddeduottar siida	27,9	29,3	29,2	29,6	27,4	30,6	26,7	27,1	26,0	27,0
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	26,1	27,5	27,8	28,4	26,4	29,2	27,7	28,5	26,2	30,0
Jáhkenjárgga siida	26,6	25,9	25,7	26,5	24,0	27,7	– ¹	27,9	25,4	27,8
Rávdol siida	– ¹	32,5	– ¹	30,6	27,5	– ¹	32,9	31,3	29,3	30,2
Láhtin siida	24,6	25,3	24,1	25,0	26,2	25,4	24,7	26,7	25,0	26,8
Njeaiddán siida	– ¹	28,5	25,6	27,4	25,5	29,1	25,3	31,6	26,9	29,5
Vuorje siida	24,7	26,3	25,4	25,1	23,0	27,9	24,6	29,8	26,9	26,8
Karasjok vestre sone	26,4	27,5	27,1	27,6	25,8	28,8	26,4	29,2	26,3	28,4
ØST-FINNMARK	29,4	30,4	30,4	29,4	28,5	30,9	28,4	32,3	31,3	31,6

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 14. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv (miessi) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	24,5	24,8	22,3	23,0	24,0	23,3	23,4	22,1	22,7	20,7
5A - Pasvik	22,1	22,5	20,8	23,1	22,4	21,7	23,8	23,6	22,1	21,6
4/5B - Sállan/Cizasnjárga	18,6	18,3	17,0	18,4	17,4	17,3	18,0	18,6	17,7	17,0
6 - Várjjatnjárga	19,4	19,9	18,1	18,4	19,3	17,4	17,6	18,9	19,5	19,0
7 - Rákkonjárga	23,3	23,7	20,2	21,7	22,3	21,4	22,0	21,0	21,4	20,1
9 - Čorgaš	20,7	21,4	19,6	18,3	18,7	18,4	18,1	17,8	18,3	17,6
Polmak/Varanger	20,6	21,0	19,5	19,6	20,1	19,2	19,7	20,1	20,0	19,2
13 - Lágesduottar	19,3	19,2	17,3	18,0	18,9	17,8	16,9	17,3	17,3	17,3
14 - Spierttanjárga	20,0	22,8	20,2	20,8	20,3	20,6	20,0	21,2	21,2	19,2
14A - Spierttagáisá	19,9	20,1	17,9	19,6	18,8	18,4	19,4	21,3	19,5	18,9
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	19,8	19,8	17,8	19,6	18,7	18,7	19,5	21,6	19,5	19,1
Munkavári siida	20,1	20,6	18,1	19,6	18,9	17,9	19,2	20,9	20,6	18,6
Karasjok østre sone	19,5	19,8	17,9	18,7	18,9	18,3	18,4	19,0	18,7	18,2
16 - Kárášjoga oarjabealli	17,5	17,9	16,7	17,0	17,1	18,4	18,1	19,1	17,2	17,1
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	18,5	18,7	17,6	16,8	16,5	17,8	17,9	18,2	17,2	17,2
Skuohtanjárgga siida	16,2	17,5	16,9	17,1	17,5	19,4	17,9	19,6	16,9	16,6
Skáiddeduottar siida	18,4	17,8	17,1	18,1	18,7	18,7	18,9	19,7	17,1	16,7
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	17,6	17,5	17,2	16,4	16,4	18,5	18,3	18,4	17,4	18,6
Jáhkenjárgga siida	18,8	16,9	16,5	15,2	15,3	16,1	17,7	18,5	17,4	17,5
Rávdol siida	19,5	20,6	17,0	17,3	17,8	20,4	20,9	20,8	19,0	19,4
Láhtin siida	15,2	16,4	14,6	15,1	15,3	15,7	17,1	17,6	17,0	16,6
Njeaiddán siida	19,6	19,1	17,3	16,9	17,4	18,0	17,8	19,4	18,5	17,9
Vuorje siida	14,8	15,9	14,4	15,3	14,8	15,4	15,4	18,6	16,3	15,3
Karasjok vestre sone	17,5	17,9	16,7	17,0	17,1	18,4	18,1	19,1	17,2	17,1
ØST-FINNMARK	19,5	19,9	18,0	18,6	19,0	18,8	18,9	19,6	18,8	18,4

Landbruksdirektoratet 2025

Vedlegg 3 - Næringsoversikt Vest-Finnmark

Tabell 1. Antall siidaandeler med rein og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2024/25 (per 31. mars 2025). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER	SIIDAER	
			i siidaandelene	Sommer Vinter
19 - Sállan	10	74	3	4 ^{1a, 1b}
20 - Fálá	6	20	1	1
21 - Gearretnjárga	8	37	1	1
22 - Fiettar	14	104	1	3
23 - Seainnus/Návvgastat	15	105	4	4
Valgenjárgga siida	3	28	1	1
Girenjárgga siida	6	33	1	1
Jalgon siida	5	35	1	1
Ealenjárgga siida	1	9	1	1
24A - Oarje-Sievju	6	42	2	1
24B - Nuorta-Sievju	3	17	2	2
Kautokeino østre sone	62	399	14	14^{2a}
25 - Stierdná	6	43	2	2
41 - Beaskádas	5	50	1	2 ^{1b, 1c}
26 - Lákkonjárga	16	142	1	3 ^{1a}
27 - Joahkonjárga	13	106	1	4 ^{1d, 1e}
28 - Cuokcavuotna	3	26	1	2 ^{1e}
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	3	18	2	2
32 - Silvvetnjárga	6	66	2	2
33 - Spalca	17	117	1	4 ^{1d}
40 - Orda	13	113	1	2 ^{1e}
11T - Ráidná	2	13	1	1 ^{1f}
33T - Ittunjárga	3	21	1	1
19/32T - Ivgoláhku	6	23	2	2 ^{1f}
Kautokeino midtre sone	93	738	16	23^{2b}
34 - Ábborašša	12	89	1	5
35 - Fávrrsorda	16	78	1	2
36 - Cohkolat	13	54	1	4
37 - Skárfvággi	3	15	1	1
39 - Árdni/Gávvir	8	37	1	2
42 - Beahcegealli	6	30	1	1
Kautokeino vestre sone	58	303	6	15
VEST-FINNMARK	213	1 440	36	52

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Felles vintersiida mellom a. D19-Sállan og D26-Lákkonjárga, b. D19-Sállan og D41-Beaskádas c. D40-Orda og D41-Beaskádas d. D27-Joahkonjárga og D33-Spalca e. D27-Joahkonjárga og D28-Cuokcavuotna f. D19/32T-Ivgoláhku og D11T-Ráidná.
- 2 Sumtallet for sonene er korrigert ned med henholdsvis a. 2 siidaer og b. 4 siidaer på grunn av felles vintersiidaer mellom siidaandeler fra ulike sommerbeitedistrikter.

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
19 - Sállan	3 644	4 491	4 696	4 853	4 741	4 541	4 566	4 408	3 875	3 856
20 - Fálá	2 626	2 581	2 486	2 418	1 991	2 017	2 029	2 019	2 022	2 008
21 - Gearretnjárga	2 184	2 280	2 246	2 262	2 239	2 340	2 382	2 282	2 271	2 369
22 - Fiettar	5 695	5 745	5 182	5 793	5 870	5 297	5 366	5 693	5 137	4 963
23 - Seainnus/Návvggastat	6 735	6 409	6 533	6 480	6 564	6 494	6 537	6 568	6 516	6 205
Valgenjárgga siida	1 298	1 298	1 298	1 297	1 298	1 298	1 309	1 298	1 297	1 299
Girenjárgga siida	2 537	2 440	2 582	2 558	2 592	2 591	2 604	2 600	2 594	2 596
Jalgon siida	2 500	2 271	2 253	2 226	2 274	2 294	2 300	2 300	2 300	2 300
Ealenjárgga siida ¹	400	400	400	399	400	311	324	370	325	10
24A - Oarje-Sievju	1 222	1 280	1 222	1 240	1 301	1 286	1 248	1 308	1 259	1 297
24B - Nuorta-Sievju	1 053	743	432	362	370	349	523	575	727	711
Kautokeino østre sone	23 159	23 529	22 797	23 408	23 076	22 324	22 651	22 853	21 807	21 409
25 - Stierdná	1 165	1 269	1 160	1 172	1 149	1 161	1 197	1 272	1 362	1 396
41 - Beaskádas	3 424	3 009	2 998	3 192	3 207	2 818	2 851	3 013	3 389	3 698
26 - Lákkonjárga	5 330	4 946	4 807	4 867	4 917	5 205	5 233	5 236	5 246	5 245
27 - Joahkonjárga	5 626	4 520	4 250	4 288	4 530	4 888	4 382	3 725	3 785	3 910
28 - Cuokcavuotna	689	746	774	883	902	881	914	900	1 076	1 078
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	1 196	1 196	1 196	828	807	1 222	1 060	1 098	1 096	1 097
32 - Silvvjetnjárga	2 087	2 100	2 095	2 100	2 120	2 102	2 102	2 103	2 117	2 111
33 - Spalca	4 790	5 279	5 044	5 229	5 150	5 156	5 832	5 692	5 237	5 004
40 - Orda	6 380	6 285	5 849	5 515	5 395	5 151	4 988	4 435	3 959	3 853
11T - Ráidná	410	458	487	530	543	544	578	584	589	599
33T - Ittunjárga	897	897	893	887	884	894	893	897	897	893
19/32T - Ivgoláhku	2 211	2 234	2 170	2 211	2 260	2 213	2 215	2 253	2 275	2 285
Kautokeino midtre sone	34 205	32 939	31 723	31 702	31 864	32 235	32 245	31 208	31 028	31 169
34 - Ábborašša	4 142	4 142	4 104	4 335	4 423	4 687	5 155	5 587	6 212	6 435
35 - Fávrosorda	6 213	6 323	6 240	6 400	6 383	5 758	5 759	5 773	5 810	5 808
36 - Cohkolat	7 201	6 142	6 932	6 768	6 910	6 747	6 352	6 130	6 211	6 682
37 - Skárfvággi	1 567	1 465	1 120	1 368	1 435	1 626	1 641	1 650	1 620	1 646
39 - Árdni/Gávvir	1 956	1 945	1 880	1 898	1 943	1 774	1 778	1 693	1 795	1 949
42 - Beahcegealli	2 466	2 591	2 687	2 697	2 695	2 695	2 687	2 700	2 691	2 660
Kautokeino vestre sone	23 545	22 608	22 963	23 466	23 789	23 287	23 372	23 533	24 339	25 180
VEST-FINNMARK	80 909	79 076	77 483	78 576	78 729	77 846	78 268	77 594	77 174	77 758

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det har vært en overdragelse av Ealenjárgga siida, og i den forbindelse er mange rein blitt slaktet. Dette gir et lavere reintall i 2024/2025 for denne siidaandelen enn i resten av tiårsperioden.

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2024/25 (ukorrigert reintall per 31. mars 2025).

REINBEITEDISTRIKT	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL pr. 31.03.25
	Okserein	Simlerein	Kalv	
19 - Sállan	7 %	78 %	15 %	3 856
20 - Fálá	9 %	77 %	15 %	2 008
21 - Gearretnjárga	6 %	77 %	17 %	2 369
22 - Fiettar	7 %	82 %	11 %	4 963
23 - Seainnus/Návvgastat	5 %	85 %	10 %	6 205
Valgenjárgga siida	2 %	95 %	3 %	1 299
Girenjárgga siida	6 %	82 %	12 %	2 596
Jalgon siida	6 %	82 %	12 %	2 300
Ealenjárgga siida ¹	80 %	0 %	20 %	10
24A - Oarje-Sievju	6 %	75 %	19 %	1 297
24B - Nuorta-Sievju	12 %	76 %	12 %	711
Kautokeino østre sone	7 %	80 %	13 %	21 409
25 - Stierdná	16 %	69 %	16 %	1 396
41 - Beaskádas	8 %	68 %	23 %	3 698
26 - Lákkonjárga	5 %	80 %	15 %	5 245
27 - Joahkonjárga	4 %	80 %	16 %	3 910
28 - Cuokcavuotna	4 %	81 %	14 %	1 078
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	7 %	81 %	12 %	1 097
32 - Silvvetnjárga	8 %	80 %	12 %	2 111
33 - Spalca	5 %	79 %	16 %	5 004
40 - Orda	6 %	82 %	13 %	3 853
11T - Ráidná	12 %	62 %	27 %	599
33T - Ittunjárga	3 %	83 %	14 %	893
19/32T - Ivgoláhkui	4 %	80 %	16 %	2 285
Kautokeino midtre sone	6 %	78 %	16 %	31 169
34 - Ábborašša	6 %	69 %	24 %	6 435
35 - Fávrrorsorda	6 %	83 %	11 %	5 808
36 - Cohkolat	8 %	73 %	20 %	6 682
37 - Skárfvággi	11 %	75 %	14 %	1 646
39 - Árdni/Gávvir	6 %	73 %	21 %	1 949
42 - Beahcegealli	8 %	80 %	12 %	2 660
Kautokeino vestre sone	7 %	75 %	18 %	25 180
VEST-FINNMARK	7 %	78 %	16 %	77 758

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Det har vært en overdragelse av Ealenjárgga siida, og i den forbindelse er mange rein blitt slaktet. Dette er årsaken til det lave reintallet i siidaen per 31.03.2025.

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2024/25. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved slutten av forrige driftsår (korrigert simletall per 31. mars 2024). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER i vårflokk	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
		Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
19 - Sállan	3107	2 549	1 818	1 336	82 %	59 %	43 %
20 - Fálá	1481	1 222	429	561	83 %	29 %	38 %
21 - Gearretnjárga	1822	1 549	769	685	85 %	42 %	38 %
22 - Fiettar	4049	3 514	2 553	1 696	87 %	63 %	42 %
23 - Seainnus/Návvgastat	5396	5 311	4 609	3 512	98 %	85 %	65 %
Valgenjárgga siida	1 233	1222	1 197	1 158	99 %	97 %	94 %
Girenjárgga siida	2093	2092	1 707	1 043	100 %	82 %	50 %
Jalgon siida	1 842	1 769	1 611	1 225	96 %	87 %	67 %
Ealenjárgga siida	228	228	94	86	100 %	41 %	38 %
24A - Oarje-Sievju	920	882	717	425	96 %	78 %	46 %
24B - Nuorta-Sievju	604	430	225	111	71 %	37 %	18 %
Kautokeino østre sone	17 379	15 457	11 120	8 326	89 %	64 %	48 %
25 - Stierdná	915	893	426	340	98 %	47 %	37 %
41 - Beaskádas	2 422	2 018	1 645	1 212	83 %	68 %	50 %
26 - Lákkonjárga	4 215	3 834	3 165	2 051	91 %	75 %	49 %
27 - Joahkonjárga	3 297	2 675	2 122	1 345	81 %	64 %	41 %
28 - Cuokcavuotna	804	736	608	319	92 %	76 %	40 %
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	865	842	518	314	97 %	60 %	36 %
32 - Silvvetnjárga	1 626	1 512	1 230	701	93 %	76 %	43 %
33 - Spalca	4 340	4 041	3 289	2 248	93 %	76 %	52 %
40 - Orda	3 271	2 872	1 994	1 492	88 %	61 %	46 %
11T - Ráidná	371	375	260	167	101 %	70 %	45 %
33T - Ittunjárga	754	698	412	325	93 %	55 %	43 %
19/32T - Ivgoláhku	1 826	1 777	1 418	769	97 %	78 %	42 %
Kautokeino midtre sone	24 706	22 273	17 087	11 283	90 %	69 %	46 %
34 - Ábborašša	4 426	3 661	3 207	1 832	83 %	72 %	41 %
35 - Fávrrsorda	4 827	4 369	3 226	2 069	91 %	67 %	43 %
36 - Cohkolat	4 788	3 659	2 498	1 493	76 %	52 %	31 %
37 - Skárfvággi	1 121	986	809	446	88 %	72 %	40 %
39 - Árdni/Gávvir	1 410	1 340	1 050	502	95 %	74 %	36 %
42 - Beahcegealli	2 068	1 908	1 557	1 307	92 %	75 %	63 %
Kautokeino vestre sone	18 640	15 923	12 347	7 649	85 %	66 %	41 %
VEST-FINNMARK	60 725	53 653	40 554	27 258	88 %	67 %	45 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2024/25. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2024, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2024.

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt	TAP	Kalv	Voksne	Totalt
19 - Sállan	731	482	1 213	78	253	331	1 544	48 %	9 %	24 %
20 - Fálá	1	1	661	52	90	142	803	54 %	7 %	25 %
21 - Gearretnjárga	780	84	864	40	87	127	991	56 %	6 %	26 %
22 - Fiettar	961	857	1 818	144	287	431	2 249	52 %	8 %	26 %
23 - Seainnus/Návvgastat	702	1 097	1 799	94	382	476	2 275	34 %	7 %	19 %
Valgenjárgga siida	25	39	64	13	53	66	130	5 %	5 %	5 %
Girenjárgga siida	385	664	1 049	39	162	201	1 250	50 %	8 %	27 %
Jalgon siida	158	386	544	16	102	118	662	31 %	5 %	16 %
Ealenjárgga siida	134	8	142	26	65	91	233	62 %	28 %	42 %
24A - Oarje-Sievju	165	292	457	24	67	91	548	52 %	7 %	26 %
24B - Nuorta-Sievju	205	114	319	47	144	191	510	74 %	26 %	44 %
Kautokeino østre sone ²	3 544	2 926	7 131	479	1 310	1 789	8 920	46 %	8 %	24 %
25 - Stierdná	467	86	553	40	85	125	678	62 %	9 %	30 %
41 - Beaskádas	373	433	806	95	301	396	1 202	40 %	12 %	22 %
26 - Lákkonjárga	669	1 114	1 783	57	266	323	2 106	47 %	6 %	23 %
27 - Joahkonjárga	553	777	1 330	79	310	389	1 719	50 %	10 %	27 %
28 - Cuokcavuotna	128	289	417	12	82	94	511	57 %	9 %	28 %
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	324	204	528	21	57	78	606	63 %	7 %	31 %
32 - Silvvetnjárga	282	529	811	41	123	164	975	54 %	8 %	27 %
33 - Spalca	752	1 041	1 793	56	289	345	2 138	44 %	7 %	23 %
40 - Orda	878	502	1 380	31	277	308	1 688	48 %	8 %	25 %
11T - Ráidná	115	93	208	23	33	56	264	55 %	10 %	27 %
33T - Ittunjárga	286	87	373	3	104	107	480	53 %	12 %	30 %
19/32T - Ivgoláhkku	359	649	1 008	24	252	276	1 284	57 %	12 %	32 %
Kautokeino midtre sone	5 186	5 804	10 990	482	2 179	2 661	13 651	49 %	9 %	26 %
34 - Ábborašša	454	1 375	1 829	92	651	743	2 572	50 %	12 %	26 %
35 - Fávrosorda	1 143	1 157	2 300	81	231	312	2 612	53 %	5 %	26 %
36 - Cohkolat	1 161	1 005	2 166	101	494	595	2 761	59 %	10 %	28 %
37 - Skárfvággi	177	363	540	16	99	115	655	55 %	7 %	25 %
39 - Árdni/Gávvir	290	548	838	24	134	158	996	63 %	9 %	32 %
42 - Beahcegealli	470	82	552	18	256	274	826	34 %	14 %	23 %
Kautokeino vestre sone	3 576	4 698	8 274	347	1 688	2 035	10 309	52 %	8 %	26 %
VEST-FINNMARK ²	12 306	13 428	26 395	1 308	5 177	6 485	32 880	49 %	8 %	25 %

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Ikke oppgitt grunnet mangel på datagrunnlag. Tidspunkt for merking i de enkelte siidaandelene kan påvirke datagrunnlaget.
- 2 Tall for kalvetap før og etter merking i Fálá er ikke tatt med i totalberegningene for verken Kautokeino østre sone eller Vest-Finnmark, grunnet mangel på datagrunnlag.

Tabell 6. Tap av kalver og voksne dyr for driftsåret 2024/25, fordelt på tapsårsak (fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR		
	<i>Fredet rovvilt</i>	<i>Annen kjent</i>	<i>Annen ukjent</i>	<i>Fredet rovvilt</i>	<i>Annen kjent</i>	<i>Annen ukjent</i>
19 - Sállan	87 %	3 %	10 %	51 %	11 %	38 %
20 - Fálá	75 %	3 %	22 %	39 %	20 %	40 %
21 - Gearretnjárga	88 %	0 %	12 %	83 %	1 %	17 %
22 - Fiettar	91 %	1 %	9 %	58 %	6 %	36 %
23 - Seainnus/Návvgastat	93 %	3 %	5 %	83 %	9 %	8 %
Valgenjárgga siida	84 %	13 %	3 %	94 %	6 %	0 %
Girenjárgga siida	97 %	3 %	0 %	84 %	14 %	2 %
Jalgon siida	89 %	2 %	9 %	64 %	8 %	28 %
Ealenjárgga siida	77 %	0 %	23 %	98 %	0 %	2 %
24A - Oarje-Sievju	92 %	4 %	4 %	59 %	30 %	11 %
24B - Nuorta-Sievju	86 %	7 %	7 %	64 %	8 %	28 %
Kautokeino østre sone	89 %	2 %	9 %	64 %	10 %	26 %
25 - Stierdná	98 %	1 %	1 %	86 %	9 %	6 %
41 - Beaskádas	89 %	4 %	7 %	69 %	19 %	12 %
26 - Lákkonjárga	96 %	1 %	3 %	92 %	4 %	4 %
27 - Joahkonjárga	88 %	4 %	8 %	75 %	13 %	12 %
28 - Cuokcavuotna	87 %	4 %	9 %	64 %	6 %	30 %
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	95 %	3 %	1 %	78 %	17 %	5 %
32 - Silvvetnjárga	95 %	4 %	1 %	89 %	7 %	4 %
33 - Spalca	96 %	1 %	3 %	89 %	4 %	7 %
40 - Orda	64 %	21 %	15 %	94 %	1 %	5 %
11T - Ráidná	92 %	4 %	3 %	82 %	18 %	0 %
33T - Ittunjárga	98 %	1 %	2 %	96 %	3 %	1 %
19/32T - Ivgoláhku	96 %	1 %	3 %	93 %	6 %	1 %
Kautokeino midtre sone	90 %	5 %	5 %	84 %	9 %	7 %
34 - Ábborašša	92 %	6 %	2 %	52 %	43 %	5 %
35 - Fávrrsorda	98 %	1 %	1 %	92 %	6 %	2 %
36 - Cohkolat	86 %	2 %	12 %	84 %	3 %	14 %
37 - Skárfvággi	88 %	0 %	12 %	95 %	0 %	5 %
39 - Árdni/Gávvir	96 %	2 %	2 %	92 %	3 %	4 %
42 - Beahcegealli	97 %	2 %	1 %	90 %	3 %	7 %
Kautokeino vestre sone	93 %	3 %	5 %	75 %	18 %	7 %
VEST-FINNMARK	91 %	3 %	6 %	76 %	12 %	12 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 7. Tap av kalver og voksne dyr til rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på rovvilt (ulv, bjørn, kongeørn, jerv og gaupe).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe
19 - Sállan	0 %	0 %	73 %	14 %	13 %	0 %	0 %	14 %	50 %	36 %
20 - Fálá	0 %	0 %	91 %	4 %	6 %	0 %	0 %	38 %	23 %	39 %
21 - Gearretnjárga	0 %	0 %	78 %	15 %	8 %	0 %	0 %	21 %	51 %	28 %
22 - Fiettar	0 %	0 %	78 %	12 %	9 %	0 %	2 %	20 %	50 %	28 %
23 - Seainnus/Návvgastat	0 %	6 %	61 %	14 %	19 %	1 %	6 %	15 %	35 %	43 %
Valgenjárgga siida	0 %	0 %	43 %	20 %	37 %	0 %	0 %	16 %	48 %	35 %
Girenjárgga siida	0 %	9 %	67 %	13 %	11 %	1 %	14 %	7 %	42 %	36 %
Jalgon siida	0 %	0 %	55 %	17 %	28 %	0 %	0 %	25 %	37 %	38 %
Ealenjárgga siida	0 %	0 %	50 %	5 %	45 %	0 %	0 %	24 %	9 %	67 %
24A - Oarje-Sievju	0 %	0 %	60 %	18 %	22 %	0 %	0 %	13 %	41 %	46 %
24B - Nuorta-Sievju	0 %	0 %	93 %	7 %	0 %	0 %	0 %	79 %	21 %	0 %
Kautokeino østre sone	0 %	2 %	73 %	13 %	12 %	0 %	2 %	24 %	40 %	33 %
25 - Stierdná	0 %	0 %	85 %	8 %	8 %	0 %	0 %	22 %	39 %	38 %
41 - Beaskádas	0 %	0 %	47 %	26 %	27 %	0 %	0 %	12 %	39 %	49 %
26 - Lákkonjárga	0 %	1 %	48 %	25 %	26 %	0 %	0 %	6 %	49 %	45 %
27 - Joahkonjárga	0 %	0 %	66 %	17 %	17 %	0 %	0 %	21 %	40 %	39 %
28 - Cuokcavuotna	0 %	0 %	51 %	23 %	27 %	0 %	0 %	13 %	43 %	43 %
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	0 %	0 %	63 %	15 %	22 %	2 %	0 %	7 %	49 %	43 %
32 - Silvvjetnjárga	0 %	0 %	55 %	24 %	21 %	0 %	0 %	12 %	55 %	33 %
33 - Spalca	0 %	0 %	49 %	26 %	26 %	0 %	0 %	9 %	46 %	44 %
40 - Orda	0 %	0 %	60 %	20 %	20 %	0 %	0 %	4 %	50 %	46 %
11T - Ráidná	0 %	0 %	88 %	5 %	7 %	0 %	0 %	74 %	9 %	17 %
33T - Ittunjárga	0 %	0 %	67 %	0 %	33 %	0 %	0 %	12 %	0 %	88 %
19/32T - Ivgoláhkku	0 %	0 %	59 %	13 %	28 %	0 %	0 %	10 %	24 %	66 %
Kautokeino midtre sone	0 %	0 %	57 %	20 %	23 %	0 %	0 %	12 %	40 %	47 %
34 - Ábborašša	0 %	0 %	55 %	24 %	21 %	1 %	1 %	13 %	47 %	38 %
35 - Fávrrsorda	0 %	0 %	47 %	20 %	33 %	1 %	0 %	7 %	45 %	47 %
36 - Cohkolat	0 %	1 %	62 %	19 %	19 %	0 %	1 %	5 %	50 %	44 %
37 - Skárfvággi	0 %	0 %	54 %	25 %	21 %	0 %	0 %	0 %	74 %	26 %
39 - Árdni/Gávvir	0 %	0 %	57 %	14 %	29 %	0 %	0 %	8 %	45 %	47 %
42 - Beahcegealli	0 %	0 %	75 %	12 %	14 %	0 %	0 %	9 %	53 %	38 %
Kautokeino vestre sone	0 %	0 %	56 %	19 %	24 %	1 %	1 %	7 %	50 %	42 %
VEST-FINNMARK	0 %	1 %	61 %	18 %	21 %	0 %	1 %	14 %	43 %	42 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 8. Tap av kalver og voksne dyr til andre årsaker enn rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på årsak (trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEOMRÅDE	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent
19 - Sállan	1 %	6 %	12 %	6 %	75 %	2 %	2 %	7 %	11 %	78 %
20 - Fálá	5 %	7 %	0 %	0 %	88 %	20 %	14 %	0 %	0 %	66 %
21 - Gearretnjárga	1 %	0 %	0 %	0 %	99 %	5 %	0 %	0 %	0 %	95 %
22 - Fiettar	1 %	4 %	1 %	1 %	93 %	9 %	3 %	2 %	1 %	85 %
23 - Seainnus/Návvgastat	2 %	6 %	21 %	7 %	64 %	23 %	4 %	15 %	10 %	49 %
Valgenjárgga siida	10 %	20 %	20 %	30 %	20 %	50 %	0 %	25 %	25 %	0 %
Girenjárgga siida	7 %	11 %	71 %	7 %	4 %	50 %	0 %	28 %	9 %	13 %
Jalgon siida	0 %	5 %	8 %	7 %	80 %	0 %	7 %	5 %	10 %	79 %
Ealenjárgga siida	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
24A - Oarje-Sievju	24 %	0 %	0 %	22 %	54 %	43 %	0 %	3 %	27 %	27 %
24B - Nuorta-Sievju	0 %	28 %	22 %	0 %	50 %	0 %	22 %	0 %	0 %	78 %
Kautokeino østre sone	3 %	6 %	7 %	3 %	80 %	11 %	6 %	4 %	6 %	72 %
25 - Stierdná	11 %	0 %	0 %	56 %	33 %	33 %	0 %	0 %	28 %	39 %
41 - Beaskádas	14 %	14 %	0 %	6 %	67 %	11 %	15 %	0 %	36 %	39 %
26 - Lákkonjárga	0 %	9 %	4 %	1 %	86 %	40 %	0 %	0 %	8 %	52 %
27 - Joahkonjárga	3 %	5 %	3 %	26 %	63 %	11 %	0 %	0 %	42 %	46 %
28 - Cuokcavuotna	0 %	9 %	6 %	15 %	70 %	3 %	6 %	0 %	9 %	82 %
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	13 %	21 %	17 %	25 %	25 %	12 %	41 %	12 %	12 %	24 %
32 - Silvvjetnjárga	15 %	23 %	13 %	36 %	13 %	56 %	11 %	0 %	0 %	33 %
33 - Spalca	1 %	9 %	8 %	11 %	71 %	8 %	11 %	0 %	16 %	66 %
40 - Orda	0 %	52 %	1 %	4 %	43 %	0 %	10 %	0 %	10 %	80 %
11T - Ráidná	0 %	6 %	19 %	31 %	44 %	0 %	10 %	30 %	60 %	0 %
33T - Ittunjárga	25 %	0 %	0 %	0 %	75 %	75 %	0 %	0 %	0 %	25 %
19/32T - Ivgoláhkku	0 %	3 %	5 %	14 %	78 %	44 %	0 %	28 %	17 %	11 %
Kautokeino midtre sone	3 %	29 %	3 %	11 %	54 %	16 %	9 %	2 %	27 %	46 %
34 - Ábborašša	3 %	59 %	14 %	2 %	22 %	3 %	75 %	11 %	1 %	10 %
35 - Fávrosorda	9 %	6 %	42 %	4 %	40 %	76 %	0 %	0 %	0 %	24 %
36 - Cohkolat	0 %	1 %	5 %	9 %	84 %	0 %	2 %	5 %	8 %	85 %
37 - Skárfvággi	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
39 - Árdni/Gávvir	0 %	0 %	0 %	43 %	57 %	8 %	0 %	0 %	33 %	58 %
42 - Beahcegealli	0 %	32 %	0 %	32 %	37 %	0 %	0 %	0 %	27 %	73 %
Kautokeino vestre sone	1 %	16 %	10 %	9 %	64 %	6 %	53 %	9 %	3 %	29 %
VEST-FINNMARK	3 %	18 %	6 %	8 %	65 %	11 %	22 %	5 %	11 %	51 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 9. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvis slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2024/25. Prosentvis slakteuttak og slakteproduksjon per livrein er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Med totalproduksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsending omregnet til kg per rein i vårflokk (nærmere beskrevet i generelle kommentarer til næringsoversikten).

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT SLUTTAK (antall dyr)	TOTALT SL.KVANTUM (antall kg)	SLAKTE- PROSENT (% av vårflokk)	SLPRODUKSJON pr.livrein (kg/dyr)	TOTALPRODUKSJON pr. livrein (kg/dyr)	
	24/25	24/25	24/25	24/25	23/24	24/25 ¹
19 - Sállan	1 118	27 431	29 %	7,1	2,1	6,5
20 - Fálá	433	10 471	21 %	5,2	7,3	5,1
21 - Gearnetnjárga	460	11 287	20 %	5,0	4,4	5,4
22 - Fiettar	1 852	38 478	36 %	7,5	5,8	6,9
23 - Seainnus/Návvgastat	3 382	74 697	52 %	11,5	8,6	10,2
Valgenjárgga siida	1 125	22 884	87 %	17,6	15,3	17,9
Girenjárgga siida	840	16 753	32 %	6,5	6,1	6,6
Jalgon siida	1 107	25 327	48 %	11,0	9,0	11,5
Ealenjárgga siida ²	310	9 734	95 %	29,9	-0,8	0,1
24A - Oarje-Sievju	304	8304	24 %	6,6	5,1	7,4
24B - Nuorta-Sievju	76	2 596	10 %	3,6	10,5	3,0
Kautokeino østre sone	7 625	173 266	35 %	7,9	6,0	7,4
25 - Stierdná	182	4 832	13 %	3,5	5,7	4,3
41 - Beaskádas	497	11 516	15 %	3,4	6,5	5,6
26 - Lákkonjárga	1 562	32 035	30 %	6,1	6,6	5,8
27 - Joahkonjárga	951	19 394	25 %	5,1	7,2	5,5
28 - Cuokcavuotna	223	5 161	21 %	4,8	9,0	5,7
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	236	4 978	22 %	4,5	6,2	4,9
32 - Silvvetnjárga	543	11 107	26 %	5,2	5,6	5,7
33 - Spalca	2 136	44 459	41 %	8,5	7,1	6,8
40 - Orda	1 290	26 815	33 %	6,8	6,5	6,0
11T - Ráidná	101	3 129	17 %	5,3	7,1	5,6
33T - Ittunjárga	222	5 293	25 %	5,9	4,3	5,8
19/32T - Ivgoláhkku	483	10 799	21 %	4,7	5,1	4,8
Kautokeino midtre sone	8 426	179 518	27 %	5,8	6,5	5,8
34 - Ábborašša	867	21 872	14 %	3,5	8,2	4,4
35 - Fávrosorda	1 759	38 126	30 %	6,6	6,5	6,6
36 - Cohkolat	427	10 844	7 %	1,7	3,4	3,5
37 - Skárfvággi	409	8 805	25 %	5,4	6,0	6,7
39 - Árdni/Gávvir	169	4 481	9 %	2,5	2,9	4,1
42 - Beahcegealli	1 226	25 886	46 %	9,6	7,9	9,5
Kautokeino vestre sone	4 857	110 014	20 %	4,5	6,0	5,4
VEST-FINNMARK	20 908	462 798	27 %	6,0	6,2	6,1

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Siste års tall på totalproduksjon per livrein er foreløpig og beregnet på grunnlag av ukorrigerte reintall.
- 2 Det har vært en overdragelse av Ealenjárgga siida, og i den forbindelse er mange rein blitt slaktet. Dette er årsaken til det høye slakteuttaket og slakteproduksjonen for siidaen, samt den lave totalproduksjonen (totalproduksjon tar hensyn til nedgangen i reintall ved beregningen).

Tabell 10. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2024/25. Prosentfordelingen på dyrekategori og slaktetidspunkt er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift. Totalt antall slaktedyr tilsvarer her kun slakt fra registrerte slakterier.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt Antall slaktedyr
	Okse- rein	Simle- rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	
19 - Sállan	2 %	12 %	86 %	79 %	21 %	100 %	0 %	0 %	878
20 - Fálá	16 %	17 %	67 %	86 %	14 %	85 %	15 %	0 %	373
21 - Gearretnjárga	1 %	9 %	90 %	69 %	31 %	97 %	3 %	0 %	316
22 - Fiettar	1 %	10 %	89 %	90 %	10 %	92 %	8 %	0 %	1 676
23 - Seainnus/Návvgastat	2 %	10 %	88 %	96 %	4 %	22 %	78 %	0 %	3 253
Valgenjárgga siida	0 %	0 %	100 %	99 %	1 %	0 %	100 %	0 %	1 111
Girenjárgga siida	2 %	6 %	92 %	93 %	7 %	62 %	38 %	0 %	779
Jalgon siida	3 %	9 %	88 %	97 %	3 %	0 %	100 %	0 %	1 076
Ealenjárgga siida	8 %	65 %	27 %	93 %	7 %	79 %	21 %	0 %	287
24A - Oarje-Sievju	17 %	8 %	75 %	75 %	25 %	94 %	6 %	0 %	228
24B - Nuorta-Sievju	-	-	-	0 %	100 %	-	-	-	0
Kautokeino østre sone	3 %	11 %	86 %	88 %	12 %	59 %	41 %	0 %	6 724
25 - Stierdná	13 %	2 %	85 %	72 %	28 %	100 %	0 %	0 %	131
41 - Beaskádas	2 %	9 %	89 %	70 %	30 %	100 %	0 %	0 %	346
26 - Lákkonjárga	4 %	9 %	87 %	88 %	12 %	100 %	0 %	0 %	1 370
27 - Joahkonjárga	1 %	12 %	87 %	75 %	25 %	1 %	99 %	0 %	715
28 - Cuokcavuotna	4 %	2 %	94 %	74 %	26 %	93 %	7 %	0 %	164
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	0 %	1 %	99 %	72 %	28 %	51 %	49 %	0 %	171
32 - Silvvetnjárga	0 %	1 %	98 %	73 %	27 %	1 %	99 %	0 %	394
33 - Spalca	5 %	24 %	72 %	90 %	10 %	98 %	2 %	1 %	1 925
40 - Orda	2 %	10 %	87 %	87 %	13 %	100 %	0 %	0 %	1 120
11T - Ráidná	55 %	38 %	8 %	79 %	21 %	100 %	0 %	0 %	80
33T - Ittunjárga	2 %	7 %	91 %	81 %	19 %	100 %	0 %	0 %	180
19/32T - Ivgoláhkku	7 %	4 %	89 %	88 %	12 %	99 %	1 %	0 %	426
Kautokeino midtre sone	4 %	13 %	83 %	83 %	17 %	82 %	18 %	0 %	7 022
34 - Ábborašša	44 %	23 %	33 %	75 %	25 %	39 %	10 %	51 %	648
35 - Fávrrósorda	6 %	10 %	83 %	91 %	9 %	0 %	26 %	74 %	1 602
36 - Cohkolat	35 %	10 %	56 %	78 %	22 %	0 %	7 %	93 %	331
37 - Skárfvággi	8 %	11 %	82 %	93 %	7 %	0 %	97 %	3 %	379
39 - Árdni/Gávvir	0 %	0 %	100 %	50 %	50 %	100 %	0 %	0 %	84
42 - Beahcegealli	2 %	16 %	82 %	96 %	4 %	0 %	100 %	0 %	1 182
Kautokeino vestre sone	13 %	14 %	73 %	87 %	13 %	8 %	49 %	43 %	4 226
VEST-FINNMARK	6 %	12 %	82 %	86 %	14 %	56 %	34 %	10 %	17 972

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2024/25. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktedyr (n) til grunn for beregningene på slaktevekter er gitt i parentes.

REINBEITEDISTRIKT										
	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
19 - Sállan	62,2	(13)	1	(4)	32,8	(102)	1	(1)	19,7	(758)
20 - Fálá	47,6	(54)	1	(5)	26,7	(64)	1	(1)	16,0	(249)
21 - Gearretnjárga	1	(1)	1	(2)	29,8	(25)	1	(3)	19,2	(285)
22 - Fiettar	1	(9)	1	(9)	27,8	(170)	1	(1)	18,2	(1487)
23 - Seainnus/Návvgastat	51,3	(51)	27,6	(25)	32,8	(312)	26,4	(16)	19,8	(2849)
Valgenjárgga siida	1	(0)	1	(0)	1	(1)	1	(0)	20,2	(1110)
Girenjárgga siida	1	(5)	24,2	(12)	26,8	(44)	1	(0)	18,0	(718)
Jalgon siida	52,8	(35)	1	(1)	29,7	(96)	1	(1)	20,7	(943)
Ealenjárgga siida	46,0	(11)	30,7	(12)	36,1	(171)	26,9	(15)	19,2	(78)
24A - Oarje-Sievju	53,7	(36)	1	(2)	30,3	(19)	1	(0)	18,4	(171)
24B - Nuorta-Sievju	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(0)
Kautokeino østre sone	51,5	(164)	26,8	(47)	30,8	(692)	25,3	(22)	19,1	(5799)
25 - Stierdná	59,0	(16)	1	(1)	1	(2)	1	(0)	20,4	(112)
41 - Beaskádas	1	(5)	1	(1)	28,3	(31)	1	(0)	19,1	(309)
26 - Lákkonjárga	48,8	(22)	26,9	(38)	28,1	(119)	1	(5)	17,6	(1186)
27 - Joahkonjárga	1	(1)	1	(6)	25,3	(83)	1	(6)	16,2	(619)
28 - Cuokcavuotna	1	(5)	1	(1)	1	(4)	1	(0)	19,6	(154)
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(1)	17,9	(170)
32 - Silvvetnjárga	1	(0)	1	(1)	1	(4)	1	(1)	16,9	(388)
33 - Spalca	44,5	(44)	23,8	(45)	27,2	(431)	22,5	(25)	16,6	(1380)
40 - Orda	50,9	(7)	26,4	(20)	28,1	(111)	1	(3)	18,1	(979)
11T - Ráidná	1	(3)	32,0	(41)	33,2	(21)	1	(9)	1	(6)
33T - Ittunjárga	1	(4)	1	(0)	29,5	(13)	1	(0)	21,1	(163)
19/32T - Ivgoláhkku	46,8	(7)	32,0	(24)	35,8	(11)	1	(5)	19,8	(379)
Kautokeino midtre sone	49,2	(114)	27,8	(178)	27,6	(830)	22,7	(55)	17,7	(5845)
34 - Ábborašša ²	36,7	(56)	25,6	(230)	28,0	(121)	22,3	(30)	14,9	(211)
35 - Fávrosorda	49,9	(83)	26,7	(15)	29,8	(165)	1	(2)	17,8	(1337)
36 - Cohkolat	36,9	(55)	27,6	(60)	29,1	(30)	1	(2)	17,9	(184)
37 - Skárfvággi	41,5	(12)	27,8	(18)	29,2	(36)	1	(4)	18,6	(309)
39 - Árdni/Gávvir	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(0)	22,3	(84)
42 - Beahcegealli	44,9	(16)	1	(6)	29,2	(189)	1	(1)	18,7	(970)
Kautokeino vestre sone	42,5	(222)	26,2	(329)	29,1	(541)	22,6	(39)	18,1	(3095)
VEST-FINNMARK	47,0	(500)	26,8	(554)	29,1	(2063)	23,2	(116)	18,3	(14739)

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.
 2 Omfatter også slakterein som har sommerbeite i D38-Ulisuolu.

Tabell 12. Gjennomsnittlige slaktevekt for okserein 1-2 år (varit) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
19 - Sállan	– ¹	28,0	– ¹	– ¹	26,1	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
20 - Fálá	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	25,7	– ¹	25,0	– ¹
21 - Gearretnjárga	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
22 - Fiettar	27,4	26,3	27,4	26,6	– ¹	29,0	– ¹	27,9	26,6	– ¹
23 - Seainnus/Návvgastat	25,7	25,3	27,2	23,6	22,7	28,0	28,8	24,9	– ¹	27,6
Valgenjárgga siida	– ¹	29,3	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Girenjárgga siida	– ¹	22,7	– ¹	23,2	22,2	– ¹	– ¹	24,9	– ¹	24,2
Jalgon siida	– ¹	26,1	– ¹	– ¹	22,4	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Ealenjárgga siida	– ¹	29,3	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	30,1	– ¹	– ¹	30,7
24A - Oarje-Sievju	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
24B - Nuorta-Sievju	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Kautokeino østre sone	26,6	25,8	27,2	23,9	23,7	27,9	27,2	25,6	26,2	26,8
25 - Stierdná	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
41 - Beaskádas	– ¹	24,6	23,8	24,2	20,9	24,5	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
26 - Lákkonjárga	20,9	23,0	22,9	22,9	22,4	23,5	24,6	24,5	24,3	26,9
27 - Joahkonjárga	21,6	22,6	19,9	23,7	22,0	23,9	19,8	24,5	– ¹	– ¹
28 - Cuokcavuotna	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	– ¹	26,6	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
32 - Silvvetnjárga	27,5	26,9	25,6	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
33 - Spalca	21,5	23,1	23,7	23,1	21,7	23,3	23,9	26,3	24,5	23,8
40 - Orda	20,2	24,0	– ¹	24,0	23,0	25,4	– ¹	26,9	22,4	26,4
11T - Ráidná	31,0	36,5	35,8	34,2	32,5	32,5	32,3	34,5	31,4	32,0
33T - Ittunjárga	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
19/32T - Ivgoláhkku	30,9	30,4	30,3	29,6	29,2	30,3	31,7	30,8	29,1	32,0
Kautokeino midtre sone	23,3	25,2	27,2	25,6	24,3	26,3	28,4	28,5	26,7	27,8
34 - Ábborašša ²	21,1	22,8	22,7	23,9	22,2	21,9	19,7	26,0	26,2	25,6
35 - Fávrosorda	– ¹	– ¹	– ¹	25,8	23,8	24,8	– ¹	25,5	– ¹	26,7
36 - Cohkolat	19,9	23,2	25,0	24,8	– ¹	24,5	24,0	– ¹	26,5	27,6
37 - Skárfvággi	23,5	28,2	– ¹	26,7	26,3	27,3	– ¹	29,4	29,0	27,8
39 - Árdni/Gávvir	28,4	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
42 - Beahcegealli	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Kautokeino vestre sone	22,0	23,7	23,6	25,4	24,4	24,1	21,2	26,0	26,5	26,2
VEST-FINNMARK	23,1	25,0	26,8	25,0	24,2	26,1	26,0	27,3	26,6	26,8

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.
- 2 Omfatter også slakterein som har sommerbeite i D38-Ulisuolu.

Tabell 13. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år (aldu/rotnu) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
19 - Sállan	32,1	32,1	33,2	30,6	31,4	32,5	31,8	32,7	30,0	32,8
20 - Fálá	25,2	26,1	27,8	27,0	26,0	26,9	25,9	26,3	25,8	26,7
21 - Gearretnjárga	26,0	– ¹	– ¹	28,5	28,3	29,5	26,8	27,9	27,3	29,8
22 - Fiettar	27,0	29,0	28,5	27,3	25,3	26,9	26,9	30,1	25,5	27,8
23 - Seainnus/Návvgastat	26,4	30,1	27,7	28,9	27,4	29,6	26,7	30,1	26,5	32,8
Valgenjárgga siida	30,7	– ¹	28,2	28,6	29,7	29,7	29,1	29,8	– ¹	– ¹
Girenjárgga siida	24,4	24,4	– ¹	28,9	24,9	25,4	25	27,3	24,8	26,8
Jalgon siida	25,8	30,2	27,2	28,8	27,8	27,2	25,7	31,5	27,5	29,7
Ealenjárgga siida	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	31,4	33,4	– ¹	– ¹	– ¹	36,1
24A - Oarje-Sievju	34,1	31,9	33,4	30,3	32,7	37,0	30,3	34,7	31,3	30,3
24B - Nuorta-Sievju	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Kautokeino østre sone	28,5	29,6	29,6	28,4	27,8	29,1	27,2	31,4	26,8	30,8
25 - Stierdná	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	28,9	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
41 - Beaskádas	24,1	28,0	29,6	29,5	25,1	28,8	27,1	29,9	28,9	28,3
26 - Lákkonjárga	23,8	25,3	24,0	26,0	24,7	28,7	25,5	30,0	26,2	28,1
27 - Joahkonjárga	24,0	26,0	22,5	24,4	25,0	26,8	25,1	28,4	24,5	25,3
28 - Cuokcavuotna	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	29,8	– ¹	– ¹	– ¹
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	29,3	29,4	29,4	29,4	30,8	28,7	33,2	– ¹	27,3	– ¹
32 - Silvvetnjárga	25,7	29,2	27,0	28,7	24,9	28,0	29,0	– ¹	27,2	– ¹
33 - Spalca	23,8	26,5	25,5	25,4	23,3	26,1	24,1	28,1	26,2	27,2
40 - Orda	23,1	29,2	26,4	27,8	25,2	29,4	25,2	30,5	27,9	28,1
11T - Ráidná	– ¹	– ¹	35,5	– ¹	33,6	33,2	34,9	34,7	33,6	33,2
33T - Ittunjárga	32,8	31,6	30,4	30,8	28,0	– ¹	– ¹	32,9	29,4	29,5
19/32T - Ivgoláhku	30,5	34,4	32,5	31,3	31,2	32,2	33,1	32,6	30,8	35,8
Kautokeino midtre sone	24,3	26,9	24,9	27,2	25,5	28,3	27,0	29,8	27,0	27,6
34 - Ábborašša ²	23,1	25,1	22,7	26,0	22,6	25,3	21,6	27,6	24,0	28,0
35 - Fávrosorda	27,7	29,5	27,1	28,9	25,8	30,0	– ¹	28,0	27,6	29,8
36 - Cohkolat	23,1	27,5	25,7	24,7	24,6	25,6	23,8	– ¹	27,3	29,1
37 - Skárfvággi	28,4	32,1	27,3	28,7	27,8	28,7	28,2	32,4	30,6	29,2
39 - Árdni/Gávvir	31,5	30,3	32,1	30,1	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
42 - Beahcegealli	27,6	29,5	27,5	29,4	27,4	28,8	27,1	33,2	29,4	29,2
Kautokeino vestre sone	24,8	28,8	26,2	27,3	25,7	27,7	24,6	28,8	27,9	29,1
VEST-FINNMARK	25,2	28,2	26,4	27,6	26,4	28,4	26,7	29,9	27,2	29,1

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.
 2 Omfatter også slakterein som har sommerbeite i D38-Ulisuolu.

Tabell 14. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv (miessi) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNITTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
19 - Sállan	22,0	20,4	19,6	20,0	20,5	18,6	21,0	19,4	19,2	19,7
20 - Fálá	15,1	13,9	15,4	14,6	15,0	15,4	16,0	16,6	15,2	16,0
21 - Gearretnjárga	17,1	18,6	18,6	17,2	18,2	19,3	19,5	20,7	18,5	19,2
22 - Fiettar	17,8	17,8	17,1	16,7	18,0	17,7	18,9	19,1	17,3	18,2
23 - Seainnus/Návvgastat	17,4	18,3	17,7	17,4	18,3	18,0	19,0	19,9	18,9	19,8
Valgenjárgga siida	21,0	19,8	19,4	19,3	20,1	20,0	20,7	21,0	19,2	20,2
Girenjárgga siida	13,8	16,0	13,9	15,2	16,8	15,9	16,3	18,3	17,5	18,0
Jalgon siida	17,5	18,9	16,7	18,1	18,8	17,4	18,2	19,9	19,7	20,7
Ealenjárgga siida	19,5	19,8	18,1	19,8	17,6	19,1	20,9	– ¹	– ¹	19,2
24A - Oarje-Sievju	19,9	20,9	20,2	19,7	20,4	19,7	21,4	20,7	17,7	18,4
24B - Nuorta-Sievju	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Kautokeino østre sone	18,1	18,2	17,8	17,6	18,5	18,0	19,3	19,6	18,1	19,1
25 - Stierdná	20,3	18,2	– ¹	– ¹	17,3	18,9	22,8	22,3	20,2	20,4
41 - Beaskádas	13,4	14,7	15,0	14,8	15,8	16,4	18,5	19,1	20,5	19,1
26 - Lákkonjárga	15,4	15,0	14,5	15,1	17,0	16,6	17,2	16,9	17,9	17,6
27 - Joahkonjárga	15,4	16,1	13,3	14,4	16,4	15,1	15,7	18,6	16,0	16,2
28 - Cuokcavuotna	19,6	19,8	19,3	18,8	20,0	19,2	19,8	20,7	17,1	19,6
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	18,3	18,1	17,3	18,4	18,1	16,3	18,5	18,1	16,7	17,9
32 - Silvvetnjárga	18,7	18,7	17,2	17,8	17,8	16,5	18,6	18,5	17,7	16,9
33 - Spalca	15,1	16,0	15,1	15,8	15,0	15,3	15,7	18,8	16,1	16,6
40 - Orda	14,6	16,4	16,8	16,2	15,7	16,2	16,5	17,7	17,0	18,1
11T - Ráidná	19,0	– ¹	20,4	19,9	18,1	20,6	19,3	19,2	18,4	– ¹
33T - Ittunjárga	20,6	19,3	19,4	19,3	18,7	19,9	20,0	20,2	18,7	21,1
19/32T - Ivgoláhku	19,4	18,8	19,1	19,1	19,3	19,2	20,5	20,4	20,4	19,8
Kautokeino midtre sone	15,9	16,5	15,5	16,4	16,4	16,4	17,2	18,5	17,3	17,7
34 - Ábborašša ²	15,0	15,7	14,9	16,3	14,6	13,8	13,4	15,1	15,2	14,9
35 - Fávrosorda	16,4	16,9	16,4	17,5	16,9	17,9	18,1	17,5	17,0	17,8
36 - Cohkolat	12,9	15,4	15,4	15,0	14,5	15,9	14,6	– ¹	18,4	17,9
37 - Skárfvággi	15,7	18,3	17,4	17,2	16,8	17,2	17,0	19,7	20,1	18,6
39 - Árdni/Gávvir	20,9	19,8	19,4	19,5	19,3	18,8	20,0	20,6	– ¹	22,3
42 - Beahcegealli	17,0	17,4	15,3	17,9	17,7	16,6	17,0	21,4	20,3	18,7
Kautokeino vestre sone	15,9	16,7	15,7	16,7	15,9	15,7	15,7	18,2	17,5	18,1
VEST-FINNMARK	16,5	17,2	16,1	16,8	16,9	16,7	17,5	18,9	17,6	18,3

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.
 2 Omfatter også slakterein som har sommerbeite i D38-Ulisuolu.

Vedlegg 4 - Næringsoversikt Troms

Tabell 1. Antall siidaandeler med rein og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2024/25 (per 31. mars 2025). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER	SIIDAER	
		i siidaandelene	Sommer	Vinter
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	4	28	1 ¹	1 ¹
36 - Tjeldøy	1	5	1	1
33 - Kongsvikdalen	2	9	1	1
22 - Grovfjord	2	8	1	1
16 - Sør-Senja	2	7	1	1
15 - Nord-Senja	3	8	1	1
14 - Kvaløy	2	9	2	2
12 - Ringvassøy	3	3	1	1
13 - Rebbernesøy	1	5	1	1
10 - Vannøy	1	2	1	1
17/18 - Tromsdalen	9	26	1	2
24 - Bassevuovdi	7	15	1	2
20 - Hjerttind	9	40	1	1
21 - Gielas	4	39	1	1
TROMS	50	204	15	17

Landbruksdirektoratet 2025

1 Består av ett arbeidsfellesskap, men reinen er fordelt på 3 grupper.

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	1 528	1 540	1 532	1 489	1 466	1 423	1 463	1 501	1 494	1 502
36 - Tjeldøy	256	248	245	280	250	247	245	265	251	233
33 - Kongsvikdalen	417	442	442	461	545	332	379	296	385	401
22 - Grovfjord	367	356	358	346	351	366	377	398	412	420
16 - Sør-Senja	424	425	482	522	526	479	587	559	491	419
15 - Nord-Senja	361	340	293	271	254	251	271	282	298	302
14 - Kvaløy	707	732	732	605	583	582	619	328	328	328
12 - Ringvassøy	584	566	537	512	491	452	479	525	534	548
13 - Rebbernesøy	143	132	112	131	129	127	128	130	132	127
10 - Vannøy	325	332	331	350	345	328	320	326	302	341
17/18 - Tromsdalen	2 002	2 048	2 095	2 176	2 354	2 473	2 478	2 514	2 606	2 634
24 - Bassevuovdi	1 331	1 172	1 114	1 151	1 253	1 343	1 575	1 653	1 829	1 852
20 - Hjerttind	1 931	2 010	2 122	2 124	2 152	2 164	2 223	2 202	2 284	2 255
21 - Gielas	1 595	1 600	1 660	1 732	1 641	1 682	1 635	1 620	1 562	1 762
TROMS	11 971	11 943	12 055	12 150	12 340	12 249	12 779	12 599	12 908	13 124

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2024/25 (ukorrigert reintall per 31. mars 2025).

REINBEITEDISTRIKT	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL
	Okse rein	Simlerein	Kalv	pr. 31.03.25
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	12 %	66 %	22 %	1 502
36 - Tjeldøy	20 %	60 %	20 %	233
33 - Kongsvikdalen	12 %	70 %	18 %	401
22 - Grovfjord	15 %	61 %	24 %	420
16 - Sør-Senja	37 %	58 %	5 %	419
15 - Nord-Senja	7 %	79 %	14 %	302
14 - Kvaløy	6 %	79 %	15 %	328
12 - Ringvassøy	18 %	65 %	18 %	548
13 - Rebbernesøy	17 %	69 %	14 %	127
10 - Vannøy	27 %	50 %	23 %	341
17/18 - Tromsdalen	7 %	75 %	18 %	2 634
24 - Bassevuovdi	10 %	73 %	17 %	1 852
20 - Hjerttind	4 %	84 %	13 %	2 255
21 - Gielas	4 %	71 %	24 %	1 762
TROMS	10 %	72 %	18 %	13 124

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2024/25. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved slutten av forrige driftsår (korrigert simletall per 31. mars 2024). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER i vårflokk	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
		Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	1 015	946	519	373	93 %	51 %	37 %
36 - Tjeldøy	149	134	110	64	90 %	74 %	43 %
33 - Kongsvikdalen	261	212	117	95	81 %	45 %	36 %
22 - Grovfjord	256	196	121	104	77 %	47 %	41 %
16 - Sør-Senja	273	65	44	34	24 %	16 %	12 %
15 - Nord-Senja	237	219	94	45	92 %	40 %	19 %
14 - Kvaløy	262	260	220	169	99 %	84 %	65 %
12 - Ringvassøy	358	278	205	99	78 %	57 %	28 %
13 - Rebbernesøy	89	89	89	23	100 %	100 %	26 %
10 - Vannøy	178	153	67	78	86 %	38 %	44 %
17/18 - Tromsdalen	1 913	1 758	1 036	694	92 %	54 %	36 %
24 - Bassevuovdi	1 285	1 167	638	568	91 %	50 %	44 %
20 - Hjerttind	1 866	1 832	1 467	871	98 %	79 %	47 %
21 - Gielas	1 196	1 113	904	574	93 %	76 %	48 %
TROMS	9 338	8 422	5 631	3 791	90 %	60 %	41 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2024/25. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2024, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2024.

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET TAP	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	427	146	573	75	146	221	794	61 %	15 %	33 %
36 - Tjeldøy	24	46	70	15	32	47	117	52 %	19 %	30 %
33 - Kongsvikdalen	95	22	117	18	20	38	155	55 %	10 %	26 %
22 - Grovfjord	75	17	92	24	64	88	180	47 %	21 %	30 %
16 - Sør-Senja	21	10	31	21	22	43	74	48 %	9 %	13 %
15 - Nord-Senja	125	49	174	8	10	18	192	79 %	6 %	37 %
14 - Kvaløy	40	51	91	1	2	3	94	35 %	1 %	16 %
12 - Ringvassøy	73	106	179	32	30	62	241	64 %	12 %	30 %
13 - Rebbernesøy	0	66	66	3	12	15	81	74 %	11 %	37 %
10 - Vannøy	1	1	75	0	18	18	93	49 %	6 %	20 %
17/18 - Tromsdalen	722	342	1 064	42	254	296	1 360	61 %	11 %	31 %
24 - Bassevuovdi	529	70	599	77	158	235	834	51 %	13 %	28 %
20 - Hjertind	365	596	961	25	133	158	1 119	52 %	7 %	27 %
21 - Gielas	209	330	539	39	147	186	725	48 %	12 %	27 %
TROMS ²	2 791	1 840	4 631	380	1 048	1 428	6 059	55 %	11 %	28 %

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Ikke oppgitt grunnet mangel på datagrunnlag. Tidspunkt for merking i de enkelte siidaandelene kan påvirke datagrunnlaget.
- 2 Tall for kalvetap før og etter merking i Vannøy er ikke tatt med i totalberegningene for Troms, grunnet mangel på datagrunnlag.

Tabell 6. Tap av kalver og voksne dyr for driftsåret 2024/25, fordelt på tapsårsak (fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR		
	Fredet rovvilt	Annen kjent	Annen ukjent	Fredet rovvilt	Annen kjent	Annen ukjent
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	77 %	9 %	14 %	50 %	36 %	14 %
36 - Tjeldøy	89 %	11 %	0 %	83 %	17 %	0 %
33 - Kongsvikdalen	90 %	8 %	3 %	50 %	39 %	11 %
22 - Grovfjord	78 %	20 %	2 %	73 %	26 %	1 %
16 - Sør-Senja	100 %	0 %	0 %	35 %	16 %	49 %
15 - Nord-Senja	99 %	0 %	1 %	0 %	0 %	100 %
14 - Kvaløy	89 %	8 %	3 %	67 %	33 %	0 %
12 - Ringvassøy	78 %	15 %	7 %	16 %	58 %	26 %
13 - Rebbernesøy	98 %	2 %	0 %	87 %	13 %	0 %
10 - Vannøy	97 %	3 %	0 %	67 %	33 %	0 %
17/18 - Tromsdalen	93 %	3 %	4 %	90 %	5 %	5 %
24 - Bassevuovdi	100 %	0 %	0 %	97 %	3 %	0 %
20 - Hjertind	92 %	2 %	6 %	75 %	11 %	14 %
21 - Gielas	96 %	3 %	0 %	90 %	9 %	1 %
TROMS	91 %	4 %	4 %	74 %	16 %	9 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 7. Tap av kalver og voksne dyr til rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på rovvilt (ulv, bjørn, kongeørn, jerv og gaupe).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	0 %	0 %	95 %	0 %	5 %	0 %	0 %	75 %	0 %	25 %
36 - Tjeldøy	0 %	0 %	19 %	0 %	81 %	0 %	0 %	15 %	0 %	85 %
33 - Kongsvikdalen	0 %	0 %	85 %	0 %	15 %	0 %	0 %	32 %	0 %	68 %
22 - Grovfjord	0 %	0 %	60 %	11 %	29 %	0 %	0 %	3 %	39 %	58 %
16 - Sør-Senja	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
15 - Nord-Senja ¹	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-
14 - Kvaløy	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
12 - Ringvassøy	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
13 - Rebbenesøy	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
10 - Vannøy	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
17/18 - Tromsdalen	0 %	0 %	60 %	13 %	27 %	0 %	0 %	5 %	34 %	61 %
24 - Bassevuovdi	0 %	0 %	54 %	16 %	31 %	0 %	0 %	7 %	30 %	63 %
20 - Hjertind	0 %	0 %	49 %	16 %	35 %	0 %	0 %	4 %	29 %	67 %
21 - Gielas	0 %	0 %	30 %	38 %	32 %	0 %	0 %	6 %	54 %	40 %
TROMS	0 %	0 %	62 %	14 %	24 %	0 %	0 %	18 %	29 %	53 %

Landbruksdirektoratet 2025

1 I Nord-Senja ble ingen voksne dyr meldt tapt til fredet rovvilt.

Tabell 8. Tap av kalver og voksne dyr til andre årsaker enn rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på årsak (trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	4 %	16 %	5 %	13 %	62 %	29 %	26 %	11 %	6 %	28 %
36 - Tjeldøy	50 %	0 %	50 %	0 %	0 %	75 %	25 %	0 %	0 %	0 %
33 - Kongsvikdalen	8 %	8 %	33 %	25 %	25 %	26 %	21 %	16 %	16 %	21 %
22 - Grovfjord	5 %	85 %	0 %	0 %	10 %	17 %	67 %	0 %	13 %	4 %
16 - Sør-Senja ¹	-	-	-	-	-	11 %	0 %	14 %	0 %	75 %
15 - Nord-Senja	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
14 - Kvaløy	20 %	10 %	30 %	10 %	30 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
12 - Ringvassøy	0 %	30 %	0 %	38 %	33 %	6 %	19 %	6 %	38 %	31 %
13 - Rebbenesøy	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
10 - Vannøy	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	83 %	0 %	0 %	17 %	0 %
17/18 - Tromsdalen	3 %	7 %	36 %	1 %	53 %	23 %	7 %	17 %	0 %	53 %
24 - Bassevuovdi	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	75 %	25 %	0 %	0 %	0 %
20 - Hjertind	5 %	10 %	6 %	4 %	75 %	25 %	15 %	3 %	3 %	55 %
21 - Gielas	21 %	16 %	5 %	47 %	11 %	53 %	0 %	21 %	16 %	11 %
TROMS	7 %	17 %	12 %	12 %	51 %	26 %	19 %	9 %	10 %	36 %

Landbruksdirektoratet 2025

1 I Sør-Senja ble ingen kalver meldt tapt til andre tapsårsaker enn fredet rovvilt.

Tabell 9. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvis slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2024/25. Prosentvis slakteuttak og slakteproduksjon per livrein er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Med totalproduksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsending omregnet til kg per rein i vårflokk (nærmere beskrevet i generelle kommentarer til næringsoversikten).

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT SLUTTAK (antall dyr) 24/25	TOTALT SLKVANTUM (antall kg) 24/25	SLAKTE- PROSENT (% av vårflokk) 24/25	SLPRODUKSJON pr.livrein (kg/dyr) 24/25	TOTALPRODUKSJON pr. livrein (kg/dyr) 23/24 24/25 ¹	
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	144	5 292	10 %	3,5	3,0	3,4
36 - Tjeldøy	35	1 233	14 %	4,9	4,9	1,5
33 - Kongsvikdalen	41	1 402	11 %	3,6	17,0	4,8
22 - Grovfjord	8	336	2 %	0,8	2,5	1,3
16 - Sør-Senja	63	2 156	13 %	4,4	3,2	0,0
15 - Nord-Senja	23	965	8 %	3,2	5,9	3,7
14 - Kvaløy	166	4 845	51 %	14,8	11,6	14,4
12 - Ringvassøy	23	965	4 %	1,8	2,5	3,2
13 - Rebbenesøy	13	509	10 %	3,9	3,2	2,6
10 - Vannøy	21	881	7 %	2,9	-0,1	6,8
17/18 - Tromsdalen	348	11 325	13 %	4,3	5,3	5,0
24 - Bassevuovdi	310	7 159	17 %	3,9	7,1	4,9
20 - Hjerttind	743	20 228	33 %	8,9	8,4	8,5
21 - Gielas	188	5 842	12 %	3,7	5,3	7,2
TROMS	2 126	63 136	16 %	4,9	5,8	5,5

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Siste års tall på totalproduksjon per livrein er foreløpig og beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.

Tabell 10. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2024/25. Prosentfordelingen på dyrekategori og slaktetidspunkt er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift. Totalt antall slaktedyr tilsvarer her kun slakt fra registrerte slakterier.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt Antall slaktedyr
	Okse- rein	Simle- rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	48 %	12 %	39 %	62 %	38 %	49 %	51 %	0 %	89
36 - Tjeldøy	52 %	0 %	48 %	83 %	17 %	100 %	0 %	0 %	29
33 - Kongsvikdalen	42 %	0 %	58 %	76 %	24 %	100 %	0 %	0 %	31
22 - Grovfjord	-	-	-	0 %	100 %	-	-	-	0
16 - Sør-Senja	25 %	51 %	24 %	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	63
15 - Nord-Senja	-	-	-	0 %	100 %	-	-	-	0
14 - Kvaløy	9 %	15 %	76 %	86 %	14 %	99 %	1 %	0 %	143
12 - Ringvassøy	-	-	-	0 %	100 %	-	-	-	0
13 - Rebbernesøy	100 %	0 %	0 %	23 %	77 %	0 %	100 %	0 %	3
10 - Vannøy	-	-	-	0 %	100 %	-	-	-	0
17/18 - Tromsdalen	17 %	8 %	75 %	64 %	36 %	1 %	99 %	0 %	224
24 - Bassevuovdi	9 %	4 %	87 %	97 %	3 %	0 %	100 %	0 %	300
20 - Hjerttind	8 %	13 %	79 %	96 %	4 %	0 %	67 %	33 %	715
21 - Gielas	12 %	1 %	87 %	81 %	19 %	100 %	0 %	0 %	153
TROMS	14 %	11 %	75 %	82 %	18 %	27 %	60 %	13 %	1 750

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2024/25. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktedyr (n) til grunn for beregningene på slaktevekter er gitt i parentes.

REINBEITEDISTRIKT	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	50,1	(24)	32,6	(19)	36,1	(11)	1	(0)	21,9	(35)
36 - Tjeldøy	48,9	(11)	36,5	(4)	1	(0)	1	(0)	21,3	(14)
33 - Kongsvikdalen	48,9	(11)	34,4	(2)	1	(0)	1	(0)	20,9	(18)
22 - Grovfjord	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(0)
16 - Sør-Senja	1	(8)	1	(8)	37,2	(25)	30,8	(7)	21,4	(15)
15 - Nord-Senja	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(0)
14 - Kvaløy	57,2	(13)	1	(0)	34,0	(20)	1	(2)	22,2	(108)
12 - Ringvassøy	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(0)
13 - Rebbernesøy	1	(0)	1	(3)	1	(0)	1	(0)	1	(0)
10 - Vannøy	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(0)	1	(0)
17/18 - Tromsdalen	48,9	(10)	37,6	(29)	38,4	(13)	1	(5)	23,3	(167)
24 - Bassevuovdi	1	(9)	29,6	(18)	30,4	(12)	1	(0)	20,7	(261)
20 - Hjerttind	55,2	(52)	1	(6)	36,8	(90)	1	(2)	22,3	(565)
21 - Gielas	64,4	(19)	1	(0)	1	(0)	1	(1)	23,5	(133)
TROMS	53,8	(157)	34,2	(89)	36,2	(171)	30,8	(17)	22,2	(1316)

Landbruksdirektoratet 2025

1

Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 12. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år (varit) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	37,8	35,3	35,6	32,1	35,0	36,1	34,1	38,8	32,7	32,6
36 - Tjeldøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	36,5
33 - Kongsvikdalen	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	34,4
22 - Grovfjord	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
16 - Sør-Senja	38,4	35,0	36,5	– ¹	33,8	– ¹	– ¹	35,8	– ¹	– ¹
15 - Nord-Senja	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
14 - Kvaløy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	34,0	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
12 - Ringvassøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
13 - Rebbernesøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
10 - Vannøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
17/18 - Tromsdalen	32,9	34,4	34,1	– ¹	– ¹	34,7	34,7	38,3	35,3	37,6
24 - Bassevuovdi	27,8	31,0	– ¹	32,2	31,9	29,6	28,4	– ¹	31,6	29,6
20 - Hjerttind	34,9	– ¹	– ¹	– ¹	37,7	34,0	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
21 - Gielas	34,5	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	34,0	– ¹	– ¹	– ¹
TROMS	33,4	33,4	36,1	32,3	33,9	32,8	34,2	37,4	34,0	34,2

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 13. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år (aldu/rotnu) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	34,3	39,7	38,9	38,6	39,6	39,8	37,5	37,3	35,5	36,1
36 - Tjeldøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
33 - Kongsvikdalen	– ¹	38,2	– ¹	– ¹	40,7	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
22 - Grovfjord	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
16 - Sør-Senja	– ¹	– ¹	39,4	36,3	36,9	– ¹	– ¹	36,9	36,0	37,2
15 - Nord-Senja	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
14 - Kvaløy	– ¹	38,2	– ¹	35,1	34,2	– ¹	38,3	– ¹	33,9	34,0
12 - Ringvassøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
13 - Rebbernesøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
10 - Vannøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
17/18 - Tromsdalen	35,8	35,1	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	30,3	36,1	37,4	38,4
24 - Bassevuovdi	– ¹	32,7	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	30,4
20 - Hjerttind	– ¹	38,1	38,3	38,4	36,5	39,2	36,5	35,9	38,5	36,8
21 - Gielas	40,8	38,4	36,3	34,5	35,1	– ¹	37,9	37,5	35,7	– ¹
TROMS	36,1	36,9	38,0	36,6	36,5	37,8	35,5	36,9	36,8	36,2

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 14. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv (miessi) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	21,6	23,4	22,3	22,3	21	22,6	22,6	22,5	22,9	21,9
36 - Tjeldøy	21,1	19,9	21,2	22,1	20,3	22,5	21,2	23,4	21,8	21,3
33 - Kongsvikdalen	21,5	21,5	21,2	21,1	20,4	22,2	21,0	23,8	21,4	20,9
22 - Grovfjord	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
16 - Sør-Senja	– ¹	23,4	23,1	22,4	21,7	– ¹	– ¹	20,0	20,9	21,4
15 - Nord-Senja	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
14 - Kvaløy	– ¹	21,8	20,8	21,6	23,2	22,9	23,5	23,2	22,1	22,2
12 - Ringvassøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
13 - Rebbenesøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
10 - Vannøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
17/18 - Tromsdalen	22,9	23,0	22,6	22,1	20,6	22,2	24,2	22,8	23,0	23,3
24 - Bassevuovdi	22,9	21,6	– ¹	22,8	21,4	19,4	20,1	23,0	22,8	20,7
20 - Hjertind	23,4	24,4	24,4	23,5	21,6	22,5	22,4	23,2	22,7	22,3
21 - Gielas	22,8	23,8	23,2	23,1	22,6	23,5	22,5	24,3	23,0	23,5
TROMS	22,8	23,5	23,3	22,9	21,8	22,3	22,4	23,3	22,7	22,2

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Vedlegg 5 - Næringsoversikt Nordland

Tabell 1. Antall siidaandeler med rein og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2024/25 (per 31. mars 2025). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER	SIIDAER	
		i siidaandelene	Sommer	Vinter
18 - Voengelh-Njaarke	6	56	1	1
20 - Jillen-Njaarke	4	14	2	2
19 - Byrkije	3	8	1	1
21 - Røssåga/Toven	3	11	2	2
23 - Hestmannen/Strandtindene	2	11	1	1
22 - Ildgruben	2	9	1	1
24 - Saltfjellet	7	38	1	1
25 - Balvatn	2	9	1	1
26 - Duokta	3	17	1	1
27 - Ståjggo-Hábmer	4	13	2	2
28 - Frostisen	3	22	1	1
29 - Skjomen	2	8	1	1
NORDLAND	41	216	15	17

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
18 - Voengelh-Njaarke	2 165	2 317	2 193	2 218	2 252	2 036	2 095	2 110	1 949	1 853
20 - Jillen-Njaarke	1 772	1 690	1 657	1 800	1 775	1 700	1 663	1 715	1 702	1 725
19 - Byrkije	1 485	1 480	1 429	1 405	1 421	1 434	1 496	1 474	1 429	1 462
21 - Røssåga/Toven	615	635	1 041	893	961	976	1 023	893	1 012	995
23 - Hestmannen/Strandtindene	1 174	1 217	902	912	914	966	910	880	884	884
22 - Ildgruben	898	890	888	875	883	882	880	898	881	869
24 - Saltfjellet	3 466	3 505	3 373	3 275	3 208	3 344	3 383	3 390	3 479	3 530
25 - Balvatn	877	725	548	530	561	552	596	603	674	642
26 - Duokta	691	674	704	745	774	727	671	699	731	726
27 - Ståjggo-Hábmer	611	511	485	632	659	708	699	705	674	689
28 - Frostisen	415	413	521	540	561	567	435	398	241	225
29 - Skjomen	197	162	143	135	110	85	141	167	179	198
NORDLAND	14 366	14 219	13 884	13 960	14 079	13 977	13 992	13 932	13 835	13 798

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2024/25 (ukorrigert reintall per 31. mars 2025).

REINBEITEDISTRIKT	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL pr. 31.03.25
	Okserlein	Simlerein	Kalv	
18 - Voengelh-Njaarke	8 %	71 %	21 %	1 853
20 - Jillen-Njaarke	12 %	65 %	23 %	1 725
19 - Byrkije	6 %	79 %	16 %	1 462
21 - Røssåga/Toven	13 %	66 %	21 %	995
23 - Hestmannen/Strandtindene	15 %	63 %	21 %	884
22 - Ildgruben	7 %	75 %	18 %	869
24 - Saltfjellet	7 %	69 %	24 %	3 530
25 - Balvatn	11 %	63 %	26 %	642
26 - Duokta	12 %	71 %	18 %	726
27 - Stájggo-Hábmer	17 %	65 %	19 %	689
28 - Frostisen	8 %	80 %	12 %	225
29 - Skjomen	11 %	63 %	27 %	198
NORDLAND	10 %	69 %	21 %	13 798

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2024/25. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved slutten av forrige driftsår (korrigert simletall per 31. mars 2024). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER i vårflokk	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
		Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
18 - Voengelh-Njaarke	1 400	1 310	901	416	94 %	64 %	30 %
20 - Jillen-Njaarke	1 124	1 077	988	428	96 %	88 %	38 %
19 - Byrkije	1 159	1 103	833	585	95 %	72 %	50 %
21 - Røssåga/Toven	614	590	449	354	96 %	73 %	58 %
23 - Hestmannen/Strandtindene	594	558	491	201	94 %	83 %	34 %
22 - Ildgruben	642	599	415	315	93 %	65 %	49 %
24 - Saltfjellet	2 488	2 345	1 934	958	94 %	78 %	39 %
25 - Balvatn	420	401	375	167	95 %	89 %	40 %
26 - Duokta	491	438	202	177	89 %	41 %	36 %
27 - Stájggo-Hábmer	437	429	338	135	98 %	77 %	31 %
28 - Frostisen	194	204	54	30	105 %	28 %	15 %
29 - Skjomen	121	97	86	69	80 %	71 %	57 %
NORDLAND	9 684	9 151	7 066	3 835	94 %	73 %	40 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2024/25. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2024, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2024.

REINBEITEDIS TRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
18 - Voengelh-Njaarke	409	485	894	81	315	396	1 290	68 %	20 %	40 %
20 - Jillen-Njaarke	89	560	649	117	197	314	963	60 %	18 %	35 %
19 - Byrkije	270	248	518	29	90	119	637	47 %	8 %	25 %
21 - Røssåga/Toven	141	95	236	41	119	160	396	40 %	16 %	25 %
23 - Hestmannen/Strandtindene	67	290	357	36	106	142	499	64 %	16 %	35 %
22 - Ildgruben	184	100	284	10	50	60	344	47 %	7 %	23 %
24 - Saltfjellet	411	976	1 387	115	553	668	2 055	59 %	19 %	35 %
25 - Balvatn	26	208	234	19	166	185	419	58 %	27 %	39 %
26 - Duokta	236	25	261	28	65	93	354	60 %	13 %	30 %
27 - Ståjggo-Hábmer	91	203	294	19	76	95	389	69 %	14 %	35 %
28 - Frostisen	150	24	174	10	28	38	212	85 %	16 %	48 %
29 - Skjomen	11	17	28	5	29	34	62	29 %	19 %	22 %
NORDLAND	2 085	3 231	5 316	510	1 794	2 304	7 620	58 %	17 %	33 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 6. Tap av kalver og voksne dyr for driftsåret 2024/25, fordelt på tapsårsak (fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEDIS TRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR		
	Fredet rovvilt	Annen kjent	Annen ukjent	Fredet rovvilt	Annen kjent	Annen ukjent
18 - Voengelh-Njaarke	96 %	4 %	1 %	90 %	9 %	1 %
20 - Jillen-Njaarke	80 %	14 %	6 %	73 %	22 %	6 %
19 - Byrkije	89 %	9 %	2 %	67 %	29 %	4 %
21 - Røssåga/Toven	100 %	0 %	0 %	96 %	3 %	1 %
23 - Hestmannen/Strandtindene	96 %	3 %	1 %	81 %	14 %	5 %
22 - Ildgruben	92 %	6 %	2 %	72 %	23 %	5 %
24 - Saltfjellet	96 %	2 %	2 %	91 %	8 %	1 %
25 - Balvatn	97 %	3 %	0 %	78 %	21 %	1 %
26 - Duokta	90 %	7 %	3 %	56 %	33 %	11 %
27 - Ståjggo-Hábmer	100 %	0 %	0 %	95 %	5 %	0 %
28 - Frostisen	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
29 - Skjomen	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
NORDLAND	93 %	5 %	2 %	84 %	13 %	3 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 7. Tap av kalver og voksne dyr til rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på rovvilt (ulv, bjørn, kongeørn, jerv og gaupe).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe
18 - Voengelh-Njaarke	0 %	2 %	26 %	33 %	39 %	0 %	2 %	6 %	44 %	48 %
20 - Jillen-Njaarke	0 %	3 %	16 %	32 %	49 %	0 %	3 %	4 %	35 %	59 %
19 - Byrkije	0 %	0 %	50 %	20 %	30 %	0 %	0 %	16 %	40 %	44 %
21 - Røssåga/Toven	0 %	0 %	41 %	24 %	35 %	0 %	0 %	1 %	44 %	55 %
23 - Hestmannen/Strandtindene	0 %	0 %	19 %	49 %	32 %	0 %	0 %	1 %	56 %	43 %
22 - Ildgruben	0 %	0 %	34 %	51 %	15 %	0 %	0 %	0 %	95 %	5 %
24 - Saltfjellet	0 %	0 %	37 %	31 %	31 %	0 %	0 %	10 %	49 %	41 %
25 - Balvatn	0 %	0 %	29 %	36 %	36 %	0 %	0 %	1 %	45 %	54 %
26 - Duokta	0 %	0 %	21 %	20 %	59 %	0 %	0 %	2 %	23 %	75 %
27 - Ståjggo-Hábmer	0 %	0 %	27 %	37 %	36 %	0 %	0 %	11 %	57 %	32 %
28 - Frostisen	0 %	0 %	39 %	34 %	28 %	0 %	0 %	0 %	47 %	53 %
29 - Skjomen	0 %	0 %	11 %	64 %	25 %	0 %	0 %	0 %	74 %	26 %
NORDLAND	0 %	1 %	31 %	33 %	35 %	0 %	1 %	6 %	47 %	47 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 8. Tap av kalver og voksne dyr til andre årsaker enn rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på årsak (trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent
18 - Voengelh-Njaarke	10 %	46 %	26 %	0 %	18 %	61 %	17 %	10 %	0 %	12 %
20 - Jillen-Njaarke	11 %	13 %	11 %	35 %	31 %	34 %	12 %	8 %	26 %	21 %
19 - Byrkije	5 %	35 %	21 %	25 %	14 %	36 %	23 %	21 %	8 %	13 %
21 - Røssåga/Toven	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	83 %	0 %	0 %	0 %	17 %
23 - Hestmannen/Strandtindene	0 %	43 %	0 %	29 %	29 %	26 %	37 %	0 %	11 %	26 %
22 - Ildgruben	13 %	0 %	8 %	54 %	25 %	47 %	0 %	6 %	29 %	18 %
24 - Saltfjellet	9 %	13 %	17 %	20 %	41 %	75 %	8 %	0 %	3 %	14 %
25 - Balvatn	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	95 %	0 %	0 %	5 %
26 - Duokta	8 %	16 %	28 %	20 %	28 %	41 %	7 %	20 %	7 %	24 %
27 - Ståjggo-Hábmer	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
28 - Frostisen ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 - Skjomen ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORDLAND	9 %	22 %	15 %	26 %	27 %	41 %	23 %	8 %	12 %	16 %

Landbruksdirektoratet 2025

- ¹ I Frostisen ble ingen kalver eller voksne dyr meldt tapt til andre tapsårsaker enn fredet rovvilt.
- ² I Skjomen ble ingen kalver eller voksne dyr meldt tapt til andre tapsårsaker enn fredet rovvilt.

Tabell 9. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvis slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2024/25. Prosentvis slakteuttak og slakteproduksjon per livrein er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Med totalproduksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsendring omregnet til kg per rein i vårflokk (nærmere beskrevet i generelle kommentarer til næringsoversikten).

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SLPRODUKSJON	TOTALPRODUKSJON	
	SLUTTAK	SLKVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	24/25	24/25	24/25	24/25	23/24	24/25 ¹
18 - Voengelh-Njaarke	121	4 654	6 %	2,4	0,6	0,3
20 - Jillen-Njaarke	103	4 116	6 %	2,4	3,6	2,9
19 - Byrkije	450	10 106	31 %	7,1	6,4	7,3
21 - Røssåga/Toven	180	4 742	18 %	4,7	8,8	4,8
23 - Hestmannen/Strandtindene	59	2 743	7 %	3,1	2,0	2,7
22 - Ildgruben	267	7 749	30 %	8,8	9,4	10,1
24 - Saltfjellet	280	9 746	8 %	2,8	5,3	3,4
25 - Balvatn	14	596	2 %	0,9	4,4	-0,1
26 - Duokta	89	3 790	12 %	5,2	1,7	5,5
27 - Ståjggo-Hábmer	25	1 065	4 %	1,6	-0,7	3,1
28 - Frostisen ²	8	341	3 %	1,4	-11,7	-1,2
29 - Skjomen	16	430	9 %	2,4	2,5	7,3
NORDLAND	1 612	50 077	12 %	3,6	3,7	3,7

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Siste års tall er foreløpig da det er delvis beregnet på grunnlag av ukorrigerte reintall.
- 2 Det lave tallet på produksjon per livrein i Frostisen kan være påvirket av at ikke alle siidaandeler i dette distriktet hadde levert melding om reindrift på tidspunktet for beregningene.

Tabell 10. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2024/25. Prosentfordelingen på dyrekategori og slaktetidspunkt er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift. Totalt antall slaktedyr tilsvarer her kun slakt fra registrerte slakterier.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt
	Okse- rein	Simle- rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	Antall slaktedyr
18 - Voengelh-Njaarke	47 %	26 %	27 %	79 %	21 %	42 %	52 %	6 %	96
20 - Jillen-Njaarke	30 %	44 %	27 %	69 %	31 %	18 %	59 %	23 %	71
19 - Byrkije	1 %	16 %	83 %	99 %	1 %	71 %	26 %	4 %	446
21 - Røssåga/Toven	1 %	4 %	95 %	88 %	12 %	0 %	100 %	0 %	158
23 - Hestmannen/Strandtindene	44 %	35 %	21 %	73 %	27 %	42 %	58 %	0 %	43
22 - Ildgruben	13 %	26 %	60 %	96 %	4 %	0 %	83 %	17 %	255
24 - Saltfjellet	29 %	14 %	57 %	79 %	21 %	0 %	74 %	26 %	221
25 - Balvatn	-	-	-	0 %	100 %	-	-	-	0
26 - Duokta	-	-	-	0 %	100 %	-	-	-	0
27 - Ståjggo-Hábmer	-	-	-	0 %	100 %	-	-	-	0
28 - Frostisen	-	-	-	0 %	100 %	-	-	-	0
29 - Skjomen	0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	16
NORDLAND	14 %	19 %	67 %	81 %	19 %	30 %	60 %	11 %	1 306

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2024/25. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktedyr (n) til grunn for beregningene på slaktevekter er gitt i parentes.

REINBEITEDIS TRIKT										
	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
18 - Voengelh-Njaarke	49,6	(42)	_1	(3)	34,1	(25)	_1	(0)	21,2	(26)
20 - Jillen-Njaarke	69,6	(17)	_1	(4)	34,0	(31)	_1	(0)	20,8	(19)
19 - Byrkije	_1	(0)	_1	(4)	30,9	(68)	_1	(3)	20,6	(371)
21 - Røssåga/Toven	_1	(1)	_1	(0)	_1	(7)	_1	(0)	23,2	(150)
23 - Hestmannen/Strandtindene	73,2	(19)	_1	(0)	34,0	(14)	_1	(1)	_1	(9)
22 - Ildgruben	55,3	(30)	_1	(4)	33,4	(67)	_1	(0)	21,0	(154)
24 - Saltfjellet	56,1	(42)	49,9	(22)	36,7	(22)	39,7	(10)	20,6	(125)
25 - Balvatn	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)
26 - Duokta	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)
27 - Ståjggo-Hábmer	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)
28 - Frostisen	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)
29 - Skjomen	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)	_1	(0)	26,9	(16)
NORDLAND	57,8	(151)	41,6	(37)	33,3	(234)	35,7	(14)	21,2	(870)

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 12. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år (varit) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDIS TRIKT										
GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)										
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
18 - Voengelh-Njaarke	39,8	34,9	32,4	34,0	31,3	37,6	34,6	34,1	_1	_1
20 - Jillen-Njaarke	_1	32,8	_1	33,1	32,7	33,3	36,7	30,8	_1	_1
19 - Byrkije	37,4	_1	_1	_1	_1	_1	45,7	_1	_1	_1
21 - Røssåga/Toven	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	36,7	_1	_1
23 - Hestmannen/Strandtindene	_1	38,1	41,8	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1
22 - Ildgruben	_1	_1	_1	46,3	45,0	_1	_1	_1	_1	_1
24 - Saltfjellet	34,6	37,5	36,0	_1	_1	_1	_1	37,4	_1	49,9
25 - Balvatn	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1
26 - Duokta	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1
27 - Ståjggo-Hábmer	_1	38,9	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1
28 - Frostisen	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1
29 - Skjomen	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1	_1
NORDLAND	36,9	36,6	36,5	36,4	34,2	34,4	40,1	35,6	35,6	41,6

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 13. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år (aldu/rotnu) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
18 - Voengelh-Njaarke	33,5	34,7	34,9	32,4	34,1	34,0	38,2	35,7	34,8	34,1
20 - Jillen-Njaarke	28,6	32,6	34,4	36,3	– ¹	33,4	37,7	35,0	38,2	34,0
19 - Byrkije	34,3	35,0	33,3	32,9	32,4	32,6	34,1	32,9	32,5	30,9
21 - Røssåga/Toven	– ¹	– ¹	38,1	35,2	38,0	37,1	35,3	36,9	39,0	– ¹
23 - Hestmannen/Strandtindene	– ¹	35,5	38,1	35,5	38,0	36,4	– ¹	– ¹	42,8	34,0
22 - Ildgruben	– ¹	35,5	35,0	36,6	42,4	33,6	33,5	34,4	35,7	33,4
24 - Saltfjellet	34,6	35,6	35,0	34,2	34,2	– ¹	32,4	32,1	35,9	36,7
25 - Balvatn	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	40,2	– ¹	– ¹
26 - Duokta	40,1	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
27 - Ståjggo-Hábmer	– ¹	40,1	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
28 - Frostisen	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
29 - Skjomen	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
NORDLAND	34,4	35,6	35,3	34,4	35,9	34,9	34,6	34,5	35,5	33,3

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 14. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv (miessi) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
18 - Voengelh-Njaarke	21,7	21,0	20,8	19,7	21,3	21,0	20,5	22,6	20,7	21,2
20 - Jillen-Njaarke	21,9	19,9	– ¹	21,9	21,3	20,8	– ¹	20,7	23,8	20,8
19 - Byrkije	21,4	22,6	21,8	20,8	22,1	22,0	21,9	21,4	21,9	20,6
21 - Røssåga/Toven	23,7	25,6	24,0	23,0	22,7	21,8	21,8	23,5	23,2	23,2
23 - Hestmannen/Strandtindene	24,0	23,2	22,7	17,9	21,6	17,9	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
22 - Ildgruben	21,3	22,9	22,4	23,9	24,2	22,9	22,9	21,2	23,3	21,0
24 - Saltfjellet	21,5	23,6	21,5	21,1	20,4	19,5	19,9	20,5	22,2	20,6
25 - Balvatn	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	26,7	– ¹	– ¹
26 - Duokta	20,3	22,6	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
27 - Ståjggo-Hábmer	– ¹	26,8	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
28 - Frostisen	– ¹	25,6	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
29 - Skjomen	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	26,9
NORDLAND	21,7	23,0	22,1	21,8	21,9	21,8	21,9	21,7	22,4	21,2

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Vedlegg 6 - Næringsoversikt Nord-Trøndelag

Tabell 1. Antall siidaandeler med rein og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2024/25 (per 31. mars 2025). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER	SIIDAER	
		i siidaandelene	Sommer	Vinter
7 - Færen / Gasken-Laante	4	20	1	1
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	5	33	1	1
9 - Låarte	6	26	1	1
10 - Tjæhkere sijte	12	44	3	3
11 - Åarjel-Njaarke	6	28	2	2
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	6	29	2	2
NORD-TRØNDELAG	39	180	10	10

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
7 - Færen / Gasken-Laante	1 421	1 436	1 471	1 604	1 671	1 852	1 991	1 986	1 859	1 732
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	2 077	2 001	2 059	1 931	1 840	1 820	1 644	1 667	1 806	1 794
9 - Låarte	2 342	2 265	2 270	2 264	2 325	2 326	2 261	2 289	2 329	2 349
10 - Tjæhkere sijte	4 355	4 491	4 433	4 514	4 505	4 496	4 495	4 563	4 445	4 488
11 - Åarjel-Njaarke	2 069	2 035	2 002	1 728	1 976	1 746	1 811	1 849	1 850	1 907
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	1 900	1 978	1 933	1 880	1 856	1 838	1 794	1 709	1 682	1 653
NORD-TRØNDELAG	14 164	14 206	14 168	13 921	14 173	14 078	13 996	14 063	13 971	13 923

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2024/25 (ukorrigert reintall per 31. mars 2025).

REINBEITEDISTRIKT	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL pr. 31.03.25
	Okserein	Simlerein	Kalv	
7 - Færen / Gasken-Laante	6 %	79 %	15 %	1 732
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	2 %	76 %	21 %	1 794
9 - Låarte	4 %	77 %	19 %	2 349
10 - Tjæhkere sijte	4 %	77 %	19 %	4 488
11 - Åarjel-Njaarke	10 %	71 %	19 %	1 907
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	8 %	72 %	19 %	1 653
NORD-TRØNDELAG	5 %	76 %	19 %	13 923

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2024/25. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved slutten av forrige driftsår (korrigert simletall per 31. mars 2024). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER i vårflokk	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
		Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
7 - Færen / Gasken-Laante	1 441	1 389	1 040	617	96 %	72 %	43 %
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	1 409	1 335	1 234	742	95 %	88 %	53 %
9 - Låarte	1 775	1 677	1 385	982	94 %	78 %	55 %
10 - Tjæhkere sijte	3 464	3 382	2 656	2 232	98 %	77 %	64 %
11 - Åarjel-Njaarke	1 324	1 240	952	529	94 %	72 %	40 %
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	1 218	1 116	622	367	92 %	51 %	30 %
NORD-TRØNDELAG	10 631	10 139	7 889	5 469	95 %	74 %	51 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2024/25. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2024, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintentall per 31. mars 2024). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2024.

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET TAP	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
7 - Færen / Gasken-Laante	349	423	772	17	253	270	1 042	56 %	15 %	32 %
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	101	492	593	15	208	223	816	44 %	12 %	26 %
9 - Låarte	292	403	695	7	105	112	807	41 %	5 %	20 %
10 - Tjæhkere sijte	726	424	1 150	45	275	320	1 470	34 %	7 %	19 %
11 - Åarjel-Njaarke	288	423	711	46	163	209	920	57 %	11 %	30 %
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	494	255	749	44	190	234	983	67 %	14 %	35 %
NORD-TRØNDELAG	2 250	2 420	4 670	174	1 194	1 368	6 038	46 %	10 %	25 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 6. Tap av kalver og voksne dyr for driftsåret 2024/25, fordelt på tapsårsak (fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR		
	Fredet rovvilt	Annen kjent	Annen ukjent	Fredet rovvilt	Annen kjent	Annen ukjent
7 - Færen / Gasken-Laante	94 %	0 %	6 %	91 %	1 %	9 %
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	92 %	3 %	5 %	72 %	24 %	4 %
9 - Låarte	94 %	1 %	5 %	86 %	13 %	2 %
10 - Tjæhkere sijte	99 %	1 %	1 %	92 %	6 %	2 %
11 - Åarjel-Njaarke	99 %	1 %	0 %	95 %	4 %	1 %
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	96 %	0 %	4 %	87 %	0 %	13 %
NORD-TRØNDELAG	96 %	1 %	3 %	88 %	7 %	5 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 7. Tap av kalver og voksne dyr til rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på rovvilt (ulv, bjørn, kongeørn, jerv og gaupe).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe
7 - Færen / Gasken-Laante	7 %	0 %	9 %	68 %	16 %	6 %	0 %	0 %	78 %	15 %
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	0 %	9 %	32 %	39 %	20 %	0 %	8 %	3 %	61 %	28 %
9 - Låarte	0 %	10 %	13 %	58 %	19 %	0 %	0 %	1 %	75 %	24 %
10 - Tjæhkere sijte	0 %	9 %	26 %	39 %	26 %	0 %	8 %	4 %	48 %	39 %
11 - Åarjel-Njaarke	0 %	1 %	21 %	40 %	38 %	0 %	3 %	8 %	52 %	38 %
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	0 %	0 %	52 %	20 %	28 %	0 %	0 %	12 %	35 %	52 %
NORD-TRØNDELAG	1 %	5 %	26 %	44 %	25 %	1 %	4 %	5 %	57 %	34 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 8. Tap av kalver og voksne dyr til andre årsaker enn rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på årsak (trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent
7 - Færen / Gasken-Laante	2 %	0 %	0 %	0 %	98 %	4 %	0 %	4 %	0 %	92 %
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	9 %	7 %	20 %	0 %	64 %	60 %	5 %	23 %	0 %	13 %
9 - Låarte	8 %	8 %	0 %	0 %	85 %	88 %	0 %	0 %	0 %	13 %
10 - Tjæhkere sijte	0 %	24 %	18 %	12 %	47 %	32 %	16 %	24 %	0 %	28 %
11 - Åarjel-Njaarke	14 %	71 %	0 %	0 %	14 %	18 %	55 %	0 %	9 %	18 %
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
NORD-TRØNDELAG	5 %	8 %	6 %	1 %	80 %	37 %	8 %	12 %	1 %	43 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 9. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvis slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2024/25. Prosentvis slakteuttak og slakteproduksjon per livrein er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Med totalproduksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsendring omregnet til kg per rein i vårflokk (nærmere beskrevet i generelle kommentarer til næringsoversikten).

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SLPRODUKSJON	TOTALPRODUKSJON	
	SLUTTAK	SLKVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	24/25	24/25	24/25	24/25	23/24	24/25 ¹
7 - Færen / Gasken-Laante	674	15 783	36 %	8,5	2,3	6,7
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	554	13 021	31 %	7,2	9,3	6,9
9 - Låarte	873	21 126	37 %	9,1	7,6	9,2
10 - Tjæhkere sijte	1 880	43 998	42 %	9,9	9,6	10,1
11 - Åarjel-Njaarke	273	7 409	15 %	4,0	4,6	4,8
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	162	5 242	10 %	3,1	2,8	2,5
NORD-TRØNDELAG	4 416	106 579	32 %	7,6	6,7	7,5

Landbruksdirektoratet 2025

1 Siste års tall på totalproduksjon per livrein er foreløpig og beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.

Tabell 10. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2024/25. Prosentfordelingen på dyrekategori og slaktetidspunkt er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift. Totalt antall slaktedyr tilsvarer her kun slakt fra registrerte slakterier.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt Antall slaktedyr
	Okse- rein	Simle- rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	
7 - Færen / Gasken-Laante	21 %	12 %	67 %	99 %	1 %	32 %	24 %	44 %	667
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	25 %	10 %	66 %	96 %	4 %	1 %	94 %	5 %	531
9 - Låarte	17 %	20 %	62 %	98 %	2 %	2 %	50 %	48 %	858
10 - Tjæhkere sijte	5 %	19 %	76 %	96 %	4 %	50 %	23 %	28 %	1806
11 - Åarjel-Njaarke	11 %	12 %	77 %	84 %	16 %	0 %	71 %	29 %	229
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	48 %	16 %	36 %	81 %	19 %	18 %	0 %	82 %	132
NORD-TRØNDELAG	14 %	16 %	69 %	96 %	4 %	27 %	39 %	33 %	4 223

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2024/25. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktedyr (n) til grunn for beregningene på slaktevekter er gitt i parentes.

REINBEITEDISTRIKT	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
7 - Færen / Gasken-Laante	46,3	(30)	29,6	(112)	32,5	(28)	26,1	(51)	19,3	(446)
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	40,8	(58)	28,3	(73)	29,4	(26)	24,0	(25)	18,6	(349)
9 - Låarte	42,3	(66)	27,5	(84)	30,7	(169)	_1	(3)	19,2	(536)
10 - Tjæhkere sijte	40,6	(55)	28,5	(34)	31,3	(325)	25,7	(14)	20,2	(1378)
11 - Åarjel-Njaarke	51,5	(21)	_1	(4)	33,5	(27)	_1	(1)	21,6	(176)
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	44,4	(55)	_1	(8)	31,4	(21)	_1	(0)	19,6	(48)
NORD-TRØNDELAG	43,2	(285)	28,6	(315)	31,2	(596)	25,5	(94)	19,8	(2933)

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 12. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
7 - Færen / Gasken-Laante	29,2	31,9	28,7	29,9	29,8	28,0	27,9	29,3	29,6	29,6
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	32,0	28,6	28,2	27,7	28,5	30,1	27,0	29,1	29,2	28,3
9 - Låarte	27,8	29,3	29,7	29,2	27,7	28,5	30,3	27,6	27,9	27,5
10 - Tjæhkere sijte	31,0	33,4	32,4	32,8	30,0	31,1	30,3	30,9	30,5	28,5
11 - Åarjel-Njaarke	33,3	35,4	31,3	34,0	28,3	31,0	_1	_1	_1	_1
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	27,5	29,6	27,7	28,2	25,6	26,0	26,8	26,7	28,0	_1
NORD-TRØNDELAG	29,3	31,6	29,9	29,6	28,7	29,5	28,7	28,8	29,2	28,6

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 13. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
7 - Færen / Gasken-Laante	33,6	32,6	31,4	34,0	33,0	33,2	33,4	33,0	33,4	32,5
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	30,8	30,6	31,1	29,7	30,8	32,9	31,4	30,9	33,0	29,4
9 - Låarte	31,0	32,3	32,5	33,0	32,7	33,3	30,5	32,3	31,8	30,7
10 - Tjæhkere sijte	34,1	35,0	34,2	33,1	32,0	33,7	32,9	33,3	32,2	31,3
11 - Åarjel-Njaarke	34,7	35,4	35,0	33,8	33,3	34,6	31,7	35,9	34,2	33,5
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	32,8	32,3	32,4	33,0	30,4	32,8	31,8	36,0	33,2	31,4
NORD-TRØNDELAG	32,6	33,6	33,8	32,7	32,3	33,7	32,1	33,1	32,4	31,2

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 14. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/ registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
7 - Færen/Gasken-Laante	22,0	22,0	19,6	20,1	18,5	19,4	19,7	20,3	20,7	19,3
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	17,1	19,0	18,6	17,9	17,8	18,8	18,0	18,2	18,1	18,6
9 - Låarte	18,7	20,6	20,0	19,2	20,2	18,4	18,1	19,4	18,8	19,2
10 - Tjæhkere sijte	21,3	21,8	21,5	20,7	20,6	20,8	20,8	20,1	20,0	20,2
11 - Åarjel-Njaarke	23,1	22,8	21,0	21,2	21,6	20,4	19,9	21,8	21,9	21,6
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	18,9	19,7	18,3	18,8	18,0	19,0	19,5	20,2	20,2	19,6
NORD-TRØNDELAG	19,8	21,0	20,3	19,7	19,7	19,8	19,7	19,8	19,7	19,8

Landbruksdirektoratet 2025

Vedlegg 7 - Næringsoversikt Sør-Trøndelag/Hedmark

Tabell 1. Antall siidaandeler med rein og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2024/25 (per 31. mars 2025). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER i siidaandelene	SIIDAER	
			Sommer	Vinter
3 - Elgå	6	25	1	1
2 - Riast/Hylling	10	54	1	1
1 - Essand	9	41	1	1
Trollheimen	5	22	1	1
SØR-TRØND./HEDM.	30	142	4	4

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
3 - Elgå	2 753	2 875	3 433	2 893	2 904	2 891	2 918	3 044	2 955	2 970
2 - Riast/Hylling	4 573	4 821	4 894	4 955	4 965	5 034	5 036	5 037	5 113	5 103
1 - Essand	4 299	4 475	4 671	4 326	4 339	4 341	4 392	4 397	4 382	4 349
Trollheimen	1 541	1 595	1 610	1 599	1 558	1 608	1 603	1 590	1 586	1 592
SØR-TRØND./HEDM.	13 166	13 766	14 608	13 773	13 766	13 874	13 949	14 068	14 036	14 014

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2024/25 (ukorrigert reintall per 31. mars 2025).

REINBEITEDISTRIKT	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL pr. 31.03.25
	Okserein	Simlerein	Kalv	
3 - Elgå	5 %	79 %	16 %	2 970
2 - Riast/Hylling	2 %	80 %	18 %	5 103
1 - Essand	8 %	76 %	16 %	4 349
Trollheimen	5 %	80 %	15 %	1 592
SØR-TRØND./HEDM.	5 %	79 %	17 %	14 014

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2024/25. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved slutten av forrige driftsår (korrigert simletall per 31. mars 2024). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER i vårflokk	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
		Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
3 - Elgå	2 356	2 208	1 866	1 543	94 %	79 %	65 %
2 - Riast/Hylling	4 057	3 895	2 884	3 124	96 %	71 %	77 %
1 - Essand	3 216	3 062	2 685	2 310	95 %	83 %	72 %
Trollheimen	1 281	1 206	1 042	1 039	94 %	81 %	81 %
SØR-TRØND./HEDM.	10 910	10 371	8 477	8 016	95 %	78 %	73 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2024/25. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2024, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2024.

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET TAP	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
3 - Elgå	342	323	665	39	161	200	865	30 %	7 %	17 %
2 - Riast/Hylling	1	1	771	41	150	191	962	20 %	4 %	11 %
1 - Essand	377	375	752	49	162	211	963	25 %	5 %	13 %
Trollheimen	164	3	167	4	29	33	200	14 %	2 %	7 %
SØR-TRØND./HEDM. ²	883	701	2 355	133	502	635	2 990	23 %	5 %	12 %

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Ikke oppgitt grunnet mangel på datagrunnlag. Tidspunkt for merking i de enkelte siidaandelene kan påvirke datagrunnlaget.
- 2 Tall for kalvetap før og etter merking i Riast/Hylling er ikke tatt med i totalberegningene for Sør-Trøndelag/Hedmark, grunnet mangel på datagrunnlag.

Tabell 6. Tap av kalver og voksne dyr for driftsåret 2024/25, fordelt på tapsårsak (fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR		
	Fredet rovvilt	Annen kjent	Annen ukjent	Fredet rovvilt	Annen kjent	Annen ukjent
3 - Elgå	87 %	2 %	11 %	61 %	9 %	30 %
2 - Riast/Hylling	95 %	1 %	4 %	79 %	15 %	6 %
1 - Essand	94 %	1 %	5 %	91 %	5 %	4 %
Trollheimen	87 %	0 %	13 %	88 %	0 %	12 %
SØR-TRØND./HEDM.	92 %	1 %	7 %	78 %	9 %	13 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 7. Tap av kalver og voksne dyr til rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på rovvilt (ulv, bjørn, kongeørn, jerv og gaupe).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe
3 - Elgå	4 %	26 %	33 %	29 %	9 %	9 %	39 %	5 %	35 %	12 %
2 - Riast/Hylling	1 %	2 %	45 %	40 %	11 %	2 %	6 %	11 %	61 %	21 %
1 - Essand	5 %	2 %	35 %	35 %	24 %	6 %	1 %	17 %	37 %	40 %
Trollheimen	0 %	0 %	62 %	37 %	1 %	0 %	0 %	38 %	62 %	0 %
SØR-TRØND./HEDM.	3 %	8 %	39 %	35 %	14 %	5 %	12 %	13 %	45 %	25 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 8. Tap av kalver og voksne dyr til andre årsaker enn rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på årsak (trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent
3 - Elgå	1 %	11 %	0 %	2 %	85 %	6 %	10 %	1 %	5 %	77 %
2 - Riast/Hylling	21 %	0 %	8 %	0 %	72 %	63 %	3 %	8 %	0 %	28 %
1 - Essand	7 %	7 %	7 %	2 %	78 %	50 %	0 %	5 %	0 %	45 %
Trollheimen	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
SØR-TRØND./HEDM.	6 %	7 %	3 %	2 %	82 %	28 %	6 %	4 %	3 %	59 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 9. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvis slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2024/25. Prosentvis slakteuttak og slakteproduksjon per livrein er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Med totalproduksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsendring omregnet til kg per rein i vårflokk (nærmere beskrevet i generelle kommentarer til næringsoversikten).

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SL.PRODUKSJON	TOTALPRODUKSJON	
	SLUTTAK	SLKVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	24/25	24/25	24/25	24/25	23/24	24/25 ¹
3 - Elgå	1 464	33 297	50 %	11,3	14,6	11,7
2 - Riast/Hylling	2 944	72 788	58 %	14,2	14,0	14,2
1 - Essand	2 141	52 914	49 %	12,1	12,9	12,1
Trollheimen	1 001	28 063	63 %	17,7	15,1	17,6
SØR-TRØND./HEDM.	7 550	187 061	54 %	13,3	13,9	13,4

Landbruksdirektoratet 2025

1 Siste års tall på totalproduksjon per livrein er foreløpig og beregnet på grunnlag av ukorrigerende reintall.

Tabell 10. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2024/25. Prosentfordelingen på dyrekategori og slaktetidspunkt er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift. Totalt antall slaktedyr tilsvarer her kun slakt fra registrerte slakterier.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt Antall slaktedyr
	Okse- rein	Simle- rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	
3 - Elgå	4 %	12 %	84 %	97 %	3 %	0 %	49 %	51 %	1 413
2 - Riast/Hylling	13 %	11 %	77 %	97 %	3 %	15 %	54 %	32 %	2 848
1 - Essand	12 %	10 %	78 %	97 %	3 %	11 %	62 %	27 %	2 078
Trollheimen	8 %	9 %	83 %	97 %	3 %	0 %	98 %	2 %	967
SØR-TRØND./HEDM.	10 %	10 %	79 %	97 %	3 %	9 %	61 %	30 %	7 306

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2024/25. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktedyr (n) til grunn for beregningene på slaktevekter er gitt i parentes.

REINBEITEDISTRIKT	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
3 - Elgå	42,9	(12)	33,0	(41)	32,5	(145)	28,6	(29)	20,2	(1186)
2 - Riast/Hylling	57,1	(43)	32,9	(319)	34,3	(282)	25,4	(19)	21,1	(2185)
1 - Essand	57,6	(145)	30,6	(106)	33,0	(181)	23,5	(26)	20,0	(1620)
Trollheimen	54,0	(29)	39,0	(53)	38,4	(80)	1	(3)	25,0	(802)
SØR-TRØND./HEDM.	56,3	(229)	33,1	(519)	34,1	(688)	26,1	(77)	21,2	(5793)

Landbruksdirektoratet 2025

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 12. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
3 - Elgå	30,1	29,8	28,9	30,6	30,4	27,8	29,6	33,1	32,0	33,0
2 - Riast/Hylling	34,9	34,9	31,4	32,4	32,0	30,8	31,8	33,5	33,1	32,9
1 - Essand	30,1	32,3	29,6	29,5	28,2	28,2	30,0	32,1	32,2	30,6
Trollheimen	38,2	38,0	38,1	37,7	38,2	35,9	38,5	37,6	38,2	39,0
SØR-TRØND./HEDM.	33,0	33,3	30,6	31,7	31,6	30,5	31,9	33,7	33,1	33,1

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 13. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
3 - Elgå	31,7	31,6	32,0	33,4	32,3	32,1	33,2	33,3	32,6	32,5
2 - Riast/Hylling	36,0	35,0	33,0	33,9	33,1	36,1	35,9	35,9	35,8	34,3
1 - Essand	32,8	33,9	30,6	31,5	32,0	33,1	33,0	34,2	33,8	33,0
Trollheimen	39,1	38,1	37,7	38,8	38,0	40,6	38,3	40,4	39,0	38,4
SØR-TRØND./HEDM.	34,2	33,9	32,6	33,2	33,0	34,6	34,3	35,1	34,1	34,1

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 14. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/ registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
3 - Elgå	19,7	20,7	20,1	19,2	19,7	19,1	20	21,2	20,2	20,2
2 - Riast/Hylling	22,5	22,7	20,6	20,6	19,9	20,1	20,5	21,9	20,7	21,1
1 - Essand	20,0	21,7	19,5	18,7	18,5	18,9	19,0	20,3	19,1	20,0
Trollheimen	23,8	24,7	23,3	24,4	21,8	23,8	24,2	24,4	24,4	25,0
SØR-TRØND./HEDM.	21,3	22,3	20,4	20,2	19,7	19,9	20,4	21,5	20,6	21,2

Landbruksdirektoratet 2025

Vedlegg 8 - Næringsoversikt reinlagene

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINLAG	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
Lom reinlag	2 412	2 315	2 355	2 433	2 350	2 393	2 302	2 341	2 395	2 420
Vågå reinlag	2 376	2 376	2 391	2 340	2 274	2 300	2 289	2 308	2 322	2 359
Fram reinlag	3 109	2 953	3 010	2 933	2 854	2 850	2 796	2 820	2 801	2 792
Filefjell reinlag	3 182	3 318	3 269	3 154	3 231	3 088	3 095	3 056	3 033	2 913
Rendal renselskap ¹	1 925	2 140	2 025	1 285	1 150	1 182	1 291	962	-	-
REINLAGENE	13 004	13 102	13 050	12 145	11 859	11 813	11 773	11 487	10 551	10 484

Landbruksdirektoratet 2025

1 Rendal renselskap leverer ikke lenger melding om reindrift.

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2024/25 (ukorrigert reintall per 31. mars 2025).

REINLAG	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL pr. 31.03.25
	Oksererein	Simlerein	Kalv	
Lom reinlag	0 %	80 %	20 %	2 420
Vågå reinlag	0 %	79 %	21 %	2 359
Fram reinlag	0 %	77 %	22 %	2 792
Filefjell reinlag	1 %	78 %	21 %	2 913
REINLAGENE	0 %	78 %	21 %	10 484

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2024/25. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved slutten av forrige driftsår (korrigert simletall per 31. mars 2024). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINLAG	SIMLER i vårflokk	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
		Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
Lom reinlag	1 890	1 796	470	1 734	95 %	25 %	92 %
Vågå reinlag	1 815	1 770	1 770	1 702	98 %	98 %	94 %
Fram reinlag	2 158	2 093	618	2 008	97 %	29 %	93 %
Filefjell reinlag	2 355	2 230	2 059	2 037	95 %	87 %	86 %
REINLAGENE	8 218	7 889	4 917	7 481	96 %	60 %	91 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2024/25. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2024, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2024.

REINLAG	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET TAP	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
Lom reinlag	1	1	62	15	20	35	97	3 %	1 %	2 %
Vågå reinlag	0	68	68	1	21	22	90	4 %	1 %	2 %
Fram reinlag	1	1	85	11	13	24	109	4 %	1 %	2 %
Filefjell reinlag	171	22	193	2	66	68	261	9 %	2 %	5 %
REINLAGENE²	171	90	408	29	120	149	557	5 %	1 %	3 %

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Ikke oppgitt grunnet mangel på datagrunnlag. Tidspunkt for merking i de enkelte siidaandelene kan påvirke datagrunnlaget.
- 2 Tall for kalvetap før og etter merking i Lom og Fram er ikke tatt med i totalberegningene for reinlagene, grunnet mangel på datagrunnlag.

Tabell 6. Tap av kalver og voksne dyr for driftsåret 2024/25, fordelt på tapsårsak (fredet rovvilt, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINLAG	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR		
	Fredet	Annen	Annen	Fredet	Annen	Annen
	rovvilt	kjent	ukjent	rovvilt	kjent	ukjent
Lom reinlag	90 %	0 %	10 %	63 %	0 %	37 %
Vågå reinlag	94 %	6 %	0 %	0 %	18 %	82 %
Fram reinlag	96 %	4 %	0 %	83 %	17 %	0 %
Filefjell reinlag	100 %	0 %	0 %	88 %	12 %	0 %
REINLAGENE	97 %	2 %	1 %	68 %	11 %	21 %

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 7. Tap av kalver og voksne dyr til rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på rovvilt (ulv, bjørn, kongeørn, jerv og gaupe).

REINLAG	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe	Ulv	Bjørn	Kongeørn	Jerv	Gaupe
Lom reinlag	0 %	0 %	73 %	27 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %
Vågå reinlag ¹	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	-	-	-	-	-
Fram reinlag	0 %	0 %	89 %	11 %	0 %	0 %	0 %	40 %	60 %	0 %
Filefjell reinlag	0 %	0 %	74 %	16 %	10 %	0 %	0 %	0 %	50 %	50 %
REINLAGENE	0 %	0 %	81 %	14 %	5 %	0 %	0 %	8 %	63 %	29 %

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 I Vågå reinlag ble ingen voksne dyr meldt tapt til fredet rovvilt.

Tabell 8. Tap av kalver og voksne dyr til andre årsaker enn rovvilt for driftsåret 2024/25, fordelt på årsak (trafikk, ulykke, sykdom, annen kjent årsak og annen ukjent årsak).

REINLAG	TAP AV KALVER					TAP AV VOKSNE DYR				
	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent	Trafikk	Ulykke	Sykdom	Annen kjent	Annen ukjent
Lom reinlag	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Vågå reinlag	25 %	0 %	0 %	75 %	0 %	0 %	0 %	0 %	18 %	82 %
Fram reinlag	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %
Filefjell reinlag ¹	-	-	-	-	-	88 %	13 %	0 %	0 %	0 %
REINLAGENE	8 %	23 %	0 %	23 %	46 %	15 %	11 %	0 %	9 %	66 %

Landbruksdirektoratet 2025

1 I Filefjell reinlag ble ingen kalver meldt tapt til andre årsaker enn fredet rovvilt.

Tabell 9. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvis slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2024/25. Prosentvis slakteuttak og slakteproduksjon per livrein er beregnet i forhold til antall rein ved slutten av forrige driftsår (korrigert reintall per 31. mars 2024). Med totalproduksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsendring omregnet til kg per rein i vårflokk (nærmere beskrevet i generelle kommentarer til næringsoversikten).

REINLAG	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SL.PRODUKSJON	TOTALPRODUKSJON	
	SLUTTAK	SLKVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	(kg/dyr)
	24/25	24/25	24/25	24/25	23/24	24/25 ¹
Lom reinlag	1 644	50 893	69 %	21,2	24,2	21,8
Vågå reinlag	1 956	54 110	70 %	19,3	20,7	23,9
Fram reinlag	1 701	52 283	73 %	22,5	17,8	18,5
Filefjell reinlag	2 076	62 406	68 %	20,6	18,3	19,1
REINLAGENE	7 377	219 692	70 %	20,8	20,0	20,6

Landbruksdirektoratet 2025

1 Siste års tall på totalproduksjon per livrein er foreløpig og beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.

Tabell 10. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2024/25. Prosentfordelingen på dyrekategori og slaktetidspunkt er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift. Totalt antall slaktedyr tilsvarer her kun slakt fra registrerte slakterier.

REINLAG	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt
	Okse-rein	Simle-rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	Antall slaktedyr
Lom reinlag	13 %	12 %	75 %	100 %	0 %	63 %	0 %	37 %	1 641
Vågå reinlag	16 %	11 %	73 %	100 %	0 %	70 %	0 %	30 %	1 701
Fram reinlag	14 %	15 %	71 %	100 %	0 %	71 %	0 %	29 %	1 956
Filefjell reinlag	16 %	16 %	68 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 073
REINLAGENE	15 %	14 %	71 %	100 %	0 %	49 %	28 %	23 %	7 371

Landbruksdirektoratet 2025

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2024/25. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktedyr (n) til grunn for beregningene på slaktevekter er gitt i parentes.

REINLAG

	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
Lom reinlag	_1	(2)	43,9	(217)	41,7	(192)	_1	(0)	26,9	(1230)
Vågå reinlag	_1	(1)	43,7	(270)	39,9	(195)	_1	(0)	26,4	(1235)
Fram reinlag	_1	(5)	36,0	(275)	37,0	(273)	25,7	(13)	24,1	(1390)
Filefjell reinlag	49,9	(48)	38,2	(289)	39,6	(307)	36,3	(18)	25,5	(1411)
REINLAGENE	51,9	(56)	40,2	(1051)	39,4	(967)	31,9	(31)	25,7	(5266)

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Det foreligger for lite eller ingen slaktedata til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 12. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINLAG	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
Lom reinlag	46,8	_1	43,8	41,0	46,0	_1	43,9	45,5	44,6	43,9
Vågå reinlag	45,7	_1	44,5	45,5	46,0	43,6	43,7	45,7	44,2	43,7
Fram reinlag	37,7	38,8	36,8	35,4	36,7	35,3	37,1	37,9	37,6	36,0
Filefjell reinlag	38,9	39,0	39,5	37,0	37,8	36,4	38,2	40,4	39,9	38,2
REINLAGENE	39,5	38,9	40,9	38,8	40,4	39,0	40,4	42,1	41,2	40,2

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Det foreligger for lite eller ingen slaktedata til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 13. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINLAG	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
Lom reinlag	39,7	_1	41,7	39,8	41,4	41,3	43,0	42,5	42,8	41,7
Vågå reinlag	40,4	_1	40,7	41,0	42,7	42,3	42,0	42,9	41,9	39,9
Fram reinlag	38,0	38,6	40,6	37,2	38,7	38,6	38,5	39,6	37,1	37,0
Filefjell reinlag	39,7	38,5	36,4	38,2	38,8	39,3	40,3	39,9	39,1	39,6
REINLAGENE	39,7	38,6	39,1	38,7	40,3	40,2	40,8	41,0	39,8	39,4

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Det foreligger for lite eller ingen slaktedata til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 14. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/ registrerte slakteribedrifter.

REINLAG	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
Lom reinlag	24,5	– ¹	26,6	25,4	24,8	26,3	26,1	27,1	27,3	26,9
Vågå reinlag	25,8	– ¹	26,3	26,1	27,1	27,1	26,0	27,0	26,0	26,4
Fram reinlag	21,9	23,5	24,3	21,8	22,0	22,8	22,0	23,3	21,4	24,1
Filefjell reinlag	24,9	24,4	24,1	23,3	23,4	23,5	24,7	25,2	24,1	25,5
REINLAGENE	24,4	24,0	25,2	24,0	24,2	24,8	24,6	25,6	24,6	25,7

Landbruksdirektoratet 2025

- 1 Det foreligger for lite eller ingen slaktedata til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Vedlegg 9 – Rammebetingelser for reindriften

Øvre reintall og distriktsgrenser per 2025

Reindriftsloven⁵³ stiller krav om de rammebetingelser som reindriften skal utøves innenfor. Dette omfatter inndeling i regionale reinbeiteområder (§ 5), reinbeitedistrikter (§§ 6 og 42) og siidaer (§ 51), samt fastsetting av bruksregler for forvaltningen og bruken av distriktets ressurser (§§ 57-61). Bruksreglene omfatter blant annet beitebruk, reintall og beitetider. Lovens § 8 gir videre bestemmelser for reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet.

Dette vedlegget gir en oversikt over disse rammebetingelsene i form av kart og tabelloversikter. Kart over reinbeiteområdene viser distriktsgrenser og konvensjonsområder (Troms og Nordland), samt forvaltningsgrenser for reinlagene. Videre er det gitt en oversikt med øvre reintall for hvert distrikt med referanser til vedtak. Oversiktene viser også referanser til vedtak om distriktsgrenser, samt bruttoarealer for distriktene og en del konvensjonsområder.

Under følger en tabell som viser fastsatt øvre reintall og bruttoarealtall for de ulike områdene som helhet.

SAMISK OMRÅDENAVN	NORSK OMRÅDENAVN	ØVRE REINTALL	BRUTTO-AREALER ¹
Nuorta-Finnmárkkku	Øst-Finnmark	70 650	30 757 km ²
Oarje-Finnmárkkku ²	Vest-Finnmark	75 989	25 925 km ²
Tromssa ²	Troms	15 750	18 277 km ²
Nordlánda, Nordlaanden	Nordland	18 200	32 613 km ²
Noerhte-Trøndelagen	Nord-Trøndelag	16 300	22 300 km ²
Åarjel-Trøndelagen/Hedemarken ³	Sør-Trøndelag/Hedmark	14 300	8 598 km ²
Reinlagene i Sør-Norge ^{4,5}		–	7 981 km ²
Hele reindriftsområdet		–	146 451 km²

- 1 Bruttoarealene er beregnet ved hjelp av Landbruksdirektoratet sitt digitale arealbrukskart, med unntak av reinlagene, hvor arealene er anslått. I bruttoareal inngår alt landareal og de fleste vann. Bruttoarealet omfatter derfor vesentlige områder som ikke nyttes til reinbeite, som innsjøer, isbreer, byer, tettsteder, veier, kulturskoger etc.
- 2 Distriktene 11-Ráidná, 19/32-Ivguláhku og 33-Ittunjárga (til sammen 1.635 km²) har sommerbeite i Troms reinbeiteområde og vinterbeite i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Disse er oppført under Vest-Finnmark.
- 3 Areal tall og øvre reintall for Trollheimen er medregnet under Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde.
- 4 Øvre reintall for reinlagene er ikke fastsatt, med unntak av for Rendal renselskap.
- 5 Areal tall for Rendal renselskap (1 859 km²) er med i totaltallet for reinlagene.

⁵³ Lov om reindrift av 15.06.2007.

Reindrifts-Norge

Reinbeiteområder,
reinbeitedistrikter og
konsesjonsområder



Tegnforklaring

-  Reinbeitedistrikt
-  Konsesjonsområde - reindrift
og Trollheimen (reindrift på særskilt grunnlag)

Landbruksdirektoratet 2024
Kartdata fra Kartverket og
Landbruksdirektoratet er lastet ned fra
www.geonorge.no. Detaljert kart kan sees i
innsynsløsning <https://kilden.nibio.no>

Øst-Finnmark reinbeiteområde

FM = Fylkesmannen, RS = Reindriftsstyret, LD/LMD = Landbruks- og matdepartementet

KODE	NORSK DISTRIKTSNAVN	SAMISK DISTRIKTSNAVN	ØVRE REINTALL	DISTRIKTSGRENSER
ZA	1/2/3 – Østre Sør-Varanger	1/2/3 - Nuorta Máttá-Várjjat	900 RS 37/10	795 km²
	1 – Pasvikneset	1 – Málesnjárga		156 km² FM 10.11.1934
	2 – Karpelv	2 – Siidejohka		414 km² FM 10.11.1934
	3 – Holmengrånaset	3 – Vinninjárga		226 km² FM 10.11.1934
ZB	5A – Pasvik	5A – Báhcaveajji	2 500 RS 39/10	554 km² FM 17.03.1937
	5C – Sør-Varanger vinterbeite	5C - Máttavárjjat dálveorohat		1 809 km² FM 17.03.1937
ZC	4/5B – Skogerøya/Spurvneset	4/5B – Sállan/Cizašnjárga	2 000 RS 38/10	423 km²
	4 – Skogerøya	4 – Sállan		132 km² FM 10.11.1934
	5B – Spurvneset	5B – Cizášnjárga		291 km² FM 17.03.1937
ZD	6 – Varangerhalvøya	6 – Várjjatnjárga	11 000 RS 47/10	3.891 km² FM 10.11.1934, 20.08.1976
	5D – Nesseby vinterbeite	5D – Unjárgga dálveorohat		1 112 km² FM 17.03.1937
ZE	7	7 – Rákkonjárga	4 000 RS 40/10	2 538 km² RS 57/04, 02.12.2004
ZF	9 – Nordkinnhalvøya / Vestertana	9 – Olggut Čorgaš / Oarje-Deatnu	5 800 RS 68/11	2 841 km² RS 57/04, 02.12.2004
ZG	13 – Ifjordfjellet	13 – Siskkit Čorgaš ja Lágesduottar	10 000 RS 71/10	3 192 km² RS 57/04, 02.12.2004
ZH	14	14 – Spierttanjárga	5 000 RS 130/11	1 649 km² FM 04.06.1963
ZJ	14A	14A – Spierntagáisá	6 300 RS 72/10	2 003 km² FM 04.06.1963
ZS	16 – Karasjok vestre distrikt Magerøya med Stikkelsvågneset	16 – Kárašjoga oarjjabealli	23 150 RS 72/11	7 516 km² RS 3/05, 07.02.2005
		Máhkarávju ja Stiikonjárgga	3 500	498 km² RS 3/05, 07.02.2005
		Skuohtanjárgga	4 100	548 km² RS 3/05, 07.02.2005
		Márrenjárgga ja Boalotnjárgga	2 600	512 km² RS 3/05, 07.02.2005
		Jáhkenjárgga	1 550	220 km² RS 3/05, 07.02.2005
		Rávdol	1 400	234 km² RS 3/05, 07.02.2005
		Skáiddeduottar	4 100 LMD 26.10.2012	579 km² RS 3/05, 07.02.2005
		Láhtin	1 750	344 km² RS 3/05, 07.02.2005
		Njeaiddán	2 050	409 km² RS 3/05, 07.02.2005
		Vuorji	2 100	421 km² RS 3/05, 07.02.2005
	Karasjok vestre vår-/høst-/vinterbeite	Kárašjoga oarjjabealli gidđa-/čakča-/dálveguhtun		3 752 km² RS 3/05, 07.02.2005
	17 – Karasjok østre vår/høst/vinterbeite	17 – Kárašjoga nuortabealli		2 433 km² RS 57/04, 02.12.2004
			70 650	30 757 km²

Øst-Finnmark reinbeiteområde

Reinbeitedistrikter



Vest-Finnmark reinbeiteområde

FM = Fylkesmannen, RS = Reindriftsstyret, LD/LMD = Landbruks- og matdepartementet

KODE	NORSK DISTRIKTSNAVN	SAMISK DISTRIKTSNAVN	ØVRE REINTALL	DISTRIKTSGRENSER
YA	19 – Sørgøy	19 – Sállan	4 300 RS 09/20	818 km² FM 10.11.1934
YB	20 – Kvaløy	20 – Fálá	2 000 LMD 23.01.2013	336 km² FM 10.11.1934
YC	21	21 – Gearretnjárga	2 400 RS 92/11	482 km² FM 10.11.1934
YD	22	22 – Fiettar	5 239 RS 46/18	990 km² FM 10.11.1934, FM 01.10.1976
YE	23	23 – Seainnus/Návggastat	6 600 RS 98/11	1 178 km² FM 10.11.1934, FM 01.10.1976
		Valgenjárga	1 300	191 km² RS 68/05, 26.09.2005
		Girenjárga/Garnášša	2 600	377 km² RS 68/05, 26.09.2005
		Jalgon	2 300	333 km² RS 68/05, 26.09.2005
		Ealenjárga	400	131 km² RS 68/05, 26.09.2005
YF	24A – Seiland Vest	24A – Oarje-Sievju	1 250 RS 93/11	359 km² RS 18/81, 01-02.06.1981
YG	24B – Seiland Øst	24B – Nuorta-Sievju	1 200 RS 94/11	225 km² RS 18/81, 01-02.06.1981
YH	25 – Stjernøy	25 – Stierdná	1 450 RS 48/11	246 km² FM 10.11.1934
YI	41	41 – Beaskádas	2 800 RS 30/11	400 km² RS 52/91, 04.12.1991
YJ	26	26 – Lákkonjárga	5 250 RS 52/11	584 km² FM 10.11.1934, LD 28.07.1978
YK	27	27 – Joahkonjárga	3 600 RS 47/20	396 km² FM 10.11.1934
YL	28 – Bergsfjord	28 – Cuokcavuotna	900 RS 127/11	273 km² FM 10.11.1934
YM	29 – Frakfjord med Silda	29 – Seakkesnjárga ja Sildá	1 100 RS 90/11	189 km² FM 10.11.1934
YN	32	32 – Silvvetnjárga	2 100 RS 96/11	384 km² LD 01.07.1963
YP	33	33 – Spalca	4 900 RS 34/24	609 km² LD 01.07.1963, 28.07.1978
YR	34	34 – Ábborašša	4 200 RS 70/11	483 km² LD 01.07.1963
YS	35	35 – Fávrrósorda	5 900 RS 28/20	1 253 km² RS 9/85, 21.06.1985
YT	36	36 – Cohkolat ja Biertavárri	6 900 RS 26/11	2 079 km² LD 01.07.1963
YU	37	37 – Skárfvággi	1 650 RS 74/11	445 km² RS 60/06, 19.12.2006
YV	38 – Uløy	38 – Ulisuolu		79 km² LD 01.07.1963
YW	39 – Arnøy/Kågen	39 – Árdni/Gávvir	2 000 RS 24/11	364 km² LD 01.07.1963
YX	40	40 – Orda	3 750 RS 36/20	416 km² LD 28.07.1978
YY	42	42 – Beahcegealli	2 700 RS 121/11	922 km² RS 9/85, 21.06.1985
	30A – “Vestre sone”	30A – Oarjjabealli		2 644 km² RS 17/04, 29.06.2004
	30B – ”Midtre sone”	30B – Guovdjohtolat		5 066 km² RS 17/04, 29.06.2004
	30C – “Østre sone”	30C – Nuorttabealli		3 077 km² RS 17/04, 29.06.2004
			72 189	24 294 km²
DISTRIKTER SOM HAR SOMMERBEITE I TROMS REINBEITEOMRÅDE OG VINTERBEITE I VEST-FINNMARK REINBEITEOMRÅDE				
XM	11T – Reinøy	11 – Ráidná	600 RS 38/11	148 km² LD 01.07.1963
XR	33T – Rendalen	33 – Ittunjárga	900 RS 101/11	614 km² LD 26.11.1973
XT	19/32T – Lakselvdalen/Lyngdalen	19/32 – Ivgoláhku	2 300 RS 126/11	873 km² LD 01.07.1963 og LD 26.11.1973
			3 800	1 635 km²

Vest-Finnmark reinbeiteområde

Reinbeitedistrikter



Troms reinbeiteområde

Distriktene 11T-Reinøy, 19/32T-Ivguláhku og 33T-Ittunjárga er oppført under Vest-Finnmark, hvor de har sine vinterbeiter.

FM = Fylkesmannen, RS = Reindriftsstyret, LD/LMD = Landbruks- og matdepartementet

KODE	NORSK DISTRIKTSNAVN	SAMISK DISTRIKTSNAVN	ØVRE REINTALL	DISTRIKTSGRENSER
XA	34 – Kanstadjord/Vestre Hinnøy	34 – Iinnasuolu	1 550 RS 28/10	1 553 km² RS 76/89, 07.12.1989
XD	36 – Tjeldøy	36 – Dielddasuolu	250 RS 73/10	186 km² LD 25.11.1977
XE	23 – Kongsvikdalen	23	600 RS 42/10	672 km² LD 01.07.1963
XG	22 – Grovfjord	22 – Roabat	750 RS 102/10	1 006 km² LD 01.07.1963
XH	16 – Sør-Senja	16 – Oarjjit Sázza	600 RS 75/10	794 km² LD 01.07.1963
XI	30 – Fagerfjell	30	400 RS 14/00, 14.04.2000	461 km² RS 24/92, 02.12.1992
XJ	15 – Nord-Senja	15 – Nuorta Sázza	750 LMD 03.12.2012	758 km² LD 01.07.1963
XK	14 – Kvaløy	14 – Sállir	600 RS 103/11	735 km² LD 01.07.1963
XL	12 – Ringvassøy	12 – Ráneš	600 RS 77/10	660 km² LD 01.07.1963
XN	13 – Rebbenesøy	13 – Ruobbá	200 RS 104/11	82 km² LD 01.07.1963
XP	10 – Vannøy	10 – Várdná	400 RS 78/10	227 km² LD 01.07.1963
XS	29 – Altevatn	20 – Uhcanjárga		2 206 km² LD 01.07.1963
XU	17/18 – Tromsdalen/Andersdalen-Stormheimen 17 – Tromsdalen 18 – Andersdalen – Stormheimen	17/18 – Stuoranjárga	2 500 RS 2/18	1 095 km² 505 km² LD 01.07.1963 590 km² LD 01.07.1963
XV	26	26 – Rosta		609 km² LD 01.07.1963
XW	24 - Helligskogen	24 – Bassevuovdi	2 300 RS 01/18	1 418 km² RS 60/06, 19.12.2006
XX	27 – Mauken	27 – Meavki	2 500 RS 2/18	1 699 km² LD 01.07.1963
XY	28 – Dividalen	28 – Deavddis		1 853 km² LD 01.07.1963
XZ	20 – Hjerttinden	20 – Stállonjárga	2 250 RS 31/10	1 004 km² LD 01.07.1963
XØ	21	21 – Gielas	2 400 RS 30/10	1 700 km² RS 9/93, 01.04.1993 og RS 31/00, 05.09.2000
			15 750	18 718 km²

Troms reinbeiteområde

Reinbeitedistrikter




Nordland reinbeiteområde

FM = Fylkesmannen, RS = Reindriftsstyret, LD/LMD = Landbruks- og matdepartementet

KODE	NORSK DISTRIKTSNAVN	SAMISK DISTRIKTSNAVN	ØVRE REINTALL	DISTRIKTSGRENSER
WA	18 – Voengelh-Njaarke Delområdet Rotvikfjellet	18	2 400 RS 106/11	2 420 km² RS 40/89, 27.04.1989 og LD 30.05.1991
WB	20 – Jillen-Njaarke Beitesoner 1, 2, 3 og 5 Beitesone 4	20	2 200 RS 107/11	4 162 km² RS 27/99, 27.04.1999
WD	19 – Børgefjell	19 – Byrkije ^{3a}	1 500 RS 76/11	2 191 km² RS 27/99, 27.04.1999
WF	21 – Røssåga/Toven	21	1 200 RS 108/11	2 310 km² RS 27/99, 27.04.1999
WK	23 – Hestmannen/Strandtindene	23	1 500 RS 75/11	2 578 km² RS 27/99, 27.04.1999
WL	22 – Ildgruben	22	900 RS 57/11	2 706 km² RS 27/99, 27.04.1999
WN	24 – Saltfjellet	24	3 500 RS 132/11	5 835 km² RS 27/99, 27.04.1999
WP	25 – Balvatn	25	1000 RS 58/11	1 932 km² RS 27/99, 27.04.1999
WR	26 –	26 - Duokta	900 RS 43/10	2 062 km² RS 27/99, 27.04.1999
WS	27 – Stájggo-Hábmer Ytre Hamarøy Steigen	27	1 800 RS 110/11	3 308 km² RS 27/99, 27.04.1999 og 35/01, 20.09.2001
WX	28 – Frostisen Konvensjonsområdet B1b	28	700 RS 111/11	1 724 km² RS 27/99, 27.04.1999 og 35/01, 20.09.2001 68 km² RbK 09.02.1972
WZ	29 – Skjomen	29	600 RS 112/11	1 385 km² RS 27/99, 27.04.1999 og 31/00, 05.09.2000
			18 200	32 613 km²

Nordland reinbeiteområde

Reinbeitedistrikter




Nord-Trøndelag reinbeiteområde

RS = Reindrifststyret, FM = Fylkesmannen, RbK = Reinbeitekonvensjonen, Kgl.res. = Kongelig resolusjon

KODE	NORSK DIST.NAVN	SAMISK DIST.NAVN	ØVRE REINTALL	DISTRIKTSGRENSER
VA	7 – Færen	7 – Gaasken-Laante	2 000 RS 44/18	2 429 km ² Kgl.res. 10.07.1894
VF	8 – Skjækerfjell	8 – Skæhkere	2 000 RS 01/11	2 380 km ² Kgl.res. 10.07.1894
VG	9 – Luru ¹	9 – Låarte ¹	2 800 RS 59/11	2 729 km ² RS 86/87, 28.08.1987
VJ	10 – Østre-Namdal Delområdet Hartkjølen	10 – Tjåhkere	5 000 RS 117/11	6 607 km ² RS 40/89, 27.04.1989 og LD 30.05.1991
VM	11 – Vestre-Namdal	11 – Áarjel-Njaarke	2 400 RS 118/11	3 816 km ² RS 40/89, 27.04.1989 og LD 30.05.1991
VR	6 – Fosen Nord-Fosen Sør-Fosen	6 – Fovsen-Njaarke	2 100 RS 02/11	4 339 km ² Kgl.res. 10.07.1894 FM 26.10.1964 FM 26.10.1964
			16 300	22 300 km ²

Nord-Trøndelag reinbeiteområde

Reinbeitedistrikter



Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde

RS = Reindrifststyret, Kgl.res. = Kongelig resolusjon,
LD/LMD = Landbruks- og matdepartementet

KODE	NORSK DIST.NAVN	SAMISK DIST.NAVN	ØVRE REINTALL ³	DISTRIKTSGRENSER
UW	3 – Elgå Østsiden av Femunden Bjørnberget (vestsiden)	3 – Svahke	3 000 RS 113/11	1 007 km ² LD 12.05.1964
UX	2 – Riast/Hylling	2 – Gåebrie	5 200 RS 17/16	1 929 km ² Kgl.res. 10.07.1894
UZ	1 – Essand	1 – Saanti	4 500 RS 115/11	2 324 km ² Kgl.res. 10.07.1894
UY	4 – Femund ¹ Øst for Feragsvassdraget Vest for Feragsvassdraget	4	9 000 RS 116/11	1 103 km ² Kgl.res. 10.07.1894
ØG	Trollheimen ² ØG1 Trollheimen ØG2 Iglfjell/Grefstadfjellområdet		1 600 LD 05.06.2002	2 235 km ² Ekspropriasjonsvedtak (kgl.res. av 26.06.1987) og leieavtaler
			14 300	8 598 km ²

- 1

Felles vinterbeitedistrikt for distriktene 1-Essand og 2-Riast/Hylling.
- 2

Reindrift utøves med hjemmel i Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal av 21.desember 1984.

- 3

Ikke uthevet tall angir øvre reintall for vinterbeitedistrikt. Dette reintallet inngår ikke i sumtallet.

Reinlagene i Sør-Norge

RS = Reindrifststyret

KODE	NORSK DIST.NAVN	ØVRE REINTALL	BRUTTOAREALER ²
ØA	Lom reinlag	Ikke fastsatt	1 265 km ² Omfatter statsallmenning (1 145 km ²) og privat grunn (120 km ²).
ØB	Vågå reinlag	Ikke fastsatt	1 357 km ² Omfatter i hovedsak statsallmenning.
ØC	Fram reinlag ¹	Ikke fastsatt	1 500 km ² Omfatter statsallmenning (ca. 745 km ²), privat grunn og sameier (ca. 755 km ²).
ØE	Filefjell reinlag ¹ ØE1 - Sommerbeite ØE2 - Vinterbeite	Ikke fastsatt	2 000 km ² Omfatter i hovedsak sameier.
ØF	Rendal renselskap ¹	2 000 RS 51/05, 26.09.2005	1 859 km ²
			7 981 km ²


- 1

Konsesjonsreindrift i henhold til Lov om reindrift av 09.06.1978 § 5, gitt av Landbruksdepartementet 04.11.1981.
- 2

Anslåtte bruttoarealer

Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde og konsesjonsreindrift

Reinbeitedistrikter og konsesjonsområder



- Tegnforklaring**
- Reinbeitedistrikt
 - Konsesjonsområde

Landbruksdirektoratet 2024
Kartdata fra Kartverket og Landbruksdirektoratet er lastet ned fra www.geonorge.no. Detaljert kart kan sees i innsynsløsning <https://kilden.nibio.no>

LANDBRUKSDIREKTORATET

TELEFON: 78 60 60 00

E-POST: postmottak@landbruksdirektoratet.no

www.landbruksdirektoratet.no